

Relatório Final RL1217/07 LYC
18 de Fevereiro de 2008

Título do Estudo

Teste de Toxicidade Crônica com *Lytechinus variegatus*
com interface sedimento/água para a amostra de
SEDIMENTO CÓD. PSS-49 (Projeto CPEA – 120)

Patrocinador

FUNDAÇÃO RICARDO FRANCO.
Praça General Tibúrcio, nº 80 - 22.290-270.
Rio de Janeiro, R.J.

Laboratório executor

TECAM Tecnologia Ambiental Ltda.
R. Fábria, 59 - 05051-030.
São Paulo, S.P.
Fone: (55) (11) 3873-2553 – Fax: (55) (11) 3862-8954

ÍNDICE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO ESTUDO.....	3
INTRODUÇÃO.....	4
MATERIAIS E MÉTODOS	4
1. Dados da amostra	4
2. Dados dos organismos-teste	4
3. Condições de teste.....	4
4. Aclimação e controle de sensibilidade	5
5. Procedimentos	5
6. Análises estatísticas.....	7
RESULTADOS	7
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8
TABELAS	9
ANEXO 1	11

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO ESTUDO

O presente estudo com a água de interface da amostra de **SEDIMENTO CÓD. PSS-49**, requerido pela empresa **FUNDAÇÃO RICARDO FRANCO**, foi conduzido dentro dos preceitos estabelecidos pelo Sistema de Qualidade do Tecam. O relatório final representa um registro preciso e verdadeiro dos resultados obtidos e contém informações estritamente confidenciais. Os dados brutos do estudo encontram-se à disposição da empresa solicitante no endereço do **TECAM – TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA**, à Rua Fábria, 59-São Paulo – SP.

MARIA FERNANDA ROMANELLI
Bióloga (MSc)
CRBio 35816/01-D

____/____/____

FUNDAÇÃO RICARDO FRANCO
Patrocinador

____/____/____

INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo foi determinar a toxicidade crônica da água de interface sedimento/água da amostra de **SEDIMENTO CÓD. PSS-49**, para embriões de ouriço do mar (*Lytechinus variegatus*), com base no grau de desenvolvimento embrio-larval e/ou anomalias em ovos, gástrulas e larvas. Após o período de 24 a 28 horas, os ovos recém-fecundados devem se desenvolver até o estágio de larva pluteus, a menos que ocorram efeitos tóxicos durante este período de exposição.

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada segue a Norma ABNT NBR 15350:2006 (ABNT, 2006).

1. Dados da amostra

Nome: **SEDIMENTO CÓD. PSS-49**

Protocolo nº: 1217/07.

Data de entrada: 09/02/2007.

Data de coleta: 08/02/2007 às 10:21h.

Local de coleta: não informado.

Coletor: solicitante.

Acondicionamento: saco plástico, sob refrigeração.

2. Dados dos organismos-teste

Espécie: *Lytechinus variegatus* (Echinodermata, Echinoidea)

Idade: ovos fecundados em laboratório, utilizados até 30 minutos após a fecundação.

3. Condições de teste

Data de início: 22/02/2007.

Data de término: 23/02/2007.

Temperatura média da água: $25,0 \pm 0,0^{\circ}\text{C}$.

Fotoperíodo: 16h luz e 8h escuro.

Renovação do meio: sem renovação (teste estático).

Aeração: superficial e suave.

Água de diluição: água marinha sintética preparada a partir de sal comercial marca CORAL REEF RED SEA SALT[®], com salinidade entre 32 e 35‰.

Sedimento-controle: sedimento coletado em Ilhabela (SP), em 14/01/2007.

4. Aclimação e controle de sensibilidade

Animais adultos foram coletados por mergulho na região costeira próxima ao CEBIMAR-USP (São Sebastião - SP) e colocados em caixas de isopor, protegidos por macroalgas coletadas no mesmo local. No laboratório, foram transferidos para caixas plásticas contendo água marinha sintética e aeração intensa.

Simultaneamente ao teste com as amostras, foi realizado um teste com a substância de referência, sulfato de zinco. A concentração de inibição (CI50; 24h) e respectivo intervalo de confiança obtidos foram: 0,065mg Zn/L (I.C.: 0,062 a 0,068mg Zn/L). A carta-controle de sensibilidade desse sistema-teste no Tecam (Anexo I), utilizando dados acumulados de vários testes, indica uma CI50; 24h média de 0,105mg Zn/L, com limites de controle (média \pm 2.desvios-padrão) de 0,056 a 0,154mg Zn/L. Portanto, o resultado do teste simultâneo está dentro da faixa definida para avaliação do sistema-teste.

5. Procedimentos

Os procedimentos utilizados para o preparo do teste com interface sedimento/água foram baseados em ANDERSON *et al.* (1996) e PRÓSPERI (2002).

A amostra de sedimento foi homogeneizada manualmente e foram transferidas alíquotas de cerca de 175mL de sedimento para cada recipiente de 750mL e adicionados 600mL de água de diluição, com auxílio de um disco plástico, para minimizar a ressuspensão do sedimento. Foram preparadas quatro réplicas desta mesma forma. Um frasco-teste de cerca de 200mL foi mantido submerso e suspenso dentro do recipiente contendo o sedimento, posicionado de forma que a abertura inferior ficasse a

aproximadamente 1cm da superfície do sedimento. Esta abertura foi coberta com uma rede com abertura de malha de 63µm, permitindo a livre passagem da água de interface e garantindo a permanência dos ovos dentro do frasco-teste. Foi introduzida aeração suave na superfície da água e o conjunto foi mantido sob repouso por 24 horas antes do início do teste. Da mesma forma, foram preparadas quatro réplicas contendo o sedimento-controle.

Os gametas foram obtidos através de injeção de solução de cloreto de potássio 0,5M na região perioral dos animais adultos, conforme metodologia descrita em ABNT (2006). A fecundação foi feita “in vitro” e os embriões obtidos foram utilizados até 30 minutos após a fecundação. Com um micro-pipetador, um volume equivalente a 600 ovos foi adicionado em cada frasco-teste.

Após 24 horas de incubação, um dos tubos do controle foi retirado e o estágio de desenvolvimento de 50 embriões foi avaliado. Uma vez que o limite recomendado de mais de 80% dos embriões em estágio de larva pluteus bem desenvolvido não foi atingido até o término deste período, o teste foi prolongado por mais duas horas, sendo, portanto encerrado após 26 horas de exposição (ABNT, 2006).

O conteúdo de cada réplica foi transferido para potes plásticos e preservado com 0,5mL de formol tamponado. Uma subamostra de cada réplica foi analisada ao microscópio em câmara de Sedgewick-Rafter, verificando o estágio de desenvolvimento e a ocorrência de anomalias nos 100 primeiros organismos encontrados. Foi calculada a porcentagem de pluteus normais e anormais em cada réplica.

Foram realizadas análises de pH, salinidade, teor de oxigênio dissolvido, nitrogênio amoniacal e amônia não ionizada da água intersticial da amostra e do sedimento-controle, no início e no final do teste. Estas amostras de água intersticial foram obtidas através da centrifugação do sedimento por 30 minutos a 3500rpm.

Também foram realizadas análises de pH, salinidade e teor de oxigênio dissolvido da água de interface da amostra e do sedimento-controle, no início e no final

do teste. As alíquotas de água para essas análises foram cuidadosamente coletadas na interface sedimento/água, cerca de 1cm acima da superfície do sedimento.

6. Análises estatísticas

Após 24 horas de exposição, o grau de desenvolvimento embrio-larval observado na água de interface do sedimento-teste foi comparado com o grau de desenvolvimento observado na água de interface do sedimento-controle, utilizando-se os Testes F e T (Zar, 1999).

RESULTADOS

Os resultados do teste com a interface sedimento/água da amostra de **SEDIMENTO CÓD. PSS-49** estão apresentados na Tabela 1, com as porcentagens de larvas pluteus normais e anormais. No cômputo de larvas pluteus anormais foram incluídas todas as fases do desenvolvimento embrio-larval e também as larvas em estágio não bem desenvolvido.

As análises estatísticas para avaliação da toxicidade da amostra de sedimento foram aplicadas sobre o total de organismos que atingiu o estágio de larva pluteus bem desenvolvido, em comparação com o resultado obtido para o sedimento-controle.

Foi verificado que a interface sedimento/água da amostra **apresentou toxicidade** crônica para *L. variegatus* (Tabela 1).

Com relação às análises químicas realizadas durante o teste, os valores de oxigênio dissolvido, salinidade, pH, nitrogênio amoniacal e amônia não ionizada da água de interface e da água intersticial do sedimento estão apresentados nas Tabelas 2 e 3. Os valores obtidos estiveram dentro das faixas estabelecidas para a aceitação dos resultados (ABNT, 2006).

Quanto à concentração de amônia não ionizada da água intersticial, tanto da amostra quanto do sedimento-controle, os valores iniciais e finais estiveram acima do

limite de 0,05mg/L (Tabela 2) que, isoladamente, pode causar efeito tóxico sobre o desenvolvimento embriolarval de *L. variegatus* (ABNT, 2006).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT Ecotoxicologia aquática – Toxicidade crônica de curta duração – Método de ensaio com ouriço-do-mar (Echinodermata: Echinoidea). Norma NBR 15350. Rio de Janeiro, ABNT, 17 p., 2006.

ANDERSON, B.S; HUNT, J.W.; HESTER, M. & PHILLIPS, B.M. Assessment of sediment toxicity at the sediment-water interface. In: **Techniques in Aquatic Toxicology**. G.K. Ostrander (ed.), Lewis Publishers, Chapter 33, p. 609-624, 1996.

Bower, C.E. & Bidwell, J.P. Ionization of ammonia in seawater: effects of temperature, pH and salinity. **J. Fish. Res. Board. Can.**, n. 35, p. 1012-1016, 1978.

PRÓSPERI, V. A. **Comparação de métodos ecotoxicológicos na avaliação de sedimentos marinhos e estuarinos**. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo, 2002.

ZAR, J.H. **Biostatistical Analysis**. 4.ed. Upper Saddle River, New Jersey, Prentice-Hall, Inc. 1999.

TABELAS

Tabela 1 – Efeito tóxico obtido no teste de toxicidade crônica de curta duração com ouriço do mar com a interface sedimento/água da amostra de **SEDIMENTO CÓD. PSS-49**, após o período de exposição.

Amostra	Rép.	Pluteus Normais	Pluteus Anormais	Pluteus Normais (%)	Pluteus Anormais (%)	Efeito (%)	Resultado
Sedimento-Controle	1	73	27	85	15	15	-
	2	88	12				
	3	93	7				
	4	86	14				
Sedimento Cód. PSS-49	1	0	100	0	100	100	Tóxico
	2	0	100				
	3	0	100				
	4	0	100				

Tabela 2 – Análises físicas e químicas efetuadas no início e no final do teste de toxicidade crônica de curta duração com ouriço do mar para a **água de interface** da amostra de **SEDIMENTO CÓD. PSS-49**.

	pH		Salinidade (‰)		OD (mg/L)	
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
Sedimento-controle	8,02	8,06	33	33	5,0	5,2
Sedimento Cód. PSS-49	8,01	8,06	34	34	4,9	5,2

Tabela 3 – Análises físicas e químicas efetuadas no início e no final do teste de toxicidade crônica de curta duração com ouriço do mar para a **água intersticial** da amostra de **SEDIMENTO CÓD. PSS-49**.

Amostra	pH		Salinidade (‰)		OD (mg/L)		Nitrogênio amoniacal (mg/L)		Amônia não ionizada (mg/L)	
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
Sedimento-Controle	8,02	7,61	34	33	4,6	4,6	4,69	3,00	0,217	0,057
Sedimento Cód. PSS-49	8,30	7,53	36	33	3,9	3,4	67,50	18,00	5,702	0,284

ANEXO 1

