

Relatório Final RL1704/07 LYC
18 de Fevereiro de 2008

Título do Estudo

Teste de Toxicidade Crônica com *Lytechinus variegatus*
com a interface sedimento/água para a amostra de
SEDIMENTO CÓD. PSS-34 (Projeto CPEA – 466)

Patrocinador

FUNDAÇÃO RICARDO FRANCO
Praça General Tibúrcio, 80 - 22.290-270.
Rio de Janeiro, R.J.

Laboratório executor

TECAM Tecnologia Ambiental Ltda.

R. Fábia, 59 - 05051-030.
São Paulo, S.P.

Fone: (55) (11) 3873-2553 – Fax: (55) (11) 3862-8954

Página 1 de 11

ÍNDICE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO ESTUDO.....	3
INTRODUÇÃO.....	4
MATERIAIS E MÉTODOS	4
1. Dados da amostra	4
2. Dados dos organismos-teste	4
3. Condições de teste.....	4
4. Aclimatação e controle de sensibilidade	5
5. Procedimentos	5
6. Análises estatísticas.....	7
RESULTADOS	7
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8
TABELAS	9
ANEXO 1	11

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO ESTUDO

O presente estudo com a água de interface da amostra de **SEDIMENTO CÓD. PSS-34**, requerido pela empresa **FUNDAÇÃO RICARDO FRANCO**, foi conduzido dentro dos preceitos estabelecidos pelo Sistema de Qualidade do Tecam. O relatório final representa um registro preciso e verdadeiro dos resultados obtidos e contém informações estritamente confidenciais. Os dados brutos do estudo encontram-se à disposição da empresa solicitante no endereço do **TECAM – TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA**, à Rua Fábia, 59-São Paulo – SP.

MARIA FERNANDA ROMANELLI
Bióloga (MSc)
CRB 35816/01-D

____ / ____ / ____

FUNDAÇÃO RICARDO FRANCO
Patrocinador

____ / ____ / ____

RL1704/07LYC

INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo foi determinar a toxicidade crônica da água de interface sedimento/água da amostra de **SEDIMENTO CÓD. PSS-34**, para embriões de ouriço do mar (*Lytechinus variegatus*), com base no grau de desenvolvimento embrio-larval e/ou anomalias em ovos, gástrulas e larvas. Após o período de 24 a 28 horas, os ovos recém-fecundados devem se desenvolver até o estágio de larva pluteus, a menos que ocorram efeitos tóxicos durante este período de exposição.

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada segue a Norma ABNT NBR 15350:2006 (ABNT, 2006).

1. Dados da amostra

Nome: **SEDIMENTO CÓD. PSS-34**.

Protocolo: 1704/07.

Data de Entrada: 26/02/2007.

Data de Coleta: 23/02/2007 às 17:04h.

Local de coleta: não informado.

Coletor: solicitante.

Acondicionamento: saco plástico, sob refrigeração.

2. Dados dos organismos-teste

Espécie: *Lytechinus variegatus* (Echinodermata, Echinoidea)

Idade: ovos fecundados em laboratório, utilizados até 30 minutos após a fecundação.

3. Condições de teste

Data de início: 13/03/2007.

Data de término: 14/03/2007.

Temperatura média da água: $25,0 \pm 0,0^{\circ}\text{C}$.

RL1704/07LYC

Fotoperíodo: 16h luz e 8h escuro.

Renovação do meio: sem renovação (teste estático).

Aeração: superficial e suave.

Água de diluição: água marinha sintética preparada a partir de sal comercial marca CORAL REEF RED SEA SALT ®, com salinidade entre 32 e 35‰.

Sedimento-controle: sedimento coletado em Ilhabela (SP), em 14/01/07.

4. Aclimatação e controle de sensibilidade

Animais adultos foram coletados por mergulho na região costeira próxima ao CEBIMAR-USP (São Sebastião - SP) e colocados em caixas de isopor, protegidos por macroalgas coletadas no mesmo local. No laboratório, foram transferidos para caixas plásticas contendo água marinha sintética e aeração intensa.

Simultaneamente ao teste com a amostra, foi realizado um teste com a substância de referência, sulfato de zinco. A concentração de inibição (CI50; 24h) e respectivo intervalo de confiança obtidos foram: 0,093mg Zn/L (I.C.: 0,085 a 0,103mg Zn/L). A carta-controle de sensibilidade desse sistema-teste no Tecam (Anexo I), utilizando dados acumulados de vários testes, indica uma CI50; 24h média de 0,105mg Zn/L, com limites de controle (média \pm 2.desvios-padrão) de 0,056 a 0,154mg Zn/L. Portanto, o resultado do teste simultâneo está dentro da faixa definida para avaliação do sistema-teste.

5. Procedimentos

Os procedimentos utilizados para o preparo do teste com interface sedimento/água foram baseados em ANDERSON *et al.* (1996) e PRÓSPERI (2002).

A amostra de sedimento foi homogeneizada manualmente e foram transferidas alíquotas de cerca de 175mL de sedimento para cada recipiente de 750mL e adicionados 600mL de água de diluição, com auxílio de um disco plástico, para minimizar a ressuspensão do sedimento. Foram preparadas quatro réplicas desta mesma forma. Um frasco-teste de cerca de 200mL foi mantido submerso e suspenso dentro do

RL1704/07LYC

recipiente contendo o sedimento, posicionado de forma que a abertura inferior ficasse a aproximadamente 1cm da superfície do sedimento. Esta abertura foi coberta com uma rede com abertura de malha de 63 μm , permitindo a livre passagem da água de interface e garantindo a permanência dos ovos dentro do frasco-teste. Foi introduzida aeração suave na superfície da água e o conjunto foi mantido sob repouso por 24 horas antes do início do teste. Da mesma forma, foram preparadas quatro réplicas contendo o sedimento-controle.

Os gametas foram obtidos através de injeção de solução de cloreto de potássio 0,5M na região perioral dos animais adultos, conforme metodologia descrita em ABNT (2006). A fecundação foi feita “in vitro” e os embriões obtidos foram utilizados até 30 minutos após a fecundação. Com um micro-pipetador, um volume equivalente a 600 ovos foi adicionado em cada frasco-teste.

Após 24 horas de incubação, uma subamostra de uma réplica do sedimento-controle foi retirada e o estágio de desenvolvimento de 100 embriões foi avaliado. O teste foi encerrado após este período porque foi obtido o limite recomendado de mais de 80% dos embriões em estágio de larva pluteus bem desenvolvido.

O conteúdo de cada réplica foi transferido para potes plásticos e preservado com 0,5mL de formol tamponado. Uma subamostra de cada réplica foi analisada ao microscópio em câmara de Sedgewick-Rafter, verificando o estágio de desenvolvimento e a ocorrência de anomalias nos 100 primeiros organismos encontrados. Foi calculada a porcentagem de pluteus normais e anormais em cada réplica.

Foram realizadas análises de pH, salinidade, teor de oxigênio dissolvido, nitrogênio amoniacal e amônia não ionizada da água intersticial da amostra de sedimento e do sedimento-controle, no início e no final dos testes. Estas amostras de água intersticial foram obtidas através da centrifugação dos sedimentos por 30 minutos a 3500rpm.

Também foram realizadas análises de pH, salinidade, teor de oxigênio dissolvido, nitrogênio amoniacal e amônia não ionizada da água de interface da amostra

RL1704/07LYC

e do sedimento-controle, no início e no final do teste. As alíquotas de água para essas análises foram cuidadosamente coletadas na interface sedimento/água, cerca de 1cm acima da superfície do sedimento.

Os valores de amônia não ionizada foram obtidos por cálculo a partir dos valores de nitrogênio amoniacal, pH, salinidade e temperatura de cada amostra, conforme descrito por Bower & Bidwell (1978).

6. Análises estatísticas

Após 24 horas de exposição, o grau de desenvolvimento embrio-larval observado na água de interface do sedimento-teste foi comparado com o grau de desenvolvimento observado na água de interface do sedimento-controle, utilizando-se os Testes F e T (Zar, 1999).

RESULTADOS

Os resultados do teste com a interface sedimento/água da amostra de **SEDIMENTO CÓD. PSS-34** estão apresentados na Tabela 1, com as porcentagens de larvas pluteus normais e anormais. No cômputo de larvas pluteus anormais foram incluídas todas as fases do desenvolvimento embrio-larval e também as larvas em estágio não bem desenvolvido.

As análises estatísticas para avaliação da toxicidade da amostra de sedimento foram aplicadas sobre o total de organismos que atingiu o estágio de larva pluteus bem desenvolvido, em comparação com o resultado obtido para o sedimento-controle.

Foi verificado que a interface sedimento/água da amostra **apresentou toxicidade crônica** para *L. variegatus*. (Tabela 1).

Com relação às análises químicas realizadas durante o teste, os valores de oxigênio dissolvido, salinidade, pH, nitrogênio amoniacal e amônia não ionizada da água de interface e da água intersticial do sedimento estão apresentados nas Tabelas 2 e

3. Os valores obtidos estiveram dentro das faixas estabelecidas para a aceitação dos resultados (ABNT, 2006).

Quanto à concentração de amônia não ionizada da água de interface, o sedimento-controle e a amostra apresentaram valores iniciais acima do limite de 0,05mg/L que, isoladamente, pode causar efeito tóxico sobre o desenvolvimento embriolarval de *L. variegatus* (ABNT, 2006). Após o período de 24 horas de exposição, apenas o sedimento-controle apresentou na água de interface valor abaixo do limite de tolerância do organismo-teste. Quanto à água intersticial, tanto o sedimento-controle quanto a amostra apresentaram valores iniciais e finais acima do limite tolerado (Tabela 3).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABNT Ecotoxicologia aquática – Toxicidade crônica de curta duração – Método de ensaio com ouriço-do-mar (Echinodermata: Echinoidea). Norma NBR 15350. Rio de Janeiro, ABNT, 17 p., 2006.
- ANDERSON, B.S; HUNT, J.W.; HESTER, M. & PHILLIPS, B.M. Assessment of sediment toxicity at the sediment-water interface. In: **Techniques in Aquatic Toxicology**. G.K. Ostrander (ed.), Lewis Publishers, Chapter 33, p. 609-624, 1996.
- Bower,C.E. & Bidwell, J.P. Ionization of ammonia in seawater: effects of temperature, pH and salinity. **J. Fish. Res. Board. Can.**, n. 35, p. 1012-1016, 1978.
- PRÓSPERI, V. A. **Comparação de métodos ecotoxicológicos na avaliação de sedimento marinho e estuarinos**. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo, 2002.
- ZAR, J.H. **Biostatistical Analysis**. 4.ed. Upper Saddle River, New Jersey, Prentice-Hall, Inc. 1999.

TABELAS

Tabela 1 – Efeito tóxico obtido no teste de toxicidade crônica de curta duração com ouriço do mar com a interface sedimento/água da amostra de **SEDIMENTO CÓD. PSS-34**, após o período de exposição.

Amostra	Rép.	Pluteus Normais	Pluteus Anormais	Pluteus Normais (%)	Pluteus Anormais (%)	Efeito (%)	Resultado
Sedimento-controle	1	80	20				
	2	78	22				
	3	82	18	80	20	20	-
	4	82	18				
Sedimento Cód. PSS-34	1	19	81				
	2	16	84				
	3	4	96	20	80	80	Tóxico
	4	35	65				

Tabela 2 – Análises físicas e químicas efetuadas no início e no final do teste de toxicidade crônica de curta duração com ouriço do mar para a **água de interface** da amostra de **SEDIMENTO CÓD. PSS-34**.

	pH		Salinidade (%)		OD (mg/L)		Nitrogênio amoniacal (mg/L)		Amônia não ionizada (mg/L)	
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
Sedimento-controle	7,98	8,05	32	32	5,5	5,6	7,00	8,00	0,303	0,025
Sedimento Cód. PSS-34	7,79	7,75	32	33	3,4	3,7	6,25	24,50	0,177	0,136


RL1704/07LYC

Tabela 3 – Análises físicas e químicas efetuadas no início e no final do teste de toxicidade crônica de curta duração com ouriço do mar para a água intersticial da amostra de SEDIMENTO CÓD. PSS-34.

	pH		Salinidade (%)		OD (mg/L)		Nitrogênio amoniacal (mg/L)		Amônia não ionizada (mg/L)	
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
Sedimento-controle	7,57	7,69	32	32	4,5	4,8	8,00	3,75	0,138	0,085
Sedimento Cód. PSS-34	7,65	7,45	34	33	2,7	3,3	24,50	13,25	0,496	0,174

RL1704/07LYC

ANEXO 1



RL1704/07LYC