

Anexo Fotográfico Fauna

Herpetofauna:




Armadilhas-de-interceptação-e-queda instaladas na Fazenda do Sr. Adão, Alvorada de Minas, MG (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)




Estação de Amostragem 2, mata da Fazenda do Sr. Adão, Alvorada de Minas, MG (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)



Nascentes em borda de mata na região do Baú, próximo às margens do Rio Doce, Estação de Amostragem 4 (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)



Área de várzea do Rio Santana, completamente descaracterizada. Ao fundo, remanescente de mata em topo de morro. Estação de Amostragem 5 (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)



Fragmento de mata da Fazenda Cachoeira Alegre, Abre Campo, MG. Estação de Amostragem 6 (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)



Instalação das armadilhas-de-interceptação-e-queda na Fazenda Vista Alegre, Divino, MG. Estação de Amostragem 8 (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)



Remanescente de mata em topo de morro no trecho entre o distrito de Alvorada, Carangola, MG e a rodovia MG-111, Faria Lemos, MG. Estação de Amostragem 9 (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)



Fragmento de mata da Fazenda Todos os Santos, Faria Lemos, MG. Estação de Amostragem 10 (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)



Remanescente da Fazenda Vargem Alegre, Porciúncula, RJ. Estação de Amostragem 12 (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)



Valão do Sossego com remanescentes da mata ciliar, Itaperuna, RJ. Estação de Amostragem 13 (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)



: Vertedouro da Lagoa do Campelo, Fazenda Barra Seca, Campos dos Goytacazes, RJ. Estação de Amostragem 14 (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)



Restinga ocupada por loteamentos e pastagens, próxima à localidade de Barra do Açú, São João da Barra, RJ. Estação de Amostragem 15 (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)



Crossodactylus bokermanni (rã-diurna), espécie endêmica da Serra do Cipó ocorrente no município de Conceição do Mato Dentro, MG (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)



Hylodes otavioi (rã-diurna), espécie também restrita à Serra do Cipó, com registro para o município de Morro do Pilar, MG (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)



Lachesis muta (surucucu-pico-de-jaca), serpente peçonhenta de grande porte com registros históricos para Carangola, MG e norte do Rio de Janeiro (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)



Aparasphenodon brunoi (perereca-de-capacete), espécie comum em ambientes de mata e restingas arbóreas (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)



Physalaemus signifer (rãzinha-da-mata), espécie que se reproduz em poças temporárias no interior de ambientes florestados (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)



Micrurus ibiboboca (coral-verdadeira), serpente florestal de hábitos fossoriais (Autoria: Fábio Schunk)



Tantilla boipiranga (cobra-vermelha, falsa-coral), espécie rara de serpente restrita à Serra do Cipó encontrada na Estação de Amostragem 2 (Autoria: R.J. Sawaya)




Eleutherodactylus verrucosus (rãzinha-da-mata), espécie rara em Minas Gerais, anteriormente conhecida no estado apenas para a localidade-tipo, na região de Juiz de Fora (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)




Proceratophrys boiei (sapo-de-chifre), espécie que se reproduz em remansos de riachos no interior de matas (Autoria: Bruno V.S. Pimenta)

Mastofauna

Fotos de mamíferos levantados através de Entrevista documentada no trecho do mineroduto Minas/Rio



Bugio (*Alouatta guariba*) registrado através de entrevista documentada no bloco 2 (Foto Fabiano Melo).



Macaco-prego (*Cebus nigrinus*) registrado através de entrevista documentada no bloco 2 (Foto Fabiano Melo).



Sagüi (*Callithrix aurita*) registrado através de entrevista documentada no bloco 2
(Foto Fabiano Melo).



Jupara (*Potos flavus*) registrado através de entrevista documentada no bloco 2
(Foto Fabiano Melo).

Fotos de mamíferos levantados através de Fotografia manual no trecho do mineroduto Minas/Rio.



Barbado (*Alouatta fusca*) fotografado na Fazenda da Serra, bloco 3.



Cavivara (*Hydrochaeris hidrochaeris*) fotografada no bloco 2.



Lontra (*Lontra longicaudis*) casal fotografado no Rio Santo Antônio bloco 4.



Barbado líder do grupo (*Alouatta fusca*) fotografado na Fazenda da Serra, bloco 3.



Sauá (*Callicebus personatus*) fotografado no bloco 3



Preá (*Cavia aperea*) fotografado em área de brejo no bloco 3.

Fotos de mamíferos levantados através de atropelamento durante deslocamento, no trecho do mineroduto Minas/Rio.



Gambá 1 (*Didelphis aurita*) encontrado atropelado no bloco 2



Gambá 2 (*Didelphis aurita*) encontrado atropelado no bloco 2.



Raposinha (*Cercopithecus thomasi*) encontrada atropelada no bloco 2.




Coelho-do-mato (*Sylvilagus brasiliensis*) encontrado atropelado no bloco 4

Fotos de mamíferos levantados através de Captura no trecho do mineroduto Minas/Rio.



Quica (*Philander frenata*) capturada, marcada e solta no bloco 2.



Quica (*Philander frenata*) capturada no bloco 2, Obs! marsúpio com seis filhotes.



Gambá (*Didelphis aurita*) capturado, marcado e solto no bloco 4.



Rato-do-chão (*Akodon sp.**) capturado, marcado e solto no bloco 4.




Rato-de-espinho (*Trinomys sp.**) capturado e coletado no bloco 4.



Cuíca (*Marmosops incantus*) capturado e coletado no bloco 3.



Rato-de-árvore (*Rhipidomys mastacalis*) capturado e coletado no bloco 4



Camundongo (*Oligoryzomys* sp.) capturado no bloco 1.



Catita (*Monodelphis sp. **) capturado no bloco 2.

Fotos de mamíferos levantados através de Vestígios no trecho do mineroduto Minas/Rio.



Espinho de Ouriço-cacheiro (*Coendou sp.*) no focinho de cachorro doméstico bloco 1.



Fezes de Capivara (*Hydrochaeris hydrochaeris*) encontrada no bloco 2.



Fezes de Sauá (*Callicebus personatus*) encontrada no bloco 3.



Fezes de Ouriço-cacheiro (*Coendou sp.*) encontrada no bloco 4.



Restos alimentares de Caxinguelê (*Sciurus aestuans*) encontrada no bloco 4.



Pegada de Jaguaririca (*Leopardus pardalis*) encontrada no bloco 3.



Pegada de Paca (*Agouti paca*) encontrada no bloco 3.



Pegada de Mão-pelada (*Procyon cancrivorus*) encontrada no bloco 4.



Pegada de Guati (*Nasua nasua*) encontrada no bloco 3.



Pegada de Coelho-do-mato (*Sylvilagus brasiliensis*) encontrada no bloco 3.



Pegada de Capivara (*Hydrochaeris hydrochaeris*) encontrada no bloco 2.

Fotos dos mamíferos coletados no trecho do mineroduto Minas/Rio.



Rato-de-espinho (*Trinomys sp.**) capturado e coletado no bloco 4.



Rato-de-árvore (*Rhipidomys mastacalis*) capturado e coletado no bloco 4.



Rato (*Em fase de identificação*) capturado e coletado no bloco 4.



Rato-do-chão (*Akodon sp.**) capturado, coletado no bloco 4.



Quica (*Philander frenata*) capturada, coletada no bloco 2.



Catita (*Monodelphis sp. **) capturado e coletado no bloco 2.



Cuíca (*Marmosops incantus*) capturado e coletado no bloco 3.

Fotos dos mamíferos levantados através do uso de armadilha fotografica no trecho do mineroduto Minas/Rio.



Paca (*Agouti paca*) fotografada através de armadilha fotográfica bloco 2



Gambá (*Didelphis aurita*) fotografada através de armadilha fotográfica bloco 2.



Irara (*Eira bárbara*) fotografada através de armadilha fotográfica bloco 2



Porco-do-mato (*Tajacu pecari*) fotografada através de armadilha fotográfica bloco 4.

Fotos das Matas do trecho do mineroduto Minas/Rio.



Área de restinga Baixa no local da construção do Porto do Açú Bloco 1 - Estação 1



Área de Canavial, local dentro da construção do Porto do Açúcar Bloco 1 - Estação 2



Fora da área da construção do Porto do Açúcar Bloco 1 - Estação 3




Mata da Faz. Das Pintas Bloco 3 - Estação 3



Mata da Faz. Nossa Senhora Aparecida Bloco 3 - Estação 2



Mata da Fazenda da Serra Bloco 3 - Estação 1



Mata da Fazenda do Fernando Bloco 2 - Estação 2



Mata da Faz. Do Ronaldo Bloco 4 - Estação 4

Iciti fauna



ponto 1 - Ribeirão das Pedras (bacia do Doce)



Ponto - Rio Santo Antônio (bacia do Doce)



Ponto 4 - Rio Preto (bacia do Doce)



Coleta qualitativa no Ponto 7 - Ribeirão do Doce 2 (Bacia do rio Doce)



Ponto 15 - Ribeirão Cuiabá (Bacia do rio Doce)



Ponto 17 - Ribeirão Picão (Bacia do rio Doce).



Ponto 18 - Lagoa Barra do Açú (Bacia do rio Paraíba do Sul)



Ponto 19 - Lagoa Azeitona (Bacia do rio Paraíba do Sul)



Ponto 20 - Lagoa Campelo (Bacia do rio Paraíba do Sul)



Ponto 22 - Rio Muriaé (Toca da Coruja) (Bacia do rio Paraíba do Sul)



Ponto 25 - Ribeirão Orizânia (Bacia do rio Paraíba do Sul)



Ponto 28 - Río Matipó Grande (Bacia do rio Doce).



Mato-Grosso *Hyphessobrycon eques*, espécie exótica



Tamboatá *Hoplosternum littorale*, espécie exótica



Tilápia *Tilapia rendalii*, espécie exótica



Roncador *Conodon nobilis*, espécie marinha, coletada no ponto 1



Bagre *Sciadeichthys luniscutis*, espécie marinha, coletada no ponto 1



Andirá *Henoichilus wetlandii*; espécie ameaçada de extinção no Brasil;



Timburé-beiçudo *Leporinus thayeri*, espécie ameaçada de extinção no Brasil



Piaba *Knodus* sp., espécie mais abundante em número.



Lambari-rabo-amarelo *Astyanax bimaculatus*, uma das espécies mais abundantes em número



Barrigudinho *Poecilia vivipara*, espécie de porte diminuto, uma das espécies mais abundantes em número



Trairão *Hoplias lacerdae*, espécie carnívora de grande porte, de maior biomassa bruta



Piau-vermelho *Leporinus copelandii*, uma das mais abundantes em biomassa



Cascudo-chinelo *Delturus carinotus*, uma das mais abundantes em biomassa



Cará *Geophagus brasiliensis*, espécie de ampla distribuição na região de estudos.

Avifauna




Vegetação típica de restinga na baixada de Campos dos Goytacazes - RJ, próximo à Foz do Rio Paraíba do Sul.



Fragmentos de mata semidecídua no vale do Rio Muriaé, geralmente localizados em topos dos morros.



Fragmento típico de mata semidecídua no Município de Porciúncula - RJ.



Trilha utilizada para coleta dos dados no interior dos fragmentos florestais, município de Carangola - MG



Vegetação típica da região de Rio Casca - MG



Região de Conceição do Mato Dentro - MG, com boa quantidade de mata, onde foi observada espécie de ave topo de cadeia.



Fragmentos de Mata Atlântica próximos à áreas degradadas, município de Santo Antônio do Grama - MG.



Mata Atlântica em bom estado de conservação onde foram encontradas diversas espécies endêmicas deste bioma, localizado entre os municípios de Sem Peixe e Vargem Linda - MG.



Matas próximas a cursos d'água, onde foram observadas espécies típicas de vegetação ciliar, município de Pedra Dourada - MG.



Parque Estadual da Serra do Brigadeiro ao fundo, município de Divino - MG



Vista do divisor de águas entre as bacias do Rio Paraíba do Sul e do Rio Doce (do outro lado do morro), município de Divino - MG.



Matas localizadas nas encostas da Serra do Brigadeiro, próximas ao divisor de águas entre as bacias do Doce e Paraíba do Sul.