



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL EIA/RIMA

CORREDOR OESTE DE EXPORTAÇÃO – NOVA FERROESTE

TRECHO: MARACAJU (MS) - PARANAGUÁ (PR)
RAMAL: FOZ DO IGUAÇU (PR) - CASCAVEL (PR)

APÊNDICE 5-30

**LISTA DE ESPÉCIES DA AVIFAUNA DE OCORRÊNCIA POTENCIAL E
REGISTRADA PARA A ÁREA DE ESTUDO (AE)**

SÃO PAULO

NOVEMBRO/2021

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação						
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES	
ORDEM RHEIFORMES																								
Família Rheidae																								
<i>Rhea americana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rhea americana</i>	ema	1,2									X	OG	N	L		R			CR				II
ORDEM TINAMIFORMES																								
Família Tinamidae																								
<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	<i>Tinamus solitarius</i>	macuco											OF	F	M	Atl	R		1	EN			NT	I
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	<i>Crypturellus obsoletus</i>	inambuguaçu	1,2	X	X	X	X	X	X				OF	F	L		R		1					
<i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815)	<i>Crypturellus undulatus</i>	jaó	1,2									X	FG	F	L		R		1	CR(RE)				
<i>Crypturellus noctivagus</i> (Wied, 1820)	<i>Crypturellus noctivagus</i>	jaó-do-sul	1	X									FG	F	M	Atl, BR	R		1	EN		VU	NT	
<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	<i>Crypturellus parvirostris</i>	inambu-chororó	1					X					FG	N	L		R		1					
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	<i>Crypturellus tataupa</i>	inambu-chintã	1,2	X				X	X			X	FG	F	L		R		1					
<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)	<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdiz	1			X							OG	N	L		R		1					
<i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815)	<i>Nothura maculosa</i>	codorna-amarela	1									X	OG	N	L		R		1					
<i>Taoniscus nanus</i> (Temminck, 1815)	<i>Taoniscus nanus</i>	codorninha											OG	N	H?	Cer	R			CR(RE)		EN	EN	
ORDEM ANSERIFORMES																								
Família Anhimidae																								
<i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Anhima cornuta</i>	anhuma	1,2									X	OG	A	M		R		1	VU				
<i>Chauna torquata</i> (Oken, 1816)	<i>Chauna torquata</i>	tachã											OG	A	L		R		1					
Família Anatidae																								
Dendrocygninae																								
<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)	<i>Dendrocygna bicolor</i>	marreca-caneleira											FIL	A	L		R		MPR					III
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê	1			X						X	FIL	A	L		R		1					
<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	marreca-cabocla	1									X	FIL	A	L		R		1					III
Família Anserinae																								
<i>Coscoroba coscoroba</i> (Molina, 1782)	<i>Coscoroba coscoroba</i>	capororoca											OG	A	L		R		MPR					II
Família Anatinae																								
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	1									X	FIL	A	M		R		1					
<i>Sarkidiornis sylvicola</i> Ihering & Ihering, 1907	<i>Sarkidiornis sylvicola</i>	pato-de-crista											FIL	A	M		R		1	VU				
<i>Callonetta leucophrys</i> (Vieillot, 1816)	<i>Callonetta leucophrys</i>	marreca-de-coleira											FIL	A	M		R		MPR					
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	ananaí	1,2			X		X		X	X		FIL	A	L		R		1					
<i>Anas sibilatrix</i> Poëppig, 1829	<i>Anas sibilatrix</i>	marreca-oveira											FIL	A	M		VS#		MGT					
<i>Anas flavirostris</i> Vieillot, 1816	<i>Anas flavirostris</i>	marreca-pardinha											FIL	A	M		R		1	VU				
<i>Anas georgica</i> Gmelin, 1789	<i>Anas georgica</i>	marreca-parda											FIL	A	L		R		MPR		NT			
<i>Anas bahamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Anas bahamensis</i>	marreca-toicinho											FIL	A	L		R		1					
<i>Anas versicolor</i> Vieillot, 1816	<i>Anas versicolor</i>	marreca-cricri	2			X							FIL	A	L		R		MPR					
<i>Anas discors</i> Linnaeus, 1766	<i>Anas discors</i>	marreca-de-asa-azul											FIL	A	L		VA (N)		MGT*					
<i>Netta peposaca</i> (Vieillot, 1816)	<i>Netta peposaca</i>	marrecão											FIL	A	L		VO (R)		MPR		NT			
<i>Nomonyx dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Nomonyx dominicus</i>	marreca-caucau											FIL	A	M		R		1					
<i>Oxyura vittata</i> (Philippi, 1860)	<i>Oxyura vittata</i>	marreca-rabo-de-espinho											FIL	A	M		VS#		MGT					
ORDEM GALLIFORMES																								
Família Cracidae																								
<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba											FG	F	M		R		1					

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação				
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT
<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	<i>Penelope obscura</i>	jacuguaçu	1,2	X	X	X	X	X				FG	F	M		R	1					
<i>Aburria jacutinga</i> (Spix, 1825)	<i>Aburria jacutinga</i>	jacutinga										FC	F	H	Atl	R	1	EN		EN	EN	I
<i>Ortalis squamata</i> (Lesson, 1829)	<i>Ortalis squamata</i>	aracuã-escamoso										FG	F	L		R	1	NT				
<i>Crax fasciolata</i> Spix, 1825	<i>Crax fasciolata</i>	mutum-de-penacho	1								X	FG	F	M		R	1	CR			VU	
Família Odontophoridae																						
<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	<i>Odontophorus capueira</i>	uru	1,2	X	X		X					FG	F	H	Atl	R	1					
ORDEM PODICIPEDIFORMES																						
Família Podicipedidae																						
<i>Rollandia rolland</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	<i>Rollandia rolland</i>	mergulhão-de-orelha-branca										PIS	A	M		R						
<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tachybaptus dominicus</i>	mergulhão-pequeno										OG	A	M		R						
<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador										CA	A	M		R						
<i>Podiceps major</i> (Boddaert, 1783)	<i>Podiceps major</i>	mergulhão-grande										PIS	A	M		R						
<i>Podiceps occipitalis</i> Garnot, 1826	<i>Podiceps occipitalis</i>	mergulhão-de-orelha-amarela										OG	A	M		VA (S)	VAG		DD			
ORDEM CICONIIFORMES																						
Família Ciconiidae																						
<i>Ciconia maguari</i> (Gmelin, 1789)	<i>Ciconia maguari</i>	maguari										OG	N	L		R						
<i>Jabiru mycteria</i> (Lichtenstein, 1819)	<i>Jabiru mycteria</i>	tuiuiú										OG	N	M		R						I
<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	1,2								X	X	OG	A	L		R					
ORDEM SULIFORMES																						
Família Phalacrocoracidae																						
<i>Nannopterum brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	<i>Nannopterum brasilianus</i>	biguá	1,2			X					X		PIS	A	L		R					
Família Anhingidae																						
<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga	2								X		PIS	A	M		R					
ORDEM PELECANIFORMES																						
Família Ardeidae																						
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	1,2								X		OG	A	M		R					
<i>Tigrisoma fasciatum</i> (Such, 1825)	<i>Tigrisoma fasciatum</i>	socó-jararaca											OG	A	M		R		EN		VU	
<i>Cochlearius cochlearius</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Cochlearius cochlearius</i>	arapapá											OG	A	H		R		CR			
<i>Botaurus pinnatus</i> (Wagler, 1829)	<i>Botaurus pinnatus</i>	socó-boi-baio											OG	A	M		R		NT			
<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Ixobrychus exilis</i>	socó-vermelho	1								X		OG	A	M		R		NT			
<i>Ixobrychus involucris</i> (Vieillot, 1823)	<i>Ixobrychus involucris</i>	socó-amarelo											OG	A	M		R		NT			
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nycticorax nycticorax</i>	socó-dorminhoco											OG	A	L		R					
<i>Nyctanassa violacea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nyctanassa violacea</i>	savacu-de-coroa											OG	F	M		R	MPR				
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Butorides striata</i>	socozinho	1	X	X						X		OG	A	L		R					
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	1,2						X	X	X		OG	N	L		R					
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	1,2	X	X						X	X	OG	A	L		R					
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	<i>Ardea alba</i>	garça-branca	1,2			X					X		OG	A	L		R					
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	1,2			X					X		OG	N	M		R					
<i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Pilherodius pileatus</i>	garça-real											OG	A	M		R		VU			
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	2			X							OG	A	L		R					
<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Egretta caerulea</i>	garça-azul											OG	A	M		R					
Família Threskiornithidae																						

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação						
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES	
<i>Eudocimus ruber</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Eudocimus ruber</i>	guará											OG	A	M		R						II	
<i>Plegadis chihi</i> (Vieillot, 1817)	<i>Plegadis chihi</i>	carauína	1							X			OG	A	L		R	MPR*						
<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	coró-coró	1,2			X					X	X	OG	F	M		R							
<i>Phimosus infuscatus</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru	1,2	X		X							OG	A	M		R							
<i>Theristicus caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	<i>Theristicus caerulescens</i>	curicaca-real											IG	N	M		R							
<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca	1,2		X	X	X	X		X	X		IG	N	L		R							
<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	1			X							OG	A	M		R	MPR*						
ORDEM CATHARTIFORMES																								
Família Cathartidae																								
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	1,2			X				X	X	X	CA	N	L		R							
<i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845	<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela	1,2							X	X		CA	N	M		R							
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	<i>Coragyps atratus</i>	urubu	1,2	X	X	X	X		X	X	X		CA	N	L		R							
<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei	2								X		CA	F	M		R						III	
ORDEM ACCIPITRIFORMES																								
Família Pandionidae																								
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pandion haliaetus</i>	águia-pescadora	2							X			PIS	A	M		VN	MGT						
Família Accipitridae																								
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-gato	1,2		X			X					OF	F	M		R							
<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	<i>Chondrohierax uncinatus</i>	caracoleiro											IG	F	L		R				VU			
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura	1		X								IG	F	M		R	MPR*						
<i>Gampsonyx swainsonii</i> Vigors, 1825	<i>Gampsonyx swainsonii</i>	gaviãozinho	1							X			CA	F	L		R							
<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira											CA	N	L		R							
<i>Harpagus bidentatus</i> (Latham, 1790)	<i>Harpagus bidentatus</i>	gavião-ripina											OF	F	M		R							
<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	<i>Harpagus diodon</i>	gavião-bombachinha	1		X								OF	F	M		R	MGT						
<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circus buffoni</i>	gavião-do-banhado	1,2							X			CA	N	M		R							
<i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)	<i>Accipiter poliogaster</i>	tauató-pintado											CA	F	H		R				VU		NT	
<i>Accipiter superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Accipiter superciliosus</i>	tauató-passarinho											CA	F	H		R				DD			
<i>Accipiter striatus</i> Vieillot, 1808	<i>Accipiter striatus</i>	tauató-miúdo	1,2		X				X				CA	F	M		R							
<i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817)	<i>Accipiter bicolor</i>	gavião-bombachinha-grande	1	X				X					CA	F	M		R				NT			
<i>Ictinia mississippiensis</i> (Wilson, 1811)	<i>Ictinia mississippiensis</i>	sovi-do-norte											OF	F	L		VN	MGT						
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	<i>Ictinia plumbea</i>	sovi	1				X		X				OG	F	M		R	MPR*						
<i>Busarellus nigricollis</i> (Latham, 1790)	<i>Busarellus nigricollis</i>	gavião-belo											PIS	F	L		R				EN			
<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro	1,2			X				X	X		IG	A	L		R	MPR*						
<i>Geranospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	<i>Geranospiza caerulescens</i>	gavião-pernilongo	1,2			X				X			CA	F	M		R							
<i>Buteogallus aequinoctialis</i> (Gmelin, 1788)	<i>Buteogallus aequinoctialis</i>	gavião-caranguejeiro											IG	F	M		R				CR		NT	
<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo	1		X						X		CA	N	L		R							
<i>Amadonastur lacernulatus</i> (Temminck, 1827)	<i>Amadonastur lacernulatus</i>	gavião-pombo-pequeno											CA	F	H	Atl, BR	R				VU	VU	VU	

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação					
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES
<i>Urubitinga urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto											CA	F	M		R						
<i>Urubitinga coronata</i> (Vieillot, 1817)	<i>Urubitinga coronata</i>	águia-cinzenta											CA	N	M		R		CR		EN	EN	
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	1,2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CA	F	L		R						
<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	<i>Parabuteo unicinctus</i>	gavião-asa-de-telha											CA	N	L		R						
<i>Parabuteo leucorrhous</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	<i>Parabuteo leucorrhous</i>	gavião-de-sobre-branco	2				X						CA	F	M		R		NT				
<i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	1		X					X	X		CA	N	L		R						
<i>Geranoaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1819)	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	águia-serrana											CA	N	M		R		NT				
<i>Pseudastur polionotus</i> (Kaup, 1847)	<i>Pseudastur polionotus</i>	gavião-pombo											CA	F	H	Atl	R		NT		NT		
<i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790)	<i>Buteo nitidus</i>	gavião-pedrés											CA	F	M		R						
<i>Buteo platypterus</i> (Vieillot, 1823)	<i>Buteo platypterus</i>	gavião-de-asa-larga											CA	F	M		VN	MGT					
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta	1,2		X			X					CA	F	M		R						
<i>Buteo swainsoni</i> Bonaparte, 1838	<i>Buteo swainsoni</i>	gavião-papa-gafanhoto											CA	N	M		VN	MGT		DD			
<i>Buteo albonotatus</i> Kaup, 1847	<i>Buteo albonotatus</i>	gavião-urubu											CA	F	M		R						
<i>Morphnus guianensis</i> (Daudin, 1800)	<i>Morphnus guianensis</i>	uiracu											CA	F	H		R		CR(RE)		VU	NT	
<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Harpia harpyja</i>	gavião-real											CA	F	H		R		1	CR	VU	NT	
<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pegamacaco	1,2				X				X		CA	F	M		R			VU			
<i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	<i>Spizaetus melanoleucus</i>	gavião-pato											CA	F	H		R			VU			
<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	<i>Spizaetus ornatus</i>	gavião-de-penacho											CA	F	M		R			EN		NT	
ORDEM EURYPYGIFORMES																							
Família Eurypygidae																							
<i>Eurypyga helias</i> (Pallas, 1781)	<i>Eurypyga helias</i>	pavãozinho-do-pará											OG	F	M		R						
ORDEM GRUIFORMES																							
Família Aramidae																							
<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Aramus guarauna</i>	carão	1,2			X				X	X		OG	A	M		R						
Família Rallidae																							
<i>Coturnicops notatus</i> (Gould, 1841)	<i>Coturnicops notatus</i>	pinto-d'água-carijó											OG	N	L		R						
<i>Micropygia schomburgkii</i> (Schomburgk, 1848)	<i>Micropygia schomburgkii</i>	maxalalagá											IG	N	H		R			DD			
<i>Rallus longirostris</i> Boddaert, 1783	<i>Rallus longirostris</i>	saracura-matraca											OG	A	H		R			VU			
<i>Aramides ypecaha</i> (Vieillot, 1819)	<i>Aramides ypecaha</i>	saracuruçu											OG	F	M		R			DD			
<i>Aramides mangle</i> (Spix, 1825)	<i>Aramides mangle</i>	saracura-do-mangue											ISB	F	H		R			NT			
<i>Aramides cajaneus</i> (Statius Muller, 1776)	<i>Aramides cajaneus</i>	saracura-três-potes	1						X				OG	F	H		R						
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato	1,2	X	X	X	X	X	X				IG	F	M	Atl	R						
<i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847)	<i>Amaurolimnas concolor</i>	saracura-lisa											ISB	F	M		R			VU			
<i>Laterallus viridis</i> (Statius Muller, 1776)	<i>Laterallus viridis</i>	sanã-castanha	1,2							X			IG	N	L		R						
<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	<i>Laterallus melanophaius</i>	sanã-parda	1,2							X	X		IG	A	L		R						

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação					
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES
<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	<i>Laterallus exilis</i>	sanã-do-capim	1,2							X		IG	A	L		R			DD				
<i>Laterallus leucopyrrhus</i> (Vieillot, 1819)	<i>Laterallus leucopyrrhus</i>	sanã-vermelha										IG	A	M		R							
<i>Porzana flaviventer</i> (Boddaert, 1783)	<i>Porzana flaviventer</i>	sanã-amarela										IG	A	M		R			DD				
<i>Mustelirallus albicollis</i> (Vieillot, 1819)	<i>Mustelirallus albicollis</i>	sanã-carijó	1,2							X	X	IG	N	M		R							
<i>Neocrex erythrops</i> (Sclater, 1867)	<i>Neocrex erythrops</i>	turu-turu										IG	N	M		R			DD				
<i>Pardirallus maculatus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Pardirallus maculatus</i>	saracura-carijó										IG	A	M		R							
<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã										IG	A	M		R							
<i>Pardirallus sanguinolentus</i> (Swainson, 1838)	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	saracura-do-banhado										IG	A	M		R	MPR*						
<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)	<i>Gallinula galeata</i>	galinha-d'água	1,2			X						OG	A	L		R							
<i>Porphyriops melanops</i> (Vieillot, 1819)	<i>Porphyriops melanops</i>	galinha-d'água-carijó										OG	A	M		R			NT				
<i>Porphyrio martinicus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Porphyrio martinicus</i>	frango-d'água-azul	1							X		OG	A	L		R	MPR						
<i>Porphyrio flavirostris</i> (Gmelin, 1789)	<i>Porphyrio flavirostris</i>	frango-d'água-pequeno										OG	A	M		R	ND		DD				
<i>Fulica armillata</i> Vieillot, 1817	<i>Fulica armillata</i>	carqueja-de-bico-manchado										OG	A	M		R							
<i>Fulica rufifrons</i> Philippi & Landbeck, 1861	<i>Fulica rufifrons</i>	carqueja-de-escudo-vermelho										OG	A	M		R			DD				
<i>Fulica leucoptera</i> Vieillot, 1817	<i>Fulica leucoptera</i>	carqueja-de-bico-amarelo										OG	A	M		R							
Família Heliornithidae																							
<i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)	<i>Heliornis fulica</i>	picaparra										OG	A	M		R			EN				
ORDEM CHARADRIIFORMES																							
Família Charadriidae																							
<i>Vanellus cayanus</i> (Latham, 1790)	<i>Vanellus cayanus</i>	mexeriqueira										IG	A	M		R			DD				
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	1,2	X	X	X	X	X	X	X	X	IG	N	L		R							
<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Muller, 1776)	<i>Pluvialis dominica</i>	batuiriçu										IG	A	L		VN	MGT						
<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pluvialis squatarola</i>	batuiriçu-de-axila-preta										IG	A	L		VN	MGT						
<i>Charadrius semipalmatus</i> Bonaparte, 1825	<i>Charadrius semipalmatus</i>	batuíra-de-bando										IG	A	M		VN	MGT						
<i>Charadrius collaris</i> Vieillot, 1818	<i>Charadrius collaris</i>	batuíra-de-coleira										IG	A	H		R							
<i>Charadrius modestus</i> Lichtenstein, 1823	<i>Charadrius modestus</i>	batuíra-de-peito-tijolo										IG	N	M		VS	MGT						
<i>Oreopholus ruficollis</i> (Wagler, 1829)	<i>Oreopholus ruficollis</i>	batuíra-de-papo-ferrugíneo										IG	N	L		VS	MGT						
Família Haematopodidae																							
<i>Haematopus palliatus</i> Temminck, 1820	<i>Haematopus palliatus</i>	piru-piru										IG	A	M		R			VU				
Família Recurvirostridae																							
<i>Himantopus mexicanus</i> (Statius Muller, 1776)	<i>Himantopus mexicanus</i>	pernilongo-de-costas-negras										IG	A	M		R							
<i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817	<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas	2			X					X	IG	A	M		R							
Família Scolopacidae																							
<i>Gallinago paraguaiiae</i> (Vieillot, 1816)	<i>Gallinago paraguaiiae</i>	narceja										IG	A	L		R							
<i>Gallinago undulata</i> (Boddaert, 1783)	<i>Gallinago undulata</i>	narcejão										IG	N	H		R			EN				
<i>Limnodromus griseus</i> (Gmelin, 1789)	<i>Limnodromus griseus</i>	maçarico-de-costas-brancas										IG	A	H		VN	MGT					CR	

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação					
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES
<i>Limosa haemastica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Limosa haemastica</i>	maçarico-de-bico-virado											IG	A	M		VN	MGT		DD			
<i>Numenius hudsonicus</i> Latham, 1790	<i>Numenius hudsonicus</i>	maçarico-de-bico-torto											IG	A	M		VN	MGT		DD			
<i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812)	<i>Bartramia longicauda</i>	maçarico-do-campo											IG	N	M		VN	MGT					
<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Actitis macularius</i>	maçarico-pintado											IG	A	L		VN	MGT					
<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário											IG	A	L		VN	MGT					
<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande-de-perna-amarela											IG	A	L		VN	MGT					
<i>Tringa semipalmata</i> (Gmelin, 1789)	<i>Tringa semipalmata</i>	maçarico-de-asa-branca											IG	A	M		VN	MGT		DD			
<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela											IG	A	L		VN	MGT					
<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Arenaria interpres</i>	vira-pedras											IG	A	H		VN	MGT					
<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Calidris canutus</i>	maçarico-de-papo-vermelho											IG	A	M		VN	MGT		DD		CR	NT
<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	<i>Calidris alba</i>	maçarico-branco											IG	A	M		VN	MGT					
<i>Calidris pusilla</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Calidris pusilla</i>	maçarico-rasteirinho											IG	A	M		VN	MGT		DD		EN	NT
<i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819)	<i>Calidris minutilla</i>	maçariquinho											IG	A	M		VN	MGT		DD			
<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	<i>Calidris fuscicollis</i>	maçarico-de-sobre-branco											IG	A	M		VN	MGT					
<i>Calidris bairdii</i> (Coues, 1861)	<i>Calidris bairdii</i>	maçarico-de-bico-fino											IG	A	H		VN	MGT		DD			
<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	<i>Calidris melanotos</i>	maçarico-de-colete											IG	A	M		VN	MGT					
<i>Calidris himantopus</i> (Bonaparte, 1826)	<i>Calidris himantopus</i>	maçarico-pernilongo											IG	A	M		VN	MGT		DD			
<i>Calidris subruficollis</i> (Vieillot, 1819)	<i>Calidris subruficollis</i>	maçarico-acanelado											IG	N	L		VN	MGT		DD		VU	NT
<i>Phalaropus tricolor</i> (Vieillot, 1819)	<i>Phalaropus tricolor</i>	pisa-n'água											IG	A	M		VN#	MGT		DD			
Família Jacanidae																							
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	1,2			X						X	X	IG	A	L		R					
Família Rostratulidae																							
<i>Nycticryphes semicollaris</i> (Vieillot, 1816)	<i>Nycticryphes semicollaris</i>	narceja-de-bico-torto											IG	A	L			R		DD			
Família Stercorariidae																							
<i>Stercorarius skua</i> (Brünnich, 1764)	<i>Stercorarius skua</i>	mandrião-grande											PIS	Ma	?		VN	MGT					
<i>Stercorarius chilensis</i> Bonaparte, 1857	<i>Stercorarius chilensis</i>	mandrião-chileno											PIS	Ma	?		VS	MGT		DD			
<i>Stercorarius maccormicki</i> Saunders, 1893	<i>Stercorarius maccormicki</i>	mandrião-do-sul											PIS	Ma	?		VS	MGT		DD			
<i>Stercorarius antarcticus</i> (Lesson, 1831)	<i>Stercorarius antarcticus</i>	mandrião-antártico											PIS	Ma	?		VS	MGT		DD			
<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)	<i>Stercorarius pomarinus</i>	mandrião-pomarino											PIS	Ma	?		VN	MGT		DD			
<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Stercorarius parasiticus</i>	mandrião-parasítico											PIS	Ma	?		VN	MGT		DD			
<i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819	<i>Stercorarius longicaudus</i>	mandrião-de-cauda-comprida											PIS	Ma	?		VN	MGT		DD			
Família Laridae																							

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação				
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT
<i>Chroicocephalus maculipennis</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	gaivota-maria-velha										OG	A	L		R						
<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> (Vieillot, 1818)	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	gaivota-de-cabeça-cinza										PIS	A	M		R		DD				
<i>Leucophaeus atricilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Leucophaeus atricilla</i>	gaivota-alegre										PIS	A	M		VN	MGT					
<i>Leucophaeus pipixcan</i> (Wagler, 1831)	<i>Leucophaeus pipixcan</i>	gaivota-de-franklin										OG	A	L		VA (N)	VAG					
<i>Larus atlanticus</i> Olrog, 1958	<i>Larus atlanticus</i>	gaivota-de-rabopreto										OG	A	H		VS	MGT					
<i>Larus dominicanus</i> Lichtenstein, 1823	<i>Larus dominicanus</i>	gaivotão										PIS	A	M		R						
Família Sternidae																						
<i>Anous stolidus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anous stolidus</i>	trinta-réis-escuro										PIS	A	H		R						
<i>Anous minutus</i> Boie, 1844	<i>Anous minutus</i>	trinta-réis-preto										PIS	A	H		R						
<i>Gygis alba</i> (Sparman, 1786)	<i>Gygis alba</i>	grazina										PIS	A	H		R						
<i>Sternula superciliaris</i> (Vieillot, 1819)	<i>Sternula superciliaris</i>	trinta-réis-pequeno										PIS	A	H		R						
<i>Phaetusa simplex</i> (Gmelin, 1789)	<i>Phaetusa simplex</i>	trinta-réis-grande	1							X		PIS	A	H		R						
<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)	<i>Gelochelidon nilotica</i>	trinta-réis-de-bico-preto										PIS	A	H		R	MPR					
<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	<i>Sterna hirundo</i>	trinta-réis-boreal										PIS	A	M		VN	MGT					
<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	<i>Sterna paradisaea</i>	trinta-réis-ártico										PIS	A	?		VN	MGT					
<i>Sterna hirundinacea</i> Lesson, 1831	<i>Sterna hirundinacea</i>	trinta-réis-de-bico-vermelho										PIS	A	H		R	MPR	1	VU		VU	
<i>Sterna vittata</i> Gmelin, 1789	<i>Sterna vittata</i>	trinta-réis-antártico										PIS	A	?		VA (S)	VAG					
<i>Sterna trudeaui</i> Audubon, 1838	<i>Sterna trudeaui</i>	trinta-réis-de-coroa-branca										PIS	A	M		R	MPR					
<i>Thalasseus acufavidus</i> (Cabot, 1847)	<i>Thalasseus acufavidus</i>	trinta-réis-de-bando										PIS	A	H		R	MPR	1				
<i>Thalasseus maximus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Thalasseus maximus</i>	trinta-réis-real										PIS	A	H		R	MPR	1	EN		EN	
Família Rynchopidae																						
<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	<i>Rynchops niger</i>	talha-mar										PIS	A	H		R	MPR					
ORDEM COLUMBIFORMES																						
Família Columbidae																						
<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Columbina minuta</i>	rolinha-de-asa-canela										GT	N	L		R						
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha	1,2	X		X		X	X	X	X	GT	N	L		R						
<i>Columbina squammata</i> (Lesson, 1831)	<i>Columbina squammata</i>	fogo-apagou	1,2								X	GT	N	L		R						
<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	<i>Columbina picui</i>	rolinha-picuí										GT	N	L		R						
<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	<i>Claravis pretiosa</i>	pararu-azul										GT	F	L		R						
<i>Claravis geoffroyi</i> (Temminck, 1811)	<i>Claravis geoffroyi</i>	pararu-espelho										GTQ	F	H	Atl	R		CR(RE)		CR(PE X)	CR	
<i>Uropelia campestris</i> (Spix, 1825)	<i>Uropelia campestris</i>	rolinha-vaqueira										GT	N	M		R						
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	<i>Columba livia</i>	pombo-doméstico										OG	N	L	Exo	R						
<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	<i>Patagioenas speciosa</i>	pomba-trocal										FG	F	M		R		1	EN			
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	<i>Patagioenas picazuro</i>	asa-branca	1,2		X	X		X	X	X	X	FG	F	M		R		1				
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	1,2				X	X				FG	F	M		R		1				
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa	1,2	X	X		X					OF	F	H		R		1				

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação						
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES	
<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	<i>Zenaida auriculata</i>	avoante	1,2			X		X	X	X	X	GT	N	L		R	ND	1						
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	1,2		X	X	X	X	X		X	GT	F	L		R		1						
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-de-testa-branca	1,2			X		X	X		X	GT	F	M		R		1						
<i>Geotrygon violacea</i> (Temminck, 1809)	<i>Geotrygon violacea</i>	juriti-vermelha										OF	F	H		R						NT		
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Geotrygon montana</i>	pariri	1,2	X	X			X				OF	F	M		R								
ORDEM CUCULIFORMES																								
Família Cuculidae																								
Cuculinae																								
<i>Coccyzus minuta</i> (Vieillot, 1817)	<i>Coccyzus minuta</i>	chincoã-pequeno										IG	F	L		R								
<i>Micrococcyx cinereus</i> (Vieillot, 1817)	<i>Micrococcyx cinereus</i>	papa-lagarta-cinzento										IG	F	M		R	MGT*							
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	1,2	X	X	X		X	X		X	IG	F	L		R								
<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	papa-lagarta	1			X					X	IG	F	L		R	MGT							
<i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coccyzus americanus</i>	papa-lagarta-de-asa-vermelha										IG	F	M		VN	MGT							
<i>Coccyzus euleri</i> Cabanis, 1873	<i>Coccyzus euleri</i>	papa-lagarta-de-euler										IG	F	M		R								
Crotophaginae																								
<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	<i>Crotophaga major</i>	anu-coroca	1							X		OF	F	M		R								
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	1,2			X			X	X	X	OG	N	L		R								
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	<i>Guira guira</i>	anu-branco	1,2			X				X	X	CA	N	L		R								
Taperinae																								
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tapera naevia</i>	saci	1,2			X	X	X	X	X		IG	N	L		R								
<i>Dromococcyx phasianellus</i> (Spix, 1824)	<i>Dromococcyx phasianellus</i>	peixe-frito										IG	F	M		R								
<i>Dromococcyx pavoninus</i> Pelzeln, 1870	<i>Dromococcyx pavoninus</i>	peixe-frito-pavonino	1,2					X				IG	F	H		R								
ORDEM STRIGIFORMES																								
Família Tytonidae																								
<i>Tyto furcata</i> (Temminck, 1827)	<i>Tyto furcata</i>	suindara	1,2				X		X	X	X	CA	N	L		R								
Família Strigidae																								
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	1,2		X	X	X	X	X		X	OF	F	L		R								
<i>Megascops atricapilla</i> (Temminck, 1822)	<i>Megascops atricapilla</i>	corujinha-sapo										OF	F	L		R	Atl							
<i>Megascops sanctaecatarinae</i> (Salvin, 1897)	<i>Megascops sanctaecatarinae</i>	corujinha-do-sul	1				X					OF	F	?		R	Atl							
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	<i>Pulsatrix perspicillata</i>	murucututu										CA	F	M		R					CR		VU	
<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni, 1901)	<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i>	murucututu-de-barriga-amarela										CA	F	H		R	Atl							
<i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Bubo virginianus</i>	jacurutu										CA	F	L		R					NT			
<i>Strix hylophila</i> Temminck, 1825	<i>Strix hylophila</i>	coruja-listrada	1,2				X					CA	F	H		R	Atl						NT	
<i>Strix virgata</i> (Cassin, 1849)	<i>Strix virgata</i>	coruja-do-mato										CA	F	M		R								
<i>Strix huhula</i> Daudin, 1800	<i>Strix huhula</i>	coruja-preta										CA	F	M		R					CR		VU	
<i>Glaucidium minutissimum</i> (Wied, 1830)	<i>Glaucidium minutissimum</i>	caburé-miudinho										IF	F	M		R	Atl					VU		
<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé	1,2				X	X			X	CA	N	L		R								
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	2							X	X	CA	N	M		R								
<i>Aegolius harrisii</i> (Cassin, 1849)	<i>Aegolius harrisii</i>	caburé-acanelado										OF	F	H		R					VU			

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação				
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT
<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	<i>Asio clamator</i>	coruja-orelhuda	1								X	CA	N	L		R						
<i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	<i>Asio stygius</i>	mocho-diabo	1						X			CA	F	M		R						
<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	<i>Asio flammeus</i>	mocho-dos-banhados										CA	N	L		R						
ORDEM NYCTIBIIFORMES																						
Família Nyctibiidae																						
<i>Nyctibius grandis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Nyctibius grandis</i>	urutau-grande										IG	F	M		R						
<i>Nyctibius aethereus</i> (Wied, 1820)	<i>Nyctibius aethereus</i>	urutau-pardo										IG	F	H		R		CR		EN		
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	<i>Nyctibius griseus</i>	urutau	1				X		X			IG	F	L		R						
ORDEM CAPRIMULGIFORMES																						
Família Caprimulgidae																						
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i> (Tschudi, 1844)	<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	bacurau-ocelado										ISB	F	M		R			EN			
<i>Antrostomus rufus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Antrostomus rufus</i>	joão-corta-pau										IG	F	L		R						
<i>Antrostomus sericocaudatus</i> Cassin, 1849	<i>Antrostomus sericocaudatus</i>	bacurau-rabo-de-seda										ISB	F	M		R			VU			
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	1		X	X	X	X	X			IC	F	M		R		MPR				
<i>Nyctiprogne leucopyga</i> (Spix, 1825)	<i>Nyctiprogne leucopyga</i>	bacurau-de-cauda-barrada										IG	F	M		R						
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau	1,2					X	X		X	IG	F	L		R						
<i>Hydropsalis parvula</i> (Gould, 1837)	<i>Hydropsalis parvula</i>	bacurau-chintã	1							X		IG	F	L		R		MPR				
<i>Hydropsalis anomala</i> (Gould, 1838)	<i>Hydropsalis anomala</i>	curiango-do-banhado										IG	A	M		R			EN			
<i>Hydropsalis candicans</i> (Pelzeln, 1867)	<i>Hydropsalis candicans</i>	bacurau-de-rabo-branco										IG	N	H	Cer	R				VU	VU	
<i>Hydropsalis longirostris</i> (Bonaparte, 1825)	<i>Hydropsalis longirostris</i>	bacurau-da-telha										IG	N	L		R						
<i>Hydropsalis maculicaudus</i> (Lawrence, 1862)	<i>Hydropsalis maculicaudus</i>	bacurau-de-rabo-maculado										IG	N	M		R						
<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura	1,2						X			IG	N	L		R						
<i>Hydropsalis forcipata</i> (Nitzsch, 1840)	<i>Hydropsalis forcipata</i>	bacurau-tesourão										ISB	F	M	Atl	R						
<i>Nannochordeiles pusillus</i> (Gould, 1861)	<i>Nannochordeiles pusillus</i>	bacurauzinho										IG	N	M		R						
<i>Podager nacunda</i> (Vieillot, 1817)	<i>Podager nacunda</i>	corução	2							X		IG	N	L		R		MPR				
<i>Chordeiles minor</i> (Forster, 1771)	<i>Chordeiles minor</i>	bacurau-norte-americano										IG	N	L		VN		MGT				
<i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783)	<i>Chordeiles acutipennis</i>	bacurau-de-asa-fina										IG	N	L		R						
ORDEM APODIFORMES																						
Família Apodidae																						
<i>Cypseloides fumigatus</i> (Streubel, 1848)	<i>Cypseloides fumigatus</i>	taperuçu-preto										IG	F	M		R						
<i>Cypseloides senex</i> (Temminck, 1826)	<i>Cypseloides senex</i>	taperuçu-velho										IG	F	M		R						
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	<i>Streptoprocne zonaris</i>	taperuçu-de-coleira-branca	1,2		X	X						IG	F	L		R						
<i>Streptoprocne biscutata</i> (Sclater, 1866)	<i>Streptoprocne biscutata</i>	taperuçu-de-coleira-falha										IG	F	M		R						
<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-sobre-cinzento	1,2	X					X			IG	F	M		R						
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal	1,2	X					X			IG	F	L		R		MGT*				
<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	<i>Tachornis squamata</i>	andorinhão-do-buriti										IG	F	L		R						

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação					
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES
<i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Panyptila cayennensis</i>	andorinhão-estofador											IG	F	M		R						NT
Família Trochilidae																							
Phaethornithinae																							
<i>Ramphodon naevius</i> (Dumont, 1818)	<i>Ramphodon naevius</i>	beija-flor-rajado	1,2	X									NE	F	M	Atl, BR	R					NT	
<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Glaucis hirsutus</i>	balança-rabo-de-bico-torto											NE	F	L		R						
<i>Phaethornis squalidus</i> (Temminck, 1822)	<i>Phaethornis squalidus</i>	rabo-branco-pequeno	1	X									NE	F	M	Atl, BR	R						
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phaethornis ruber</i>	rabo-branco-rubro											NE	F	M		R						
<i>Phaethornis subochraceus</i> Todd, 1915	<i>Phaethornis subochraceus</i>	rabo-branco-de-barriga-fulva											NE	F	M		R						
<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839)	<i>Phaethornis pretrei</i>	rabo-branco-acanelado	1,2						X		X		NE	F	L		R						
<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	<i>Phaethornis eurynome</i>	rabo-branco-de-garganta-rajada	1	X	X			X					NE	F	M	Atl	R						
Família Trochilinae																							
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	1							X			NE	N	L		R						
<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818)	<i>Aphantochroa cirrochloris</i>	beija-flor-cinza											NE	F	M	Atl	R						
<i>Florisuga mellivora</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Florisuga mellivora</i>	beija-flor-azul-de-rabo-branco											NE	F	L		R						
<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto											NE	F	M	Atl	R	MPR*					
<i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816)	<i>Colibri serrirostris</i>	beija-flor-de-orelha-violeta	1				X						NE	N	L		R						
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta											NE	F	L		R	MPR					
<i>Chrysolampis mosquitus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chrysolampis mosquitus</i>	beija-flor-vermelho											NE	F	L		R						
<i>Stephanoxis loddigesii</i> (Gould, 1831)	<i>Stephanoxis loddigesii</i>	beija-flor-de-topete-azul	1,2		X	X	X						NE	N	?		R						
<i>Lophornis magnificus</i> (Vieillot, 1817)	<i>Lophornis magnificus</i>	topetinho-vermelho											NE	F	L	BR	R					VU	
<i>Lophornis chalybeus</i> (Temminck, 1821)	<i>Lophornis chalybeus</i>	topetinho-verde											NE	F	L		R					NT	
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	1			X	X		X				NE	N	L		R						
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788)	<i>Thalurania furcata</i>	beija-flor-tesoura-verde											NE	F	M		R					DD	
<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	<i>Thalurania glaucopis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta	1,2	X	X								NE	F	M	Atl	R						
<i>Hylocharis sapphirina</i> (Gmelin, 1788)	<i>Hylocharis sapphirina</i>	beija-flor-safira											NE	F	M		R						
<i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818)	<i>Hylocharis cyanus</i>	beija-flor-roxo											NE	F	L		R					DD	
<i>Hylocharis chrysura</i> (Shaw, 1812)	<i>Hylocharis chrysura</i>	beija-flor-dourado	1							X	X		NE	F	M		R						
<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	<i>Leucochloris albicollis</i>	beija-flor-de-papo-branco	1,2		X	X	X						NE	F	L	Atl	R						
<i>Polytmus guainumbi</i> (Pallas, 1764)	<i>Polytmus guainumbi</i>	beija-flor-de-bico-curvo	1,2							X			NE	N	M		R					NT	
<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	<i>Amazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca	1,2		X								NE	F	L		R						
<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde											NE	F	L		R						

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação					
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES
<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	<i>Amazilia lactea</i>	beija-flor-de-peito-azul											NE	F	L		R						
<i>Heliodoxa rubricauda</i> (Boddaert, 1783)	<i>Heliodoxa rubricauda</i>	beija-flor-rubi	1,2		X								NE	F	M	Atl, BR	R						
<i>Heliodytes auritus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Heliodytes auritus</i>	beija-flor-de-bochecha-azul											NE	F	M		R						
<i>Heliactin bilophus</i> (Temminck, 1820)	<i>Heliactin bilophus</i>	chifre-de-ouro											NE	N	M		R						
<i>Heliomaster squamosus</i> (Temminck, 1823)	<i>Heliomaster squamosus</i>	bico-reto-de-banda-branca											NE	F	M	BR	R						
<i>Heliomaster furcifer</i> (Shaw, 1812)	<i>Heliomaster furcifer</i>	bico-reto-azul											NE	F	M		R						
<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)	<i>Calliphlox amethystina</i>	estrelinha-ametista											NE	F	L		R						
ORDEM TROGONIFORMES																							
Família Trogonidae																							
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	<i>Trogon viridis</i>	surucuá-de-barriga-amarela	1	X									FC	F	M		R						
<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	<i>Trogon surrucura</i>	surucuá-variado	1,2	X	X	X	X	X	X		X		OF	F	M	Atl	R						
<i>Trogon curucui</i> Linnaeus, 1766	<i>Trogon curucui</i>	surucuá-de-barriga-vermelha											OG	F	M		R						
<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	<i>Trogon rufus</i>	surucuá-dourado	1,2	X			X	X					OF	F	M		R						
ORDEM CORACIIFORMES																							
Família Alcedinidae																							
<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	1,2	X		X					X	X	PIS	A	L		R						
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	2			X					X		PIS	A	L		R						
<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764)	<i>Chloroceryle aenea</i>	martim-pescador-miúdo											PIS	A	M		R			NT			
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	1,2	X		X							PIS	A	L		R						
<i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Chloroceryle inda</i>	martim-pescador-da-mata											PIS	A	M		R			NT			
Família Momotidae																							
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	juvuva	1,2					X	X		X		ISB	F	M	Atl	R						
<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Momotus momota</i>	udu											OF	F	M		R			EN			
ORDEM GALBULIFORMES																							
Família Galbulidae																							
<i>Brachygalba lugubris</i> (Swainson, 1838)	<i>Brachygalba lugubris</i>	ariramba-preta	1								X		OF	F	L		R						
<i>Jacamaralcyon tridactyla</i> (Vieillot, 1817)	<i>Jacamaralcyon tridactyla</i>	cuitelão											OF	F	M	Atl, BR	R			CR(RE)		VU	
<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816	<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba	1,2								X	X	OG	F	L		R						
Família Bucconidae																							
<i>Notharchus swainsoni</i> (Gray, 1846)	<i>Notharchus swainsoni</i>	macuru-de-barriga-castanha											IC	F	M	Atl	R			NT			
<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)	<i>Nystalus chacuru</i>	joão-bobo	1						X				IG	F	M		R						
<i>Nystalus maculatus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Nystalus maculatus</i>	rapazinho-dos-velhos											IC	F	M	BR	R						
<i>Nystalus striatipectus</i> (Sclater, 1854)	<i>Nystalus striatipectus</i>	rapazinho-do-chaco											IG	F	M		R						
<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	<i>Malacoptila striata</i>	barbudo-rajado	2	X									IC	F	M	Atl, BR	R						

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação					
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guild a	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES
<i>Nonnula rubecula</i> (Spix, 1824)	<i>Nonnula rubecula</i>	macuru	1	X			X		X				IC	F	H		R						
<i>Monasa nigrifrons</i> (Spix, 1824)	<i>Monasa nigrifrons</i>	chora-chuva-preto											IG	F	M		R						
<i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782)	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho											IG	F	L		R						
ORDEM PICIFORMES																							
Família Ramphastidae																							
<i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776	<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	1,2								X		FC	N	M		R						II
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano-de-bico-preto											FC	F	H		R				VU		II
<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766	<i>Ramphastos dicolorus</i>	tucano-de-bico-verde	1,2	X	X		X	X	X				FC	F	M	Atl	R						III
<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Selenidera maculirostris</i>	araçari-poca	2	X									FC	F	M	Atl	R						III
<i>Pteroglossus bailloni</i> (Vieillot, 1819)	<i>Pteroglossus bailloni</i>	araçari-banana											FC	F	H	Atl	R		VU			NT	III
<i>Pteroglossus inscriptus</i> Swainson, 1822	<i>Pteroglossus inscriptus</i>	araçari-de-bico-riscado											FC	F	M		R						
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pteroglossus aracari</i>	araçari-de-bico-branco											FC	F	M		R		CR				II
<i>Pteroglossus castanotis</i> Gould, 1834	<i>Pteroglossus castanotis</i>	araçari-castanho	1,2					X	X		X		FC	F	H		R						III
Família Picidae																							
<i>Picumnus cirratus</i> Temminck, 1825	<i>Picumnus cirratus</i>	picapauzinho-barrado											ITG	F	L		R						
<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	<i>Picumnus temminckii</i>	picapauzinho-de-coleira	1,2	X	X	X			X				ITG	F	M	Atl	R						
<i>Picumnus albosquamatus</i> d'Orbigny, 1840	<i>Picumnus albosquamatus</i>	picapauzinho-escamoso	1,2							X	X		ITG	F	L		R						
<i>Picumnus nebulosus</i> Sundevall, 1866	<i>Picumnus nebulosus</i>	picapauzinho-carijó	1,2			X	X						ITG	F	M		R					NT	
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco	1,2			X			X	X	X		ITG	N	L		R						
<i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818)	<i>Melanerpes flavifrons</i>	benedito-de-testa-amarela	1,2	X			X		X		X		ITG	F	M	Atl	R						
<i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Veniliornis passerinus</i>	pica-pau-pequeno	1,2							X	X		ITG	F	L		R						
<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	<i>Veniliornis spilogaster</i>	picapauzinho-verde-carijó	1,2	X	X	X	X	X					ITG	F	M	Atl	R						
<i>Veniliornis mixtus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Veniliornis mixtus</i>	pica-pau-chorão											ITG	N	M		R						
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	<i>Piculus flavigula</i>	pica-pau-bufador	1,2	X									ITG	F	H		R						
<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818)	<i>Piculus chrysochloros</i>	pica-pau-dourado-escuro											ITG	F	M		R						
<i>Piculus aurulentus</i> (Temminck, 1821)	<i>Piculus aurulentus</i>	pica-pau-dourado	1,2		X	X	X						ITG	F	M	Atl	R					NT	
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado	1,2			X	X	X		X			ITG	F	L		R						
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	1,2		X	X		X	X	X			ITG	N	L		R						
<i>Celeus galeatus</i> (Temminck, 1822)	<i>Celeus galeatus</i>	pica-pau-de-cara-canela											ITG	F	H	Atl	R		EN		EN	VU	
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela	1,2	X				X					ITG	F	M		R						
<i>Celeus lugubris</i> (Malherbe, 1851)	<i>Celeus lugubris</i>	pica-pau-louro	1							X			ITG	F	M		R						
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	1,2	X		X	X	X		X	X		ITG	F	L		R						
<i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1818)	<i>Campephilus robustus</i>	pica-pau-rei											ITG	F	M	Atl	R						

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação				
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT
<i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)	<i>Campephilus melanoleucos</i>	pica-pau-de-topete-vermelho	1,2								X	ITG	F	M		R						
ORDEM CARIAMIFORMES																						
Família Cariamidae																						
<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Cariama cristata</i>	seriema	1,2								X	CA	N	M		R						
ORDEM FALCONIFORMES																						
Família Falconidae																						
<i>Ibycter americanus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Ibycter americanus</i>	cancão										CA	F	H		R				CR(RE)		
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	<i>Caracara plancus</i>	carcará	1,2			X		X		X	X	CA	N	L		R						
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	1,2	X		X	X	X		X	X	CA	N	L		R						
<i>Milvago chimango</i> (Vieillot, 1816)	<i>Milvago chimango</i>	chimango	2			X						CA	N	L		R						
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	1								X	CA	F	L		R						
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	<i>Micrastur ruficollis</i>	falcão-caburé	1,2		X		X	X				CA	F	M		R						
<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio	1,2	X	X						X	CA	F	M		R						
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri	2								X	OG	N	L		R						
<i>Falco rufigularis</i> Daudin, 1800	<i>Falco rufigularis</i>	cauré										CA	F	L		R						
<i>Falco deiroleucus</i> Temminck, 1825	<i>Falco deiroleucus</i>	falcão-de-peito-laranja										CA	F	M		R					NT	
<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	2							X		OG	N	L		R						
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Falco peregrinus</i>	falcão-peregrino										CA	A	M		VN	MGT				I	
ORDEM PSITTACIFORMES																						
Família Psittacidae																						
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> (Latham, 1790)	<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	arara-azul										FC	F	H		R					VU	I
<i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ara ararauna</i>	arara-canindé										FC	F	M		R			EN			
<i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859	<i>Ara chloropterus</i>	arara-vermelha										FC	F	H		R			VU			
<i>Ara severus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ara severus</i>	maracanã-guaçu										FC	F	M		R						
<i>Orthopsittaca manilatus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Orthopsittaca manilatus</i>	maracanã-do-buriti										FC	F	M		R						
<i>Primolius maracana</i> (Vieillot, 1816)	<i>Primolius maracana</i>	maracanã										FC	F	M		R			EN		NT	I
<i>Primolius auricollis</i> (Cassin, 1853)	<i>Primolius auricollis</i>	maracanã-de-colar										FC	F	M		R						
<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Diopsittaca nobilis</i>	maracanã-pequena										FC	F	M		R						
<i>Thectocercus acuticaudatus</i> (Vieillot, 1818)	<i>Thectocercus acuticaudatus</i>	aratinga-de-testa-azul										OG	F	M		R						
<i>Psittacara leucophthalmus</i> (Stadius Muller, 1776)	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	periquitão	1					X	X	X	X	FC	F	L		R						
<i>Aratinga nenday</i> (Vieillot, 1823)	<i>Aratinga nenday</i>	periquito-de-cabeça-preta										FC	F	M		R						
<i>Aratinga auricapillus</i> (Kuhl, 1820)	<i>Aratinga auricapillus</i>	jandaia-de-testa-vermelha										FC	F	M	BR	R			NT		NT	
<i>Eupsittula aurea</i> (Gmelin, 1788)	<i>Eupsittula aurea</i>	periquito-rei	1,2							X	X	FG	N	M		R						
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba	1,2	X	X	X	X	X				FC	F	M	Atl	R						
<i>Myiopsitta monachus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Myiopsitta monachus</i>	caturrita										FG	F	L		R						
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim	1,2	X	X					X		OG	F	L		R						
<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	<i>Brotogeris tirica</i>	periquito-verde	1,2	X	X	X						FC	F	L	Atl, BR	R						
<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-encontro-amarelo	1,2					X	X	X	X	FC	F	M		R						

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação					
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES
<i>Touit melanonotus</i> (Wied, 1820)	<i>Touit melanonotus</i>	apuim-de-costas-pretas										FC	F	H	Atl, BR	R			VU		VU	VU	
<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	<i>Pionopsitta pileata</i>	cuiú-cuiú	1,2	X	X	X	X	X				FC	F	M	Atl	R							I
<i>Alipiopsitta xanthops</i> (Spix, 1824)	<i>Alipiopsitta xanthops</i>	papagaio-galego	1,2								X	FG	N	M	Cer	R						NT	
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca	1,2	X	X	X	X	X	X			FC	F	M		R							
<i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820)	<i>Amazona vinacea</i>	papagaio-de-peito-roxo										FC	F	M	Atl	R			VU		VU	EN	I
<i>Amazona brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Amazona brasiliensis</i>	papagaio-de-cara-roxa										FC	F	H	Atl, BR	R			VU			NT	I
<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Amazona amazonica</i>	curica										FC	F	M		R			VU				
<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Amazona aestiva</i>	papagaio	1,2								X	FC	F	M		R							
<i>Triclaria malachitacea</i> (Spix, 1824)	<i>Triclaria malachitacea</i>	sabiá-cica										FC	F	M	Atl, BR	R						NT	
ORDEM PASSERIFORMES																							
Família Thamnophilidae																							
Thamnophilinae																							
<i>Terenura maculata</i> (Wied, 1831)	<i>Terenura maculata</i>	zidedê	1,2	X								IC	F	M	Atl	R							
<i>Myrmotherula unicolor</i> (Ménétrières, 1835)	<i>Myrmotherula unicolor</i>	choquinha-cinzenta	1,2	X								ISB	F	M	Atl, BR	R						NT	
<i>Formicivora rufa</i> (Wied, 1831)	<i>Formicivora rufa</i>	papa-formiga-vermelho	1,2							X		IG	N	L		R							
<i>Formicivora acutirostris</i> (Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995)	<i>Formicivora acutirostris</i>	bicudinho-do-brejo										IG	A	?	Atl, BR	R			EN		EN	NT	
<i>Rhopias gularis</i> (Spix, 1825)	<i>Rhopias gularis</i>	choquinha-de-garganta-pintada	1,2	X	X							ISB	F	M	Atl, BR	R							
<i>Dysithamnus stictothorax</i> (Temminck, 1823)	<i>Dysithamnus stictothorax</i>	choquinha-de-peito-pintado	1,2	X								ISB	F	M	Atl, BR	R						NT	
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa	1,2		X		X		X			ISB	F	M		R							
<i>Dysithamnus xanthopterus</i> Burmeister, 1856	<i>Dysithamnus xanthopterus</i>	choquinha-de-asa-ferrugem										ISB	F	M	Atl, BR	R			VU				
<i>Herpsilochmus atricapillus</i> Pelzeln, 1868	<i>Herpsilochmus atricapillus</i>	chorozinho-de-chapéu-preto										ISB	F	M		R			CR(RE)				
<i>Herpsilochmus longirostris</i> Pelzeln, 1868	<i>Herpsilochmus longirostris</i>	chorozinho-de-bico-comprido	1							X		ISB	F	M	Cer	R							
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	chorozinho-de-asa-vermelha	1,2	X					X			ISB	F	M		R							
<i>Thamnophilus doliatus</i> (Linnaeus, 1764)	<i>Thamnophilus doliatus</i>	choca-barrada	1,2						X	X	X	IG	N	L		R							
<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816	<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	choca-de-chapéu-vermelho	1,2		X	X						IG	N	L		R							
<i>Thamnophilus torquatus</i> Swainson, 1825	<i>Thamnophilus torquatus</i>	choca-de-asa-vermelha										IG	N	M		R							
<i>Thamnophilus pelzelni</i> Hellmayr, 1924	<i>Thamnophilus pelzelni</i>	choca-do-planalto	1						X			ISB	F	L	BR	R							
<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	1,2	X	X	X	X	X	X			ISB	F	L		R							
<i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)	<i>Taraba major</i>	choró-boi	1,2							X	X	IG	F	L		R							
<i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)	<i>Hypoedaleus guttatus</i>	chocão-carijó	1,2	X				X	X			IC	F	H	Atl	R							
<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	<i>Batara cinerea</i>	matracão	1,2		X		X					OF	F	M		R							
<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	<i>Mackenziaena leachii</i>	borralhara-assobiadora	1,2		X		X	X	X			ISB	F	M	Atl	R							
<i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Mackenziaena severa</i>	borralhara	1,2					X	X			ISB	F	M	Atl	R							
<i>Biatas nigropectus</i> (Lafresnaye, 1850)	<i>Biatas nigropectus</i>	papo-branco										ITQ	F	M	Atl	R			NT			VU	

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação									
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES				
<i>Myrmoderus squamosus</i> (Pelzeln, 1868)	<i>Myrmoderus squamosus</i>	papa-formiga-de-grota	1,2	X	X								ISB	F	M	Atl, BR	R						NT				
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca-do-sul	1,2	X	X			X	X				ISB	F	M	Atl	R										
<i>Drymophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)	<i>Drymophila ferruginea</i>	trovoada	1,2	X									ITQ	F	M	Atl, BR	R										
<i>Drymophila rubricollis</i> (Bertoni, 1901)	<i>Drymophila rubricollis</i>	trovoada-de-bertoni	1,2		X		X						ITQ	F	M	Atl	R										
<i>Drymophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906)	<i>Drymophila ochropyga</i>	choquinha-de-dorso-vermelho											ITQ	F	M	Atl, BR	R								NT		
<i>Drymophila malura</i> (Temminck, 1825)	<i>Drymophila malura</i>	choquinha-carijó	1,2		X	X	X						ISB	F	M	Atl	R										
<i>Drymophila squamata</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Drymophila squamata</i>	pintadinho	1		X								ISB	F	M	Atl, BR	R										
Família Melanopareidae																											
<i>Melanopareia torquata</i> (Wied, 1831)	<i>Melanopareia torquata</i>	tapaculo-de-colarinho											IG	N	M	Cer	R										
Família Conopophagidae																											
<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente	1,2	X	X	X	X	X	X				ISB	F	M	Atl	R										
<i>Conopophaga melanops</i> (Vieillot, 1818)	<i>Conopophaga melanops</i>	cuspidor-de-máscara-preta	1,2	X									ISB	F	H	Atl, BR	R										
Família Grallariidae																											
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	<i>Grallaria varia</i>	tovacuçu	1				X						ISB	F	H		R										
<i>Hylopezus nattereri</i> (Pinto, 1937)	<i>Hylopezus nattereri</i>	pinto-do-mato	1,2		X		X						ISB	F	H	Atl	R							NT			
Família Rhinocryptidae																											
Scytalopodinae																											
<i>Merulaxis ater</i> Lesson, 1830	<i>Merulaxis ater</i>	entufado											ISB	F	H	Atl, BR	R							VU		NT	
<i>Eleoscytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)	<i>Eleoscytalopus indigoticus</i>	macuquinho	1,2	X	X								ISB	F	M	Atl, BR	R									NT	
<i>Scytalopus speluncae</i> (Ménétriès, 1835)	<i>Scytalopus speluncae</i>	tapaculo-preto	1,2		X		X						ISB	F	M	Atl, BR	R										
<i>Scytalopus iraiensis</i> Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998	<i>Scytalopus iraiensis</i>	macuquinho-da-várzea											IG	A	?	Atl, BR	R							EN		EN	EN
Rhinocryptinae																											
<i>Psilorhamphus guttatus</i> (Ménétriès, 1835)	<i>Psilorhamphus guttatus</i>	tapaculo-pintado	1		X								ITQ	F	M	Atl	R									NT	
Família Formicariidae																											
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	<i>Formicarius colma</i>	galinha-do-mato	2	X	X								ISB	F	H		R										
<i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Chamaeza campanisona</i>	tovaca-campainha	1,2		X	X	X	X					ISB	F	H		R										
<i>Chamaeza meruloides</i> Vigors, 1825	<i>Chamaeza meruloides</i>	tovaca-cantadora											ISB	F	M	Atl, BR	R							VU			
<i>Chamaeza ruficauda</i> (Cabanis & Heine, 1859)	<i>Chamaeza ruficauda</i>	tovaca-de-rabo-vermelho	2		X		X						ISB	F	H	Atl	R										
Família Scleruridae																											
<i>Sclerurus macconnelli</i> Chubb, 1919	<i>Sclerurus macconnelli</i>	vira-folha-de-peito-vermelho											ISB	F	H		R										
<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétriès, 1835)	<i>Sclerurus scansor</i>	vira-folha	2		X								ISB	F	H	Atl	R										
<i>Geositta poeciloptera</i> (Wied, 1830)	<i>Geositta poeciloptera</i>	andarião											IG	N	M	Cer	R									VU	
<i>Geositta cucularia</i> (Vieillot, 1816)	<i>Geositta cucularia</i>	curriqueiro											IG	N	M		R										
Família Dendrocolaptidae																											
Sittasominae																											
<i>Dendrocincla turdina</i> (Lichtenstein, 1820)	<i>Dendrocincla turdina</i>	arapaçu-liso	1,2	X									ITG	F	M	Atl	R										
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde	1,2	X	X	X	X	X	X				ITG	F	M		R										
Dendrocolaptinae																											
<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	arapaçu-rajado	1,2	X	X	X	X						ITG	F	H	Atl	R										

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação					
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES
<i>Xiphorhynchus guttatus</i> (Lichtenstein, 1820)	<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	arapaçu-de-garganta-amarela											ITG	F	#N/D		R						
<i>Campylorhamphus falcularius</i> (Vieillot, 1822)	<i>Campylorhamphus falcularius</i>	arapaçu-de-bico-torto											ITG	F	H	Atl	R						
<i>Campylorhamphus trochilirostris</i> (Lichtenstein, 1820)	<i>Campylorhamphus trochilirostris</i>	arapaçu-beija-flor	1								X		ITG	F	H		R			VU			
<i>Dendroplex picus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Dendroplex picus</i>	arapaçu-de-bico-branco											ITG	F	L		R						
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	arapaçu-de-cerrado											ITG	F	M		R						
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (Cabanis & Heine, 1859)	<i>Lepidocolaptes falcinellus</i>	arapaçu-escamoso-do-sul	1,2		X	X	X						ITG	F	H	Atl	R						
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande	1,2		X	X	X	X				X	ITG	F	M		R						
<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	arapaçu-de-garganta-branca	1,2		X		X						ITG	F	M		R						
Família Xenopidae																							
<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo	1	X									IC	F	M		R						
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó	1,2	X			X	X					IC	F	M		R						
Família Furnariidae																							
Furnariinae																							
<i>Cinclodes fuscus</i> (Vieillot, 1818)	<i>Cinclodes fuscus</i>	pedreiro-dos-andes											IG	N	M		VS	MGT					
<i>Furnarius figulus</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Furnarius figulus</i>	casaca-de-couro-da-lama											IG	F	L	BR	R						
<i>Furnarius leucopus</i> Swainson, 1838	<i>Furnarius leucopus</i>	casaca-de-couro-amarelo											IG	F	L		R						
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	1,2			X		X	X	X	X		IG	N	L		R						
<i>Phleocryptes melanops</i> (Vieillot, 1817)	<i>Phleocryptes melanops</i>	bate-bico											IG	A	M		R			EN			
<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca	1,2		X			X					ISB	F	M		R						
Philydorinae																							
<i>Clibanornis rectirostris</i> (Wied, 1831)	<i>Clibanornis rectirostris</i>	cisqueiro-do-rio	1								X		ISB	F	H	Cer	R			VU			
<i>Clibanornis dendrocolaptoides</i> (Pelzeln, 1859)	<i>Clibanornis dendrocolaptoides</i>	cisqueiro	1,2	X		X	X	X	X				ISB	F	M	Atl	R					NT	
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	<i>Automolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-olho-branco	1,2	X	X					X			ISB	F	M	Atl	R						
<i>Anabazenops fuscus</i> (Vieillot, 1816)	<i>Anabazenops fuscus</i>	trepador-coleira											ITQ	F	H	Atl, BR	R						
<i>Anabacerthia amaurotis</i> (Temminck, 1823)	<i>Anabacerthia amaurotis</i>	limpa-folha-miúdo	1		X								ISB	F	H	Atl	R			NT		NT	
<i>Anabacerthia lichtensteini</i> (Cabanis & Heine, 1859)	<i>Anabacerthia lichtensteini</i>	limpa-folha-ocráceo	2	X									IC	F	H	Atl	R						
<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	<i>Philydor atricapillus</i>	limpa-folha-coroadado	1,2	X	X			X					ISB	F	H	Atl	R						
<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	<i>Philydor rufum</i>	limpa-folha-de-testa-baia	1,2		X	X	X			X			IC	F	M		R						
<i>Heliobletus contaminatus</i> Pelzeln, 1859	<i>Heliobletus contaminatus</i>	trepadorzinho	1,2		X		X						IC	F	H	Atl	R						
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete	1,2		X	X	X						ISB	F	M		R						
<i>Syndactyla dimidiata</i> (Pelzeln, 1859)	<i>Syndactyla dimidiata</i>	limpa-folha-do-brejo											ISB	F	H	Cer	R			CR(RE)			
Synallaxiinae																							

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação							
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES		
<i>Leptasthenura striolata</i> (Pelzeln, 1856)	<i>Leptasthenura striolata</i>	grimpeirinho	1,2				X	X					IC	F	L	Atl, BR	R								
<i>Leptasthenura setaria</i> (Temminck, 1824)	<i>Leptasthenura setaria</i>	grimpeiro	1,2			X	X	X					IC	F	L	Atl	R								
<i>Spartonoica maluroides</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Spartonoica maluroides</i>	boininha											IG	A	M		R						NT		
<i>Pseudoseisura unirufa</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	<i>Pseudoseisura unirufa</i>	casaca-de-couro-de-crista-cinza											IG	F	?		R								
<i>Phacellodomus rufifrons</i> (Wied, 1821)	<i>Phacellodomus rufifrons</i>	joão-de-pau											IG	N	M		R				DD				
<i>Phacellodomus striaticollis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	<i>Phacellodomus striaticollis</i>	tio-tio											IG	N	M		R				CR				
<i>Phacellodomus ruber</i> (Vieillot, 1817)	<i>Phacellodomus ruber</i>	graveteiro	1,2							X			IG	N	L		R								
<i>Phacellodomus erythrophthalmus</i> (Wied, 1821)	<i>Phacellodomus erythrophthalmus</i>	joão-botina-da-mata											IG	F	M	Atl, BR	R								
<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	<i>Phacellodomus ferrugineigula</i>	joão-botina-do-brejo											IG	F	M	Atl	R				EN				
<i>Anumbius annumbi</i> (Vieillot, 1817)	<i>Anumbius annumbi</i>	cochicho											IG	N	M		R								
<i>Schoeniophylax phryganophilus</i> (Vieillot, 1817)	<i>Schoeniophylax phryganophilus</i>	bichoita	1							X			IG	N	L		R								
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié	1,2							X	X		IG	F	L		R								
<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé	1,2	X	X	X	X	X	X				ISB	F	M	Atl	R								
<i>Synallaxis cinerascens</i> Temminck, 1823	<i>Synallaxis cinerascens</i>	pi-puí	1,2		X	X	X	X	X				ISB	F	M		R								
<i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln, 1859	<i>Synallaxis frontalis</i>	petrim	1,2						X				IG	F	L		R								
<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823	<i>Synallaxis albescens</i>	uí-pi											IG	N	L		R								
<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném	1,2	X	X	X	X	X	X		X		IG	N	L		R								
<i>Synallaxis hypospodia</i> Sclater, 1874	<i>Synallaxis hypospodia</i>	joão-grilo	1,2							X			IG	N	M		R				DD				
<i>Synallaxis scutata</i> Sclater, 1859	<i>Synallaxis scutata</i>	estrelinha-preta											IG	F	M		R								
<i>Cranioleuca vulpina</i> (Pelzeln, 1856)	<i>Cranioleuca vulpina</i>	arredio-do-rio	1,2							X			ISB	F	M		R				NT				
<i>Cranioleuca obsoleta</i> (Reichenbach, 1853)	<i>Cranioleuca obsoleta</i>	arredio-oliváceo	1,2		X	X	X						IC	F	M	Atl	R								
<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	<i>Cranioleuca pallida</i>	arredio-pálido	1		X								IC	F	M	Atl, BR	R								
Família Pipridae																									
Neopelminae																									
<i>Neopelma pallescens</i> (Lafresnaye, 1853)	<i>Neopelma pallescens</i>	fruxu-do-cerradão	1							X			OF	F	M		R								
<i>Neopelma chrysolophum</i> Pinto, 1944	<i>Neopelma chrysolophum</i>	fruxu											OF	F	M	Atl, BR	R								
Piprinae																									
<i>Pipra fasciicauda</i> Hellmayr, 1906	<i>Pipra fasciicauda</i>	uirapuru-laranja	1,2								X		FG	F	M		R								
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Manacus manacus</i>	rendeira	2	X									FG	F	L		R								
Ilicurinae																									
<i>Ilicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809)	<i>Ilicura militaris</i>	tangarazinho	1,2	X	X								OF	F	M	Atl, BR	R								
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará	1,2	X	X		X	X					OF	F	L	Atl	R								
<i>Antilophia galeata</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Antilophia galeata</i>	soldadinho											FG	F	M	Cer	R				VU				
Cotingoidea																									
Família Oxyruncidae																									
<i>Oxyruncus cristatus</i> Swainson, 1821	<i>Oxyruncus cristatus</i>	araponga-do-horto											FC	F	H		R								
Família Onychorhynchidae																									
<i>Onychorhynchus swainsoni</i> (Pelzeln, 1858)	<i>Onychorhynchus swainsoni</i>	maria-leque-do-sudeste											ISB	F	H	Atl, BR	R				VU		VU		
<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	<i>Myiobius barbatus</i>	assanhadinho	2	X									OF	F	H		R								
<i>Myiobius atricaudus</i> Lawrence, 1863	<i>Myiobius atricaudus</i>	assanhadinho-de-cauda-preta											OF	F	M		R								

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação						
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES	
Família Tityridae																								
Schiffornithinae																								
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	<i>Schiffornis virescens</i>	flautim	1,2	X	X		X	X						OF	F	M	Atl	R						
Tityrinae																								
<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-branco-de-bochecha-parda	2	X										FC	F	M		R						
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto	1,2		X		X	X	X				X	FC	F	M		R						
<i>Tityra semifasciata</i> (Spix, 1825)	<i>Tityra semifasciata</i>	anambé-branco-de-máscara-negra												FC	F	M		R			DD			
<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	<i>Pachyramphus viridis</i>	caneleiro-verde	2				X							IC	F	M		R						
<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro	2		X		X							IC	F	M		R						
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto	1		X	X	X	X						OF	F	L		R		MPR				
<i>Pachyramphus marginatus</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Pachyramphus marginatus</i>	caneleiro-bordado												OF	F	H		R			VU			
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	1,2	X		X	X	X	X					IC	F	M		R		MPR*				
<i>Xenopsaris albinucha</i> (Burmeister, 1869)	<i>Xenopsaris albinucha</i>	tijerila												IG	F	M		R			DD			
Família Cotingidae																								
Rupicolinae																								
<i>Carpornis cucullata</i> (Swainson, 1821)	<i>Carpornis cucullata</i>	corocoxó	1,2		X									FC	F	H	Atl, BR	R					NT	
<i>Carpornis melanocephala</i> (Wied, 1820)	<i>Carpornis melanocephala</i>	sabiá-pimenta												FC	F	H	Atl, BR	R			VU		VU	VU
Phytotominae																								
<i>Phibalura flavirostris</i> Vieillot, 1816	<i>Phibalura flavirostris</i>	tesourinha-da-mata												FC	F	M		R			DD		NT	
Cephalopterinae																								
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	<i>Pyroderus scutatus</i>	pavó												FC	F	M	Atl	R			NT			
Cotinginae																								
<i>Lipaugus lanioides</i> (Lesson, 1844)	<i>Lipaugus lanioides</i>	tropeiro-da-serra												FC	F	H	Atl, BR	R			VU		NT	
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	<i>Procnias nudicollis</i>	araponga	1	X	X									FC	F	M	Atl	R					VU	
Família Pipritidae																								
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	<i>Piprites chloris</i>	papinho-amarelo												ISB	F	H		R			VU			
<i>Piprites pileata</i> (Temminck, 1822)	<i>Piprites pileata</i>	caneleirinho-de-chapéu-preto												ISB	F	M	Atl	R			CR		VU	
Família Platyrinchidae																								
<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho	1,2		X	X	X	X	X					ISB	F	M		R						
<i>Platyrinchus leucoryphus</i> Wied, 1831	<i>Platyrinchus leucoryphus</i>	patinho-de-asa-castanha	2	X										ISB	F	H	Atl	R			VU		VU	
Família Tachuridae																								
<i>Tachuris rubrigastra</i> (Vieillot, 1817)	<i>Tachuris rubrigastra</i>	papa-piri												IG	A	M		R			EN			
Família Rhynchocyclidae																								
Pipromorphinae																								
<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza	1,2	X			X							OF	F	M	Atl	R						

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação				
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	1,2	X				X	X		X	ISB	F	M		R						
<i>Corythopsis delalandi</i> (Lesson, 1830)	<i>Corythopsis delalandi</i>	estalador	1,2					X	X			ISB	F	M		R						
<i>Phylloscartes eximius</i> (Temminck, 1822)	<i>Phylloscartes eximius</i>	barbudinho										IC	F	M	Atl	R			NT		NT	
<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-domato	1,2		X	X	X	X				IC	F	M		R						
<i>Phylloscartes kronei</i> Willis & Oniki, 1992	<i>Phylloscartes kronei</i>	maria-da-restinga										IC	F	M	Atl, BR	R						
<i>Phylloscartes paulista</i> Ihering & Ihering, 1907	<i>Phylloscartes paulista</i>	não-pode-parar	2	X								IC	F	M	Atl	R			VU		NT	
<i>Phylloscartes oustaleti</i> (Sclater, 1887)	<i>Phylloscartes oustaleti</i>	papa-moscas-de-olheiras										IC	F	H	Atl, BR	R					NT	
<i>Phylloscartes difficilis</i> (Ihering & Ihering, 1907)	<i>Phylloscartes difficilis</i>	estalinho										IC	F	M	Atl, BR	R			VU		NT	
<i>Phylloscartes sylviolus</i> (Cabanis & Heine, 1859)	<i>Phylloscartes sylviolus</i>	maria-pequena										IC	F	M	Atl	R			VU		NT	
Rhynchocyclinae																						
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	1,2	X	X		X					IC	F	M		R						
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	bico-chato-amarelo										IC	F	L		R						
Todiostroinae																						
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	<i>Todirostrum poliocephalum</i>	teque-teque	1,2	X								IC	F	L	Atl, BR	R						
<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Todirostrum cinereum</i>	ferreirinho-relógio	1,2							X	X	IG	F	L		R						
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	tororó	1,2		X	X	X	X	X			ISB	F	M		R						
<i>Poecilotriccus latirostris</i> (Pelzeln, 1868)	<i>Poecilotriccus latirostris</i>	ferreirinho-de-cara-parda										IG	F	L		R			NT			
<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	<i>Myiornis auricularis</i>	miudinho	1,2	X	X							ISB	F	L	Atl	R						
<i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822)	<i>Hemitriccus diops</i>	olho-falso	1	X								ISB	F	M	Atl	R						
<i>Hemitriccus obsoletus</i> (Miranda-Ribeiro, 1906)	<i>Hemitriccus obsoletus</i>	catraca	1,2	X	X							ISB	F	M	Atl	R						
<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	<i>Hemitriccus orbitatus</i>	tiririzinho-domato	2	X								ISB	F	M	Atl, BR	R					NT	
<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	<i>Hemitriccus nidipendulus</i>	tachuri-campainha										IG	F	L	Atl, BR	R						
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	sebinho-de-olho-de-ouro	1,2						X	X	X	IG	F	M		R						
<i>Hemitriccus kaempferi</i> (Zimmer, 1953)	<i>Hemitriccus kaempferi</i>	maria-catarinense										IC	F	H	Atl, BR	R			EN		VU	VU
Família Tyrannidae																						
Hirundineinae																						
<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro	1,2	X			X					IG	F	L		R						
Elaeniinae																						
<i>Euscarthmus meloryphus</i> Wied, 1831	<i>Euscarthmus meloryphus</i>	barulhento	1,2			X			X			IG	N	L		R						
<i>Euscarthmus rufomarginatus</i> (Pelzeln, 1868)	<i>Euscarthmus rufomarginatus</i>	maria-corrúfra										IG	N	H		R					NT	
<i>Tyranniscus burmeisteri</i> (Cabanis & Heine, 1859)	<i>Tyranniscus burmeisteri</i>	piolhinho-chiador	1,2	X			X	X				OF	F	M		R						
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	1,2	X		X	X	X		X	X	IG	F	L		R						
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	1,2		X	X				X	X	OG	N	L		R						
<i>Elaenia spectabilis</i> Pelzeln, 1868	<i>Elaenia spectabilis</i>	guaracava-grande	1							X	X	OF	F	L		R			MPR			
<i>Elaenia chilensis</i> Hellmayr, 1927	<i>Elaenia chilensis</i>	guaracava-de-crista-branca										OF	F	?		VS			MGT			

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação				
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	<i>Elaenia parvirostris</i>	tuque-pium	1		X	X				X		OG	F	L		R	MPR					
<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	<i>Elaenia mesoleuca</i>	tuque	1		X		X		X			OG	F	L		R						
<i>Elaenia cristata</i> Pelzeln, 1868	<i>Elaenia cristata</i>	guaracava-de-topete-uniforme										OG	N	M		R						
<i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865	<i>Elaenia chiriquensis</i>	chibum										OG	N	L		R	MPR					
<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Elaenia obscura</i>	tucão										OF	F	M		R						
<i>Suiriri suiriri</i> (Vieillot, 1818)	<i>Suiriri suiriri</i>	suiriri-cinzento										IG	N	M		R			EN			
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839)	<i>Myiopagis gaimardii</i>	maria-pechim										IC	F	M		R						
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta	1,2	X			X	X				IC	F	M		R						
<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	<i>Myiopagis viridicata</i>	guaracava-de-crista-alaranjada	1					X	X			IC	F	M		R	MPR					
<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela	2						X			ISB	F	L		R						
<i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825)	<i>Phaeomyias murina</i>	bagageiro										IG	N	L		R	ND					
<i>Phyllomyias virescens</i> (Temminck, 1824)	<i>Phyllomyias virescens</i>	piolhinho-verdoso	1,2		X		X	X				IC	F	M	Atl	R						
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho	1,2		X		X					IG	F	M		R						
<i>Phyllomyias griseocapilla</i> Sclater, 1862	<i>Phyllomyias griseocapilla</i>	piolhinho-serrano	1	X								IC	F	M	Atl, BR	R					NT	
<i>Culicivora caudacuta</i> (Vieillot, 1818)	<i>Culicivora caudacuta</i>	papa-moscas-do-campo										IG	N	M		R			EN			VU
<i>Polystictus pectoralis</i> (Vieillot, 1817)	<i>Polystictus pectoralis</i>	papa-moscas-canela										IG	N	H		R#			CR			NT
<i>Pseudocolopteryx sclateri</i> (Oustalet, 1892)	<i>Pseudocolopteryx sclateri</i>	tricolino	1,2							X		IG	A	M		R			EN			
<i>Pseudocolopteryx acutipennis</i> (Sclater & Salvin, 1873)	<i>Pseudocolopteryx acutipennis</i>	tricolino-oliváceo	1							X		IG	N	M		VA (O)	MGT		EN			
<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	amarelinho-do-junco										IG	A	L		R	MGT		VU			
<i>Serpophaga nigricans</i> (Vieillot, 1817)	<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre										IG	N	L		R						
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho	1,2			X	X			X		IG	F	L		R						
<i>Serpophaga griseicapilla</i> Straneck, 2008	<i>Serpophaga griseicapilla</i>	alegrinho-trinador										IG	F	?		VO#	MGT					
<i>Serpophaga munda</i> Berlepsch, 1893	<i>Serpophaga munda</i>	alegrinho-de-barriga-branca										IG	F	L		D	MPR					
Tyranninae																						
<i>Attila phoenicurus</i> Pelzeln, 1868	<i>Attila phoenicurus</i>	capitão-castanho	1		X	X	X					IC	F	H		R	MGT					
<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	<i>Attila rufus</i>	capitão-de-saíra	1,2	X	X							IC	F	M	Atl, BR	R						
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-pirata	1	X	X							FG	F	L		R	MPR					
<i>Ramphotrigon megacephalum</i> (Swainson, 1835)	<i>Ramphotrigon megacephalum</i>	maria-cabeçuda										ITQ	F	M		R				NT		
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	maria-cavaleira-pequena										IG	F	L		R						
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré	1		X	X	X	X		X		IG	F	L		R	MPR					
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	1,2	X	X	X	X	X		X	X	OG	F	L		R						
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776)	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	1								X	IG	F	L		R						
<i>Syrstes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	<i>Syrstes sibilator</i>	gritador	1,2	X			X					IC	F	M		R						
<i>Casiornis rufus</i> (Vieillot, 1816)	<i>Casiornis rufus</i>	maria-ferrugem	1							X		IC	F	M		R			VU			

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação					
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	1,2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OG	F	L		R	MPR*					
<i>Philohydor lictor</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Philohydor lictor</i>	bentevizinho-do-brejo											IG	N	L		R						
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	2			X					X		IG	N	L		R						
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	1	X	X	X	X	X	X		X		OF	F	L		R	MPR					
<i>Tyrannopsis sulphurea</i> (Spix, 1825)	<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	suiriri-de-garganta-rajada											IG	F	M		R						
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	1,2	X			X	X	X	X	X		IC	F	L		R						
<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	bentevizinho-de-asa-ferrugínea	1,2			X					X		IG	N	L		R						
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho	1,2	X					X	X			OG	F	L		R						
<i>Tyrannus albogularis</i> Burmeister, 1856	<i>Tyrannus albogularis</i>	suiriri-de-garganta-branca											IG	F	L		R	MPR*		DD			
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	1	X	X	X	X	X	X	X	X		IG	F	L		R	MPR					
<i>Tyrannus savana</i> Daudin, 1802	<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	1			X		X		X			IG	N	L		R	MPR					
<i>Tyrannus tyrannus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tyrannus tyrannus</i>	suiriri-valente											IG	N	L		VN	MGT					
<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	peitica-de-chapéu-preto											IC	F	L		R	MPR		DD			
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	<i>Empidonomus varius</i>	peitica	1	X		X		X	X		X		IC	F	L		R	MPR*					
<i>Conopias trivirgatus</i> (Wied, 1831)	<i>Conopias trivirgatus</i>	bem-te-vi-pequeno											IG	F	M		R						
Fluvicolinae																							
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	1,2	X			X						IC	F	L		R						
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	1,2		X	X	X		X	X	X		IG	N	L		R	MPR					
<i>Sublegatus modestus</i> (Wied, 1831)	<i>Sublegatus modestus</i>	guaracava-modesta											IG	F	M		R	MPR					
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe	2								X		IG	N	L		R	MPR					
<i>Fluvicola albiventer</i> (Spix, 1825)	<i>Fluvicola albiventer</i>	lavadeira-de-cara-branca											IG	A	M		R	MPR*					
<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada	1,2	X									IG	N	L		R						
<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	<i>Arundinicola leucocephala</i>	freirinha	1,2							X	X		IG	A	M		R						
<i>Gubernetes yetapa</i> (Vieillot, 1818)	<i>Gubernetes yetapa</i>	tesoura-do-brejo	1,2							X	X		IG	N	M		R						
<i>Alectrurus tricolor</i> (Vieillot, 1816)	<i>Alectrurus tricolor</i>	galito											IG	N	H		R			CR		VU	VU
<i>Alectrurus risora</i> (Vieillot, 1824)	<i>Alectrurus risora</i>	tesoura-do-campo											IG	N	M		D	VAG					VU
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracavuçu	1		X								ISB	F	L		R						
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	1	X	X	X	X	X	X				ISB	F	M		R	MPR					
<i>Contopus cooperi</i> (Nuttall, 1831)	<i>Contopus cooperi</i>	piuí-boreal											IC	F	M		VN	MGT					NT
<i>Contopus virens</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Contopus virens</i>	piuí											IC	F	M		VN#	MGT					
<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	<i>Contopus cinereus</i>	papa-moscascinzento	1						X				IC	F	L		R						
<i>Lessonia rufa</i> (Gmelin, 1789)	<i>Lessonia rufa</i>	colegial											IG	A	L		VS	MGT					
<i>Knipolegus striaticeps</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Knipolegus striaticeps</i>	maria-preta-acinzentada											IG	N	M?		VA (O)	VAG					
<i>Knipolegus hudsoni</i> Sclater, 1872	<i>Knipolegus hudsoni</i>	maria-preta-do-sul											IG	N	M?		VA (S)	VAG					
<i>Knipolegus cyanirostris</i> (Vieillot, 1818)	<i>Knipolegus cyanirostris</i>	maria-preta-de-bico-azulado	1		X								ISB	F	L		R						

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação					
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Hábitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no hábitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES
<i>Knipolegus lophotes</i> Boie, 1828	<i>Knipolegus lophotes</i>	maria-preta-de-penacho											IG	N	L		R						
<i>Knipolegus nigerrimus</i> (Vieillot, 1818)	<i>Knipolegus nigerrimus</i>	maria-preta-de-garganta-vermelha											OG	F	M	Atl, BR	R						
<i>Hymenops perspicillatus</i> (Gmelin, 1789)	<i>Hymenops perspicillatus</i>	viuvinha-de-óculos											IG	A	M		R	MPR					
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno	1,2			X					X		IG	N	L		R						
<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1816)	<i>Xolmis cinereus</i>	primavera	2								X		IG	N	L		R						
<i>Xolmis velatus</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Xolmis velatus</i>	noivinha-branca	1,2								X	X	IG	N	M		R						
<i>Xolmis irupero</i> (Vieillot, 1823)	<i>Xolmis irupero</i>	noivinha											IG	N	L		R				DD		
<i>Xolmis dominicanus</i> (Vieillot, 1823)	<i>Xolmis dominicanus</i>	noivinha-de-rabo-preto											IG	N	L		R				EN	VU	VU
<i>Muscipipra vetula</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Muscipipra vetula</i>	tesoura-cinzenta	1,2				X						IC	F	M	Atl	R						
Família Vireonidae																							
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	1,2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OG	F	L		R						
<i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822	<i>Hylophilus poicilotis</i>	verdinho-coroado	1,2	X	X	X	X						IC	F	M	Atl	R						
<i>Hylophilus pectoralis</i> Sclater, 1866	<i>Hylophilus pectoralis</i>	vite-vite-de-cabeça-cinza	2								X		IC	F	L		R						
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Vireo olivaceus</i>	juruviana-boreal											OF	F	L		VN	MGT					
<i>Vireo chivi</i> (Vieillot, 1817)	<i>Vireo chivi</i>	juruviana	1,2	X	X	X	X			X			OF	F	L		R	MPR					
Família Corvidae																							
<i>Cyanocorax cyanomelas</i> (Vieillot, 1818)	<i>Cyanocorax cyanomelas</i>	gralha-do-pantanal	1,2								X		OG	F	L		R				VU		
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (Vieillot, 1818)	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	gralha-azul	1,2	X									OF	F	M	Atl	R					NT	
<i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823)	<i>Cyanocorax cristatellus</i>	gralha-do-campo											OG	N	M	Cer	R						
<i>Cyanocorax chrysops</i> (Vieillot, 1818)	<i>Cyanocorax chrysops</i>	gralha-picaça	1,2				X	X	X		X		OF	F	L		R						
Família Hirundinidae																							
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	1,2	X		X	X				X		IG	N	L		R						
<i>Alopochelidon fucata</i> (Temminck, 1822)	<i>Alopochelidon fucata</i>	andorinha-morena	2								X		IG	N	M		R						
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	1,2	X		X	X				X		IG	N	L		R	MPR					
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	1			X					X		IG	N	L		R	MPR					
<i>Progne subis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Progne subis</i>	andorinha-azul											IG	F	L		VN	MGT			DD		
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	<i>Progne chalybea</i>	andorinha-grande	1								X		IG	N	L		R	MPR*					
<i>Progne elegans</i> Baird, 1865	<i>Progne elegans</i>	andorinha-do-sul											IG	N	L		VS#	MGT			DD		
<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio	1,2								X	X	IG	A	L		R						
<i>Tachycineta leucorhoa</i> (Vieillot, 1817)	<i>Tachycineta leucorhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco	1,2			X					X		IG	N	L		R						
<i>Tachycineta leucopyga</i> (Meyen, 1834)	<i>Tachycineta leucopyga</i>	andorinha-chilena											IG	N	L		VS	MGT					
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Riparia riparia</i>	andorinha-do-barranco											IG	N	L		VN	MGT					
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-de-bando											IG	N	L		VN	MGT					
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i> (Vieillot, 1817)	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	andorinha-de-dorso-acanelado											IG	N	L		VN	MPR					
Família Troglodytidae																							
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	1,2	X		X	X			X	X		IG	N	L		R						

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação								
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES			
<i>Cistothorus platensis</i> (Latham, 1790)	<i>Cistothorus platensis</i>	corruíra-do-campo											IG	N	L		R					EN				
<i>Campylorhynchus turdinus</i> (Wied, 1831)	<i>Campylorhynchus turdinus</i>	catatau	1,2								X	X	IG	F	L		R									
<i>Pheugopedius genibarbis</i> (Swainson, 1838)	<i>Pheugopedius genibarbis</i>	garrinchão-pai-avô	1								X		ISB	F	L		R									
<i>Cantorchilus leucotis</i> (Lafresnaye, 1845)	<i>Cantorchilus leucotis</i>	garrinchão-de-barriga-vermelha	1,2								X		ISB	F	L		R									
<i>Cantorchilus guarayanus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Cantorchilus guarayanus</i>	garrincha-do-oeste											ISB	F	L		R									
<i>Cantorchilus longirostris</i> (Vieillot, 1819)	<i>Cantorchilus longirostris</i>	garrinchão-de-bico-grande	1	X									ISB	F	L	BR	R									
Família Donacobiidae																										
<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Donacobius atricapilla</i>	japacanim	1,2								X	X	IG	A	M		R									
Família Polioptilidae																										
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	chirito	1	X									ISB	F	L		R									
<i>Polioptila lactea</i> Sharpe, 1885	<i>Polioptila lactea</i>	balança-rabo-leitoso											IC	F	M	Atl	R					NT			NT	
<i>Polioptila dumicola</i> (Vieillot, 1817)	<i>Polioptila dumicola</i>	balança-rabo-de-máscara											IG	F	M		R									
Família Turdidae																										
<i>Turdus flavipes</i> Vieillot, 1818	<i>Turdus flavipes</i>	sabiá-una	1,2	X	X								FG	F	M		R									
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-branco	1,2	X			X	X	X	X	X		OG	F	L		R									
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	1,2	X	X	X	X	X	X	X	X		OG	F	L		R									
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	1,2			X	X	X	X	X	X		FG	F	L		R									MPR
<i>Turdus subalaris</i> (Seeböhm, 1887)	<i>Turdus subalaris</i>	sabiá-ferreiro	1				X						FG	F	L	Atl	R									MPR
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	1,2	X	X	X	X	X					OF	F	M		R									
Família Mimidae																										
<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	1,2			X		X		X	X		OG	N	L		R									
<i>Mimus triurus</i> (Vieillot, 1818)	<i>Mimus triurus</i>	calhandra-de-três-rabos											OG	N	L		VS									MGT
Família Motacillidae																										
<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	<i>Anthus lutescens</i>	caminheiro-zumbidor	1								X	X	IG	N	L		R									
<i>Anthus correndera</i> Vieillot, 1818	<i>Anthus correndera</i>	caminheiro-de-espora											IG	N	L		R									MPR*
<i>Anthus nattereri</i> Sclater, 1878	<i>Anthus nattereri</i>	caminheiro-grande											IG	N	M		R						EN		VU	VU
<i>Anthus hellmayri</i> Hartert, 1909	<i>Anthus hellmayri</i>	caminheiro-de-barriga-acanelada											IG	N	L		R									
Família Passerellidae																										
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	1,2		X	X	X	X	X				GT	N	L		R									
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo	2							X	X		GT	N	L		R									
<i>Arremon semitorquatus</i> Swainson, 1838	<i>Arremon semitorquatus</i>	tico-tico-do-mato											OF	F	M	Atl, BR	R									
<i>Arremon flavirostris</i> Swainson, 1838	<i>Arremon flavirostris</i>	tico-tico-de-bico-amarelo	1,2							X	X	X		OF	F	M		R								
Família Parulidae																										
<i>Setophaga pitayumi</i> (Vieillot, 1817)	<i>Setophaga pitayumi</i>	mariquita	1,2	X	X	X	X	X	X		X		OF	F	M		R									

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação					
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES
<i>Setophaga fusca</i> (Statius Muller, 1776)	<i>Setophaga fusca</i>	mariquita-papo-de-fogo											OF	F	M		VN#	VAG					
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	1,2	X		X		X	X	X	X		IG	N	L		R						
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	1,2	X	X	X	X	X	X		X		ISB	F	M		R						
<i>Myiothlypis flaveola</i> Baird, 1865	<i>Myiothlypis flaveola</i>	canário-do-mato											ISB	F	M		R						
<i>Myiothlypis leucoblephara</i> (Vieillot, 1817)	<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador	1,2		X	X	X	X	X				ISB	F	M	Atl	R						
<i>Myiothlypis leucophrys</i> (Pelzeln, 1868)	<i>Myiothlypis leucophrys</i>	pula-pula-de-sobrancelha											ISB	F	M	Cer, BR	R						CR(RE)
<i>Myiothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)	<i>Myiothlypis rivularis</i>	pula-pula-ribeirinho	1,2	X									ISB	F	M	Atl	R						
Família Icteridae																							
<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	<i>Psarocolius decumanus</i>	japu											FG	F	M		R						DD
<i>Procacicus solitarius</i> (Vieillot, 1816)	<i>Procacicus solitarius</i>	iraúna-de-bico-branco	2							X			IC	F	L		R						VU
<i>Cacicus chrysopterus</i> (Vigors, 1825)	<i>Cacicus chrysopterus</i>	japuira	1,2		X	X	X						OF	F	M		R						
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	1,2	X		X		X	X		X		IC	F	L		R						
<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cacicus cela</i>	xexéu											FG	F	L		R						
<i>Icterus pyrrhopterus</i> (Vieillot, 1819)	<i>Icterus pyrrhopterus</i>	encontro	1,2							X	X		OG	F	M		R						
<i>Icterus croconotus</i> (Wagler, 1829)	<i>Icterus croconotus</i>	joão-pinto	1,2							X			FG	F	?		R						
<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto	2								X		OG	N	L		R						
<i>Amblyramphus holosericeus</i> (Scopoli, 1786)	<i>Amblyramphus holosericeus</i>	cardeal-do-banhado	1,2							X			OG	A	M		R						
<i>Agelasticus cyanopus</i> (Vieillot, 1819)	<i>Agelasticus cyanopus</i>	carretão	1,2							X			OG	A	M		R						
<i>Agelasticus thilius</i> (Molina, 1782)	<i>Agelasticus thilius</i>	sargento											OG	A	M		R						VU
<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi											OG	N	L		R						
<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819)	<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	chopim-do-brejo	1,2			X				X	X		OG	N	L		R						
<i>Agelaioides badius</i> (Vieillot, 1819)	<i>Agelaioides badius</i>	asa-de-telha											IG	N	L		R						
<i>Molothrus rufoaxillaris</i> Cassin, 1866	<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	chupim-azeviche											GT	N	L		R						
<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Molothrus oryzivorus</i>	iraúna-grande	1							X			FG	F	L		R						
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Molothrus bonariensis</i>	chupim	1,2							X	X		IG	F	L		R						
<i>Sturnella superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	<i>Sturnella superciliaris</i>	polícia-inglesa-do-sul	1,2	X						X	X		OG	N	L		R						
<i>Dolichonyx oryzivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	triste-pia											IG	N	L		VN	MGT					
Família Mitrospingidae																							
<i>Orthogonys chloricterus</i> (Vieillot, 1819)	<i>Orthogonys chloricterus</i>	catirumbava											OF	F	M	Atl, BR	R						
Família Thraupidae																							
Orchesticinae																							
<i>Orchesticus abeillei</i> (Lesson, 1839)	<i>Orchesticus abeillei</i>	sanhaço-pardo											OF	F	M	Atl, BR	R						NT
Thraupinae																							
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	<i>Pipraeidea melanonota</i>	saíra-viúva	1,2		X	X	X						OG	F	L		R						
<i>Pipraeidea bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Pipraeidea bonariensis</i>	sanhaço-papalaranja											FG	F	L		R						
<i>Neothraupis fasciata</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Neothraupis fasciata</i>	cigarra-do-campo											OG	N	M		R						CR
<i>Stephanophorus diadematus</i> (Temminck, 1823)	<i>Stephanophorus diadematus</i>	sanhaço-frade	1,2		X	X	X						OF	F	L		R						
<i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Cissopis leverianus</i>	tietinga	1,2					X	X				FG	F	L		R						
<i>Schistochlamys melanopsis</i> (Latham, 1790)	<i>Schistochlamys melanopsis</i>	sanhaço-de-coleira	1,2							X			OG	F	L		R						

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação					
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES
<i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817)	<i>Schistochlamys ruficapillus</i>	bico-de-veludo											OG	F	L		R						
<i>Paroaria coronata</i> (Miller, 1776)	<i>Paroaria coronata</i>	cardeal											OG	N	L		R					II	
<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Paroaria dominicana</i>	cardeal-do-nordeste											OG	N	L	BR	R						
<i>Paroaria capitata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Paroaria capitata</i>	cavalaria	1,2							X			OG	N	L		R					II	
<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776)	<i>Tangara seledon</i>	saíra-sete-cores	1,2	X									FG	F	M	Atl	R						
<i>Tangara cyanocephala</i> (Statius Muller, 1776)	<i>Tangara cyanocephala</i>	saíra-militar	1,2	X									FG	F	M	Atl	R						
<i>Tangara desmaresti</i> (Vieillot, 1819)	<i>Tangara desmaresti</i>	saíra-lagarta	1		X								FG	F	M	Atl, BR	R						
<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tangara sayaca</i>	sanhaço-cinzento	1,2	X	X	X		X	X	X	X		OG	F	L		R						
<i>Tangara cyanoptera</i> (Vieillot, 1817)	<i>Tangara cyanoptera</i>	sanhaço-de-encontro-azul	1	X	X								FG	F	M	Atl, BR	R					NT	
<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1821)	<i>Tangara palmarum</i>	sanhaço-do-coqueiro											FG	F	L		R						
<i>Tangara ornata</i> (Sparman, 1789)	<i>Tangara ornata</i>	sanhaço-de-encontro-amarelo											FG	F	M	Atl, BR	R						
<i>Tangara peruviana</i> (Desmarest, 1806)	<i>Tangara peruviana</i>	saíra-sapucaia											FG	F	M	Atl, BR	R	MPR			VU	VU	
<i>Tangara preciosa</i> (Cabanis, 1850)	<i>Tangara preciosa</i>	saíra-preciosa	1,2		X	X	X						FG	F	L		R						
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tangara cayana</i>	saíra-amarela	2							X			FG	F	M		R						
Nemosiinae																							
<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	<i>Nemosia pileata</i>	saíra-de-chapéu-preto	1,2							X	X		OG	F	L		R						
Diglossinae																							
<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho	1,2		X		X	X	X	X			OG	F	L		R						
<i>Conirostrum bicolor</i> (Vieillot, 1809)	<i>Conirostrum bicolor</i>	figuinha-do-mangue											OF	F	L		R					NT	
<i>Sicalis citrina</i> Pelzel, 1870	<i>Sicalis citrina</i>	canário-rasteiro											GT	N	M		R						
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra	1,2	X		X				X	X		GT	N	L		R						
<i>Sicalis luteola</i> (Sparman, 1789)	<i>Sicalis luteola</i>	tipio	1,2			X				X			GT	N	L		R						
<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	<i>Haplospiza unicolor</i>	cigarra-bambu	1,2		X		X						GTQ	F	M	Atl	R						
Hemithraupinae																							
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chlorophanes spiza</i>	saí-verde											FG	F	M		R						
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Hemithraupis guira</i>	saíra-de-papo-preto	1,2				X	X	X	X	X		OF	F	L		R						
<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	saíra-ferrugem	1,2	X				X					OF	F	L	Atl, BR	R						
Tachyphoniinae																							
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	1,2			X		X	X	X	X		GT	N	L		R						
<i>Eucometis penicillata</i> (Spix, 1825)	<i>Eucometis penicillata</i>	pipira-da-taoca	1,2								X		OF	F	M		R						
<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	<i>Trichothraupis melanops</i>	tiê-de-topete	1,2	X	X		X	X	X				OF	F	M		R						
<i>Coryphospingus cucullatus</i> (Statius Muller, 1776)	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	tico-tico-rei	1,2					X	X				GT	N	L		R						
<i>Lanio cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Lanio cristatus</i>	tiê-galo	1	X									OF	F	M		R						
<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Tachyphonus rufus</i>	pipira-preta											OG	F	L		R						
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto	1,2	X	X	X	X	X	X				OG	F	L	Atl	R						
<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Ramphocelus bresilius</i>	tiê-sangue											OG	F	L	Atl, BR	R						
<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	<i>Ramphocelus carbo</i>	pipira-vermelha	1,2							X			OG	F	L		R						
Charitospizinae																							

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação					
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT	CITES
<i>Charitospiza eucosma</i> Oberholser, 1905	<i>Charitospiza eucosma</i>	mineirinho											GT	N	H	Cer	R					NT	
Dacninae																							
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	1,2					X		X	X	FG	F	L		R	MPR*						
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	saíra-beija-flor										FG	F	L		R							
<i>Dacnis nigripes</i> Pelzeln, 1856	<i>Dacnis nigripes</i>	saí-de-ernas-pretas										OF	F	M	Atl, BR	R	MPR*		VU			NT	
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	1,2	X					X			OG	F	L		R							
Coerebinae																							
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	1,2	X	X							NE	F	L		R							
<i>Tiaris obscurus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Tiaris obscurus</i>	cigarra-parda										GTQ	N	L		VO#	VAG						
<i>Tiaris fuliginosus</i> (Wied, 1830)	<i>Tiaris fuliginosus</i>	cigarra-preta										GTQ	F	L		R							
Sporophilinae																							
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sporophila lineola</i>	bigodinho	1							X		GT	N	L		R	MPR						
<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	<i>Sporophila frontalis</i>	pioxó	2		X							GTQ	F	M	Atl	R			EN	VU	VU		
<i>Sporophila falcirostris</i> (Temminck, 1820)	<i>Sporophila falcirostris</i>	cigarra										GTQ	F	M	Atl	R			EN	VU	VU		
<i>Sporophila plumbea</i> (Wied, 1830)	<i>Sporophila plumbea</i>	patativa										GT	N	M		R			EN				
<i>Sporophila beltoni</i> Repenning & Fontana, 2013	<i>Sporophila beltoni</i>	patativa-tropeira										GT	N	?	BR	R	MGT		EN	VU	VU		
<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)	<i>Sporophila collaris</i>	coleiro-do-brejo	1,2						X	X		GT	N	L		R							
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano										GT	N	L		R			DD				
<i>Sporophila ardesiaca</i> (Dubois, 1894)	<i>Sporophila ardesiaca</i>	papa-capim-de-costas-cinzas										GT	N	M	Atl, BR	R							
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho	1,2	X	X	X	X	X	X	X	X	GT	N	L		R	MPR*						
<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)	<i>Sporophila leucoptera</i>	chorão	1,2							X		GT	N	L		R			VU				
<i>Sporophila bouvreuil</i> (Statius Muller, 1776)	<i>Sporophila bouvreuil</i>	caboclinho										GT	N	M		R	MPR						
<i>Sporophila pileata</i> (Sclater, 1865)	<i>Sporophila pileata</i>	caboclinho-branco										GT	N	M		R			EN				
<i>Sporophila hypoxantha</i> Cabanis, 1851	<i>Sporophila hypoxantha</i>	caboclinho-de-barriga-vermelha										GT	N	M		R	MPR		VU	VU			
<i>Sporophila ruficollis</i> Cabanis, 1851	<i>Sporophila ruficollis</i>	caboclinho-de-papo-escuro										GT	N	M		VS#	MPR*			VU	NT		
<i>Sporophila palustris</i> (Barrows, 1883)	<i>Sporophila palustris</i>	caboclinho-de-papo-branco										GT	N	M		R	MGT		CR	VU	EN		
<i>Sporophila hypochroma</i> Todd, 1915	<i>Sporophila hypochroma</i>	caboclinho-de-sobre-ferrugem										GT	N	M		VS#	MGT					NT	
<i>Sporophila cinnamomea</i> (Lafresnaye, 1839)	<i>Sporophila cinnamomea</i>	caboclinho-de-chapéu-cinzento										GT	N	M		R	MGT		CR			VU	
<i>Sporophila melanogaster</i> (Pelzeln, 1870)	<i>Sporophila melanogaster</i>	caboclinho-de-barriga-preta										GT	A	M	Atl, BR	R	MGT		EN	VU	NT		
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Sporophila angolensis</i>	curió	1							X	X	GT	N	L		R			VU				
Emberizoidinae																							
<i>Coryphasiza melanotis</i> (Temminck, 1822)	<i>Coryphasiza melanotis</i>	tico-tico-de-máscara-negra										OG	N	H		R			CR	EN	VU		
<i>Embernagra platensis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Embernagra platensis</i>	sabiá-do-banhado	1,2			X				X		OG	N	L		R							
<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo										OG	N	L		R							
<i>Emberizoides ypiranganus</i> Ihering & Ihering, 1907	<i>Emberizoides ypiranganus</i>	canário-do-brejo	1,2			X						OG	A	M		R							
Saltatorinae																							
<i>Saltatricula atricollis</i> (Vieillot, 1817)	<i>Saltatricula atricollis</i>	batuqueiro										IG	N	M	Cer	R							
<i>Saltator coerulescens</i> Vieillot, 1817	<i>Saltator coerulescens</i>	sabiá-gongá										OG	N	L		R							
<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro	1,2		X	X	X	X	X			OG	F	L		R							

Nome do Táxon	Espécie	Nome em português	Campanha	Unidade amostral								Aspectos ecológicos						Status de conservação				
				UA 1	UA 2	UA 3	UA 4	UA 5	UA 6	UA 7	UA 8	Guilda	Habitat preferencial	Sensibilidade a distúrbios no habitat	Endemismos	Status de ocorrência	Migratórias	Cinegéticas	PR	MS	BR	INT
<i>Saltator maxillosus</i> Cabanis, 1851	<i>Saltator maxillosus</i>	bico-grosso	1,2		X		X		X			OF	F	M	Atl	R						
<i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800)	<i>Saltator fuliginosus</i>	bico-de-pimenta	1,2	X								OF	F	M	Atl	R						
Poospizinae																						
<i>Poospiza nigrorufa</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Poospiza nigrorufa</i>	quem-te-vestiu	1,2			X					X	OG	N	M		R						
<i>Poospiza thoracica</i> (Nordmann, 1835)	<i>Poospiza thoracica</i>	peito-pinhão										OF	F	M	Atl, BR	R				NT		
<i>Microspingus cabanisi</i> Bonaparte, 1850	<i>Microspingus cabanisi</i>	quete-do-sul	1,2		X	X	X					OF	F	M		R						
<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Thlypopsis sordida</i>	saí-canário										OG	F	L		R						
<i>Pyrrhocomma ruficeps</i> (Strickland, 1844)	<i>Pyrrhocomma ruficeps</i>	cabecinha-castanha	1,2		X		X	X				ISB	F	M	Atl	R						
<i>Cypsnagra hirundinacea</i> (Lesson, 1831)	<i>Cypsnagra hirundinacea</i>	bandoleta										OG	N	H		R					CR(RE)	
<i>Donacospiza albifrons</i> (Vieillot, 1817)	<i>Donacospiza albifrons</i>	tico-tico-do-banhado	1,2			X					X	OG	N	L		R						
Família Cardinalidae																						
<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)	<i>Piranga flava</i>	sanhaço-de-fogo										OG	F	L		R					NT	
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	<i>Habia rubica</i>	tiê-de-bando	1,2	X				X	X			OF	F	H		R						
<i>Pheucticus aureoventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Pheucticus aureoventris</i>	rei-do-bosque										OF	F	L		VA (O)		MGT				
<i>Amaurospiza moesta</i> (Hartlaub, 1853)	<i>Amaurospiza moesta</i>	negrinho-do-mato	1,2				X	X				GTQ	F	M	Atl	R						
<i>Cyanoloxia glaucocaeerulea</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	<i>Cyanoloxia glaucocaeerulea</i>	azulinho	1,2			X						OF	F	L		R		MPR*				
<i>Cyanoloxia brissonii</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Cyanoloxia brissonii</i>	azulão										FG	F	M		R						
Família Fringillidae																						
Carduelinae																						
<i>Spinus magellanicus</i> (Vieillot, 1805)	<i>Spinus magellanicus</i>	pintassilgo	1		X	X						GT	N	L		R						
Euphoniinae																						
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	1,2					X	X	X	X	FG	F	L		R						
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo	1,2	X	X							FG	F	L		R						
<i>Euphonia chalybea</i> (Mikan, 1825)	<i>Euphonia chalybea</i>	cais-cais	1,2			X	X					FG	F	M	Atl	R					NT	
<i>Euphonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818)	<i>Euphonia cyanocephala</i>	gaturamo-rei										FG	F	L		R						
<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	<i>Euphonia pectoralis</i>	ferro-velho	1,2	X	X							FG	F	M	Atl	R						
<i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822)	<i>Chlorophonia cyanea</i>	gaturamo-bandeira	2					X				FG	F	M		R						
Família Estrildidae																						
<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Estrilda astrild</i>	bico-de-lacre										GT	N	L	Exo	R						
Família Passeridae																						
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Passer domesticus</i>	pardal	1,2								X	X	GT	N	L	Exo	R					

LEGENDA: STATUS DE CONSERVAÇÃO: Para as espécies ameaçadas ou quase ameaçadas de extinção em nível estadual (PARANÁ, 2018), nacional (ICMBIO, 2018) ou mundial (IUCN, 2021): CR – criticamente em perigo; EN – em perigo; VU – vulnerável; NT – quase ameaçada; DD – dados insuficientes; RE – regionalmente extinta; PEX – provavelmente extinta. Para as espécies utilizadas no tráfico de animais silvestres é a apresentado o apêndice (I, II ou III) da CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção). CAMPANHA: Etapa de execução: 1 – campanha I; 2 – campanha II; GUILDAS: Guilda de cada espécie: OF - onívoro florestal; FC - frugívoro de copa; GTQ - granívoro de taquarais; ITG - insetívoro de troncos e galhos; IC - insetívoro de copa; ISB - insetívoro de sub-bosque; ITQ - insetívoro de taquarais; OG - onívoro generalista; FG – frugívoro; HÁBITAT: Habitat preferencial (adaptado de Stotz et al. 1996): A - aquático; F - florestal; N - áreas abertas; SENSIBILIDADE: Sensibilidade a perturbações ambientais segundo Stotz et al. 1996): H - alta; M - média; L – baixa; ENDEMISMO: Endemismo da Mata Atlântica (Atl - segundo Bencke et al. 2006), do Cerrado (Cer - Segundo Silva 1995), do Brasil (BR - segundo Piacentini et al. 2015) ou espécie exótica (Exo); STATUS DE OCORRÊNCIA: Ocorrência conforme Piacentini et al. (2015): R = residente (evidências de reprodução no país disponíveis); VS = visitante sazonal oriundo do sul do continente; VN = visitante sazonal oriundo do hemisfério norte; VO = visitante sazonal oriundo de áreas a oeste do território brasileiro; VA = vagante (espécie de ocorrência aparentemente irregular no Brasil; pode ser um migrante regular em países vizinhos, oriundo do sul [VA (S)], do norte [VA (N)] ou de oeste [VA (O)], ou irregular num nível mais amplo [VA]); D = status desconhecido; # = status presumido mas não confirmado; MIGRATÓRIAS: Espécie migratória (segundo Somenzari et al. 2018): MGT - Migratória; MPR - parcialmente migratória; VAG - vagante; ND - não-definida. Espécies com asteriscos são consideradas como prioritárias para futuros estudos; CINEGÉTICAS: Espécies cinegéticas (obs. pessoal.). Informações complementares são apresentadas no item “Status de conservação”.

Fonte: Elaborado pela Fipe.