

## **Apêndice 7.7.7-1**

### **Correlação das Classes (Ordem/Grande Grupos) do novo Sistema de Solos e as Anteriormente Utilizadas**

**Correlação das Classes (Ordem/Grande Grupos) do novo Sistema de Solos e as  
Anteriormente Utilizadas**

---

**SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO ANTERIORMENTE USADA PELA EMBRAPA CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS, 5º SOLOS, E QUE TAMBÉM FOI UTILIZADA PELO PROJETO RADAM EDIÇÃO, SPI- BRASÍLIA, 1999. (2º E 3º APROXIMAÇÃO).**

---

Argissolos	Podzólico Vermelho-Amarelo Tb, pequena parte de Terra Roxa Estruturada e Terra Bruna Estruturada com gradiente para B textural, e Podzólico Vermelho-Escuro Tb com B textural, e o Podzólico Amarelo.
Cambissolos	Cambissolo Eutróficos, Distróficos e Álicos Ta e Tb. Exceto os com horizonte A chernozêmico e B incipiente Eutróficos Ta.
Espodossolos	Podzol, Podzol Hidromórfico.
Gleissolos	Glei Pouco Húmico, Glei Húmico, Parte dos Hidromórfico Cinzento sem mudança textural abrupta, Glei Tiomórfico e Solonchak com horizonte glei.
Latossolos	Latossolos, excetuadas algumas modalidades identificadas, como Latossolos Plínticos.
Luvissolos	Podzólico Vermelho-Amarelo Ta, Podzólico Bruno-Acinzentado Eutrófico Ta, Podzólico Vermelho-Escuro Eutrófico Ta e Bruno Não Cálculo.
Neossolos	Litossolos, Solos Litólicos, Regossolos, Solos Aluviais e Areias Quartzozas Distróficas, Marinhas e Hidromórficas.
Nitossolos	Terra Roxa Estruturada, Terra Roxa Estruturada Similar, Terra Bruna Estruturada, Terra Bruna Estruturada Similar, e alguns Podzólicos Vermelho-Escuros Tb e alguns Podzólicos Vermelho-Amarelos Tb.
Organossolos	Solos Orgânicos, Solos Semi-Orgânicos, Solos Tiomórficos Turfosos com horizonte hístico com 30 cm ou mais de espessura.
Planossolos	Planossolos, Solonetz-Solodizado e Hidromórficos Cinzentos que apresentam mudança textural abrupta.
Plintossolos	Lateritas Hidromórficas, parte dos Podzólicos Plínticos, parte dos Glei Húmico e Glei Pouco Húmico Plínticos e alguns dos Latossolos Plínticos.

---