

Figura 6.1.10.3.54 - Perfis longitudinais da Temperatura da água no braço Parnaíba (principal) - Cenário sem remoção – Período após o início da simulação: (A) 1 dia; (B) 25 dias.





Figura 6.1.10.3.54 (Continuação) - Perfis longitudinais da Temperatura da água no braço Parnaíba (principal) - Cenário sem remoção – Período após o início da simulação: (C) 50 dias; (D) 75 dias.




Figura 6.1.10.3.54 (Continuação) - Perfis longitudinais da Temperatura da água no braço Parnaíba (principal) - Cenário sem remoção – Período após o início da simulação: (E) 100 dias.





Figura 6.1.10.3.55 - Perfis longitudinais do OD no braço Parnaíba (principal) - Cenário sem remoção – Período após o início da simulação: (A) 1 dia; (B) 25 dias.





Figura 6.1.10.3.55 (Continuação) - Perfis longitudinais do OD no braço Parnaíba (principal) - Cenário sem remoção – Período após o início da simulação: (C) 50 dias; (D) 75 dias.




Figura 6.1.10.3.55 (Continuação) - Perfis longitudinais do OD no braço Parnaíba (principal) - Cenário sem remoção – Período após o início da simulação: (E) 100 dias.