ÍNDICE

9. Bibliografia 1/81

9. BIBLIOGRAFIA

A

AB'SABER, A. N. A organização Natural das paisagens Inter e Subtropicais Brasileiras. Geomorfologia 41. Universidade de São Paulo. Instituto de Geografia. 1973.

AB' SABER, A. N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 159p. 2003.

ABRUNHOSA, P.A.; WOGEL, H. & POMBAL JR., J.P. Herpetological Journal, Vol. 16, Pp. 115-122. Anuran Temporal Occupancy in a Temporary Pond From the Atlantic Rain Forest, South-Eastern Brazil. 2006.

AB' SABER A. N. & Bernardes N. Vale do Paraiba, Serra da Mantiqueira e arredores de São Paulo. In: Congresso Internacional de Geografia, XVIII, Rio de Janeiro. *Guia de Excursões* (4). Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Geografia, 304 p. 1958.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS & FUNDAÇÃO COPPETEC. Projeto gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Plano de recursos hídricos para a fase inicial da cobrança na bacia do rio Paraíba do Sul. Medidas a serem tomadas, programs a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, para atendimento das metas. PGRH-RE-010-R0 – Volume 5, 2002.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS & FUNDAÇÃO COPPETEC. Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul: análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo. Volume 2, 57p. 2002.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Cadernos Temáticos da ANEEL 4 – Tarifas de Fornecimento de Energia Elétrica. ANEEL. Brasília. 2005.

AGOSTINHO, A. A. Pesquisas, monitoramento e manejo da fauna aquática em empreendimentos hidrelétricos. In: COMASE. Seminário sobre fauna aquática e o setor elétrico brasileiro: fundamentos, reuniões temáticas preparatórias: caderno 1- Fundamentos, Rio de Janeiro, ELETROBRÁS. p.38-59. 1994.

AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C. & PELICICE, F. M. 2007. Ecologia e manejo de recursos pesqueiros em reservatórios do Brasil. Maringá: Eduem. 501p.

AGOSTINHO, A. A.; THOMAZ, S. M & GOMES, L. C. 2005. Conservação da biodiversidade em águas continentais do Brasil. Megadiversidade, 1(1): 70-78.

AGOSTINHO, A.A.; HAHN, N.S.; GOMES, L.C. & BINI, L.M. 1997 Estrutura trófica. pp. 229-248 *in*.: Vazzoler, A. E. A. M.; Agostinho, A.A. & Hahn, N.S. (eds.) A planície de inundação do alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos. Editora da Universidade Estadual de Maringá, Maringá.

AGUIAR, G. M.; MEDEIROS, W. M.; DE MARCO, T. S.; SANTOS, S. C.; GAMBARDELLA, S. Ecologia dos flebotomíneos da Serra do Mar, Itaguaí, Rio de Janeiro, Brasil. I – A fauna flebotomínica e prevalência pelo local e tipo de captura (Diptera, Psychodidae, Phlebotominae). Cadernos de Saúde Pública, v. 12, p. 195–206, 1996.

AGUIAR, G. M.; MEDEIROS, W. M.; DE MARCO, T. S.; SANTOS, S. C.; GAMBARDELLA, S. Ecologia dos flebotomíneos da Serra do Mar, Itaguaí, Rio de Janeiro, Brasil. I – A fauna flebotomínica e prevalência pelo local e tipo de captura (Diptera, Psychodidae, Phlebotominae). Cadernos de Saúde Pública, v. 12, p. 195–206, 1996.

AGUIAR, K, D. 2008. Influência de uma barragem sobre atributos ecológicos da comunidade e biologia reprodutiva de peixes do rio Paraíba do Sul, UHE Ilha dos Pombos, Rio de Janeiro, Brasil. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná. 120p.

ALARCON, G.G. & SIMÕES-LOPES, P.C. 2004. The neotropical otter *Lontra longicaudis* feeding habits in a marine coastal area, Southern Brazil. IUCN Otter Special Group Bull. 21(1): 24-30.

ALBERTONI, E. F., PALMA-SILVA, C., ESTEVES, F. A,. Natural diet of three species of shrimp in a tropical coastal lagoon. Braz. arch. biol. technol., 46(3): 395-403, 2003.

ALHO, C. J. R. E L. F. M. PÁDUA. 1982. Reproductive parameters and nesting behavior of the Amazon turtle *Podocnemis expansa* (Testudinata, Pelomedusidae) in Brazil. *Canadian Journal of Zoology 60*: 97–103.

ALLAN, J. D., D. L. ERICKSON AND J. FAY. 1997, The influence of current land use on stream integity at multiple spatial scales. *Freshwater Biology* 37: 149-161.

ALLAN, J.D.; CASTILLO, M.M. 2007. Stream Ecology: struture and function of running waters. Springer, Dordrecht.

ALMANAQUE. LAEMMERT. 1857. Disponível na página. http://www.crl.edu/content. Acesso. Maio.2009.

ALMEIDA, F.F.M. de, HASUI Y., BRITO-NEVES B.B DE, FUCK R. A. 1981. Brazilian Structural Provinces: an introduction. *Earth-Sci. Ver,* p. 1-29.

ALMEIDA, F.F.M. The system of continental rifts bordering the Santos basin, Brazil, An. Academia Brasileira de Ciências, n.48 (supl.), p.15-26, 1976.

ALMEIDA-GOMES ET AL. 2008 MAURICIO ALMEIDA-GOMES, DAVOR VRCIBRADIC, CARLA C. SIQUEIRA, MARA C. KIEFER, THAíS KLAION, PATRíCIA A. SANTOS, DENISE NASCIMENTO, CRISTINA V. ARIANI, VITOR N.T. BORGES-JUNIOR, RICARDO F. FREITAS-FILHO, MONIQUE VAN-SLUYS and CARLOS F.D. ROCHA. Herpetofauna of an Atlantic rainforest area (Morro S.o Jo.o) in Rio de Janeiro State, Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências (2008) 80(2): 1-10.

ALMEIDA-GOMES, M.; VRCIBRADIC, D.; SIQUEIRA, C.C., KIEFER, M.C.; KLAION, T.; SANTOS, P.A.; NASCIMENTO, D.; ARIANI, C.V.; BORGES-JUNIOR, V.N.T.; FREITAS-FILHO, R.F.; VAN-SLUYS, M. & ROCHA, C.F.D. Herpetofauna of an Atlantic rainforest area (Morro S.o Jo.o) in Rio de Janeiro State, Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências (2008) 80(2): 1-10.

ALVES, C. B. M. & VIEIRA, F. 1996. Espécies exóticas de peixes e sua ocorrência nas bacias hidrográficas de Minas Gerais. In: Resumos. IX SIMBRAQ Simpósio Brasileiro de Aquicultura. p155

ALVES, C.B.M., VONO, V. & F. VIEIRA 1999. Presence of the walking catfish *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) (Siluriformes; Clariidae) in Minas Gerais state hydrographic basins, Brazil. *Revista Brasileira de Zoologia*, 16(1): 259-263

ALVES, j. r. c. Espécies de *Lutzomyia* França (Diptera: Psychodidae, Phlebotominae) em Área de Leishmaniose Tegumentar no Município de Carmo, RJ. Neotropical Entomology, v. 36, p. 593–596, 2007.

ALVES, M. A. S. 2007. Sistemas de migrações de aves em ambientes terrestres no Brasil: exemplos, lacunas e propostas para o avanço do conhecimento. *Revista Brasileira de Ornitologia*, 15(2), 231-238.

ALVES, M. A. S.; PACHECO, J. F.; Gonzaga, L. A. P.; Cavalcanti, R. B.; Raposo, M. A.; Yamashita, C.; Maciel, N. C. & Castanheira, M. 2000. Aves. *In*: Bergallo, H. G.; Rocha, C. F. D.; Alves, M. A. S. & Van Sluys, M. *A fauna ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: EdUERJ. p. 113-124.

ALVES, M. A. S.; SILVA, J. M. C. & COSTA, E. S. 2008. Brazilian ornithology: history and current trends. Ornitologia Neotropical, 19: 391-399.

AMARAL, KAREN J. ROSMAN, P.C.C. AZEVEDO, JOSÉ P.S. (2004). Estuário do Rio Macaé: Modelagem Computacional como Ferramenta para o Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos. Mecánica Computacional Vol.XXIII,pp.1167-1185. G.Buscaglia, E.Dari, O.Zamonsky (Eds.) Bariloche, Argentina, November 2004.

AMORIM NETO, Silvino e ANDRADE, Wander Eustáquio de Bastos. A cultura do arroz irrigado no Estado do Rio de Janeiro. Niterói: PESAGRO-RIO, 2008. 100p.

ANA (2008). Relatório de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

ANA. 2005. Disponibilidades e demandas de recursos hídricos no Brasil. Estudo Técnico. Caderno de recursos hídricos. Brasília: Agência Nacional das Águas. 123p.

ANDRADE, D.R. & VIDAL JR., M.V. 1991 - Novas observações sobre a desova induzida do piau-vermelho (*Leporinus copelandii*) Steindachner, 1875). In: Resumos do IX Encontro Anual de Aquicultura. Associação Mineira de Aquicultura (AMA). pg. 34.

ANDRIAN, I. F.; DÓRIA, C. R. C.; Torrente, G. & Ferretti, C. M. L. 1994. Espectro alimentar e similaridade na composição da dieta de quatro espécies de *Leporinus* (Characiformes, Anostomidae) do rio Paraná (22°10'- 22°50'S / 53°10'-53°40'W), Brasil. Revista UNIMAR, 16(3): 97-106.

APG (Angiosperm Phylogeny Group) II. 2003. an update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Bot. J. Linneam Soc.141:

APHA – American Public Health Association, AWWA – American Water Works Association, WPCF – Water Polution Control Federation. 2005. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21ª Ed. Washington, DC.

ARAUJO, F. G. 1998. Adaptação do Índice de Integridade Biótica Usando A Comunidade de Peixes do Rio Paraíba do Sul. Revista Brasileira de Biologia, 58 (4): 547-558.

ARAÚJO, F.G. 1996. Composição e estrutura da comunidade de peixes do médio e baixo rio Paraíba do Sul, RJ. Rev. Brasil. Biol. 56(1):111-126

Araújo, J. R. S. & G. W. Nunan. 2005. Ictiofauna do rio Paraíba do Sul: danos ambientais e sociais causados por barragens, hidrelétricas e poluição no trecho fluminense. Rio de Janeiro, CPDMA-ALERJ, 59p.

ARAÚJO; C.G.A. FERNANDES; E.C.N. RUBIÃO & M. VAN SLUYS. 2007. A survey of the leaf-litter frog assembly from an Atlantic forest area (Reserva Ecológica de Guapiaçu) in Rio de Janeiro State, Brazil, with an estimate of frog densities. Tropical Zoology 20:99-108.

Araújo-Lima, C. A. R. M.; Agostinho, A. A. & Fabré, N. N. 1995 Trophic aspects of fish communities in brazilian rivers and reservoirs. pp 105-136 *in*: Tundisi, J.G.; Bicudo, C. E. M. & Tundisi, T. M. (eds.) Limnology in Brazil. ABC/SBL, Rio de Janeiro.

Arcila, D.A. & Ramírez, M. 2004. Captive Reproduction Of The Neotropical Otter In The Santa Fe Zoological Park In Medellin, Colombia. IUCN Otter Spec. Group Bull. 21(1): 16 – 18.

Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, v.63, n.4, p.685-705, out./dez.2005. ISSN 0365-4508. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DOS ANUROS EM UM BREJO DA RESERVA BIOLÓGICA DE DUAS BOCAS, SUDESTE DO BRASIL 1 (Com 5 figuras) GUSTAVO M. PRADO 2, 3, 4, 5 JOSÉ P. POMBAL JR.

Asquith, N. M., S. J. Wright, & M. J. Clauss. 1997. Does mammal community composition control recruitment in Neotropical Forests? Evidence from Panama. Ecology 78(3): 941-946.

Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul. Levantamento da Flora do Domínio das Ilhas Fluviais do Médio Inferior Rio Paraíba do Sul. Relatório Técnico Financeiro Final/mar.2004 – jun.2004. www.corredores.org.br. Acessado em 23.04.09.

Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul/Projeto Piabanha. "Diagnóstico da cadeia produtiva pesqueira do município de Itaocara e seus impactos na fauna aquática do Domínio das Ilhas Fluviais do Curso Médio Inferior Rio Paraíba do Sul". Março, 2007.

ASSUMPÇÃO, M. & E G. SUAREZ. Source mechanisms of moderate-size earthquakes and stress orientation in mid-plate South America. Geophys. J. Int., 92, 253-267, 1988.

ASSUMPÇÃO, M. & E J. A. V. VELOSO. Levantamento de intensidade do sismo da Serra do Tombador, MT, de 31.01.1955. Efeito no cálculo de risco sísmico no Mato Grosso, relatório técnico enviado à ELETRONORTE, 1986.

ASSUMPÇÃO, M. & E. P. W. BURTON. Atenuação de intensidades macrossísmicas no Brasil e estimativa do risco sísmico no Sudeste, manuscrito não publicado, 1986.

ASSUMPÇÃO, M. & J. W. C. ROSA. Sismicidade da região Centro-Oeste do Brasil, manuscrito não publicado, 1984.

ASSUMPÇÃO, M. Risco sísmico em Nova Ponte, relatório técnico enviado à CEMIG, não publicado, 1985.

ASSUMPÇÃO, M. Terremotos no Brasil. Ciência Hoje, maio/junho de 1983.

ASSUMPÇÃO, M., J. W. C. ROSA, J. A. V. VELOSO, &. P. FERNANDES e J. BERROCAL. Contribuição ao estudo da sismicidade do Centro-Oeste do Brasil, Anais 33º Congr. Bras. Geol., Rio de Janeiro, RJ, 4, 2051-2057, 1984.

ASSUMPÇÃO, M., T. M. LIMA E L. & A. R. TOMAS. O sismo de Araguapaz de 14.01.1986 e o Lineamento Transbrasiliano. Anais 34º Congr. Bras. Geol., Goiânia, GO, 2573-2580, 1986.

Assumpção, M.,. The regional Intraplate Stress Field in South America. 97vol. B811.889-1903. 92

Athiê, S. 2007. A observação de aves e o turismo ecológico. Biotemas, 20(4): 127-129.

Attias, N., D. S. L. Raíces, F. S. Pessôa, H. Albuquerque, T. Jordão-Nogueira, T. C. Modesto, & H. D. G. Bergallo. 2009. Potential distribution and new records of *Trinomys* species (Rodentia: Echimyidae) in Rio de Janeiro State Revista Brasileira de Zoologia 26(2): 305-315.

AVELAR, A.S. e COELHO NETTO,A.L. Fraturas e o desenvolvimento de unidades côncavas no médio vale do rio Paraíba do Sul. Revista Brasileira de Geociências, Rio de Janeiro, v. 22, n.2. 1992.

AVILLA, L.S.; WINCK, G.R.; MONSORES-PAIXÃO, M.; ALVES-LEITE, M.; SOUZA-CRUZ, F.; GIL, B.B.; FERREIRA, M.A.; JERONYMO, C.L.; ROSA, D.T.; MOTHÉ, D.; PESSOA, J.B.; LIMA, D.T.de; MONTEIRO, M.R.; COSTA, D.G. & TUSHOLSKA, L. 2007. Primeiros Mamíferos Quaternários encontrados em cavernas no Estado do Rio de Janeiro. *In*: II Jornada de Zoologia da Unirio: Um Olhar Sobre a Biodiversidade Animal, Livro de Resumos, 2ª Ed. pág 34.

B

BACKES P. & IRGANG, B. Mata Atlântica. As árvores e a paisagem. 1a Ed. Porto alegre: Editora Paisagem do sul, 2004.

BANCO MUNDIAL. Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Hidrelétricos no Brasil – Uma contribuição para o debate. Disponível em: http://www.mme.gov.br/site/menu/select_main_menu_item.do?channelId=16195. Acesso em 13 de dezembro de 2008.

BARANAUSKAS, K., MICKEVIČIUS, E., MACDONALD, S.M. & MASON, C.F. (1994). Otter distribution in Lithuania. Oryx, 28: 128-130.

Barbosa, F.A.R., E.M.M. Souza, F. Vieira, G.P.C.P. Renault, L.A. Rocha, P.M. Maia-Barbosa, S.M. Oberdá & S.A. Mingoti. 1997. Impactos antrópicos e biodiversidade aquática pp. 345-454 *In*: Paula, J.A. et al. (coord.). Biodiversidade, população e economia: uma região de mata atlântica. Belo Horizonte, UFMG/Cedeplar, ECMVS, PADCT/CIAMB

BARBOZA , M.; ROBERTO, P.; NUNES, M.; OSÓRIO, W.; CUNHA, S. P. Projeto de implantação da rede hierarquizada de monitoramento de anofelinos no estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Saúde, Subsecretaria de Estado de Saúde, Coordenação de Vigilância Ambiental, Coordenação de Projetos Especiais (http://www.saude.rj.gov.br/Docs/cvas/anofelinos.pdf), v. p. 2004.

BARELLA, W., PETRERE Jr., M., SMITH, W.S., DE ASSIS MONTAG, L.F. 2000. As relações entre as matas ciliares, os rios e os peixes. In: RODRIGUES, R.; FILHO, H. (coord.) Matas ciliares: conservação e recuperação. São Paulo: EDUSP/FAPESP, p. 187-207.

BARROS, L. V. & PAZ, R. N. Mecanismo focal composto da seqüência sísmica de 2006 em Porto dos Gaúchos/MT. In: 2º Simpósio da SBGf, Natal/RN, 21-23 de set. 2006.

BARROS, L. V. & RANCAN, C. C. Estudos crustais na área sismogênica de Porto dos Gaúchos/MT, baseados em Sísmica de Refração e Função do Receptor. 1º Simpósio Regional de Geofísica da SBGf, São Paulo/SP, 26-28 set/2004, 2004(b), 4 p.

BARROS, L. V. (2001a) - Estado do conhecimento da SIR de Tucuruí/PA e considerações sobre a possível sismicidade futura, face à elevação do nível d'água do Reservatório, Relatório Especial, Observatório Sismológico, Universidade de Brasília, 21pp.

BARROS, L. V. (2001b) - Sismicidade Induzida por Reservatórios - Caracterização e análise de casos no Brasil: Exame de Qualificação ao Doutorado em Geologia, Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, 92pp.

BARROS, L.V. & CAIXETA, D. F. One-Dimensional Multilayer Velocity Model for Porto dos Gauchos/MT. 8th Intern. Congress of the Brazilian Geophysics Society, Rio de Janeiro/RJ, 14-18 set/2003, 2003, 6 p.

BARROS, L.V., Assumpção, M., Quintero, R. & Caixeta, D. F., The Intraplate seismic Zone of Porto dos Gaúchos in the Amazon Craton – Brazil, submited to tectonophysics, 2008.

BARROS, L.V., Parâmetros de fonte do sismo de Porto dos Gúchos, de 10 de março de 1998, usando análise spectral de sinais. I Simpósio de Geofísica da SBGf, São Paulo,2004, 5 p.

BARROS, L.V.; ASSUMPÇÃO, M. & QUINTERO, R. Recurrent seismicity in northern Mato Grosso State-Brazil. In: General Assembly, Santiago, Chile, 2-8 de out. 2005.

BARROS, L.V.; MARZA, V.; CAIXETA, D.F. & CARVALHO, J.M. Seismic Sequence in Porto dos Gaúchos/MT - Brazil After March/1998 Mainshock: Preliminary results. 6th Int. Congress of the Braz. Geophysics Society, 2001c. 4 p.

Barros, R. S. M., E. L. Bisaggioii, & R. C. Borges. 2006. Morcegos (Mammalia, Chiroptera) em fragmentos florestais urbanos no município de Juiz de Fora, Minas Gerais, Sudeste do Brasil. Biota Neotropica 6(1).

BARTORELLI [*et al*l] Inundações marinhas Fanerozóicas no Brasil e recursos minerais associados. (cap.3) In: MANTESSO-NETO,A.; BARTORELLI,A.; DALKÉ CARNEIRO, C.; BRITO-NEVES,B.B. (Orgs), Geologia do Continente Sul Americano: Evolução da Obra de Fernando Flávio Marques de Almeida. São Paulo: Ed. Beca, 647p. 2004.

BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2003.

Baxter, R. M. (1977), Environmental effects of dams and impoundments. *Annu. Rev. Ecol. Syst.*, 8, 255-283.

Becker, M., & J. C. Dalponte. 1991. Rastros de mamíferos silvestres brasileiros: um guia de campo. Editora Universidade de Brasília, Brasília-DF.

Bencke, G. A.; Maurício, G. N.; Develey, P. F. & Gorek, J. M. 2006. Áreas importantes para a conservação de aves no Brasil. Parte I – estados do domínio da Mata Atlântica. São Paulo: SAVE Brasil.

BENNEMA, J. 1966. Report to the Government of Brazil on Classification of Brazilian Soils. Rome: FAO, 1966. 83p. (FAO. EPTA Report, 2197).

Berg, M.E.V.D. 1986. Formas atuais e potenciais de aproveitamento das espécies nativas exóticas do Pantanal Mato-Grossense. Pp. 131-136. In: Simpósio sobre recursos naturais e sócio econômicos do pantanal, Corumbá, Embrapa - UFMS, 1984. Anais, Brasília, (EMBRAPA-CPAC. Documentos, 5).

Bergallo, H. G., C. E. L. Esbérard, L. Geise, C. E. V. Grelle, M. V. Vieira, P. R. Gonçalves, A. Paglia, & N. Attias. 2009. Mamíferos endêmicos e ameaçados do Estado do Rio de Janeiro: diagnóstico e estratégias para a conservação, Pp. 209-219 In: Estratégias e ações para a conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro (H. G. Bergallo, et al., eds.). Instituto Biomas, Rio de Janeiro.

Bergallo, H. G., C. E. L. Esbérard, M. A. R. Mello, V. Lins, R. Mangolin, G. G. S. Melo, & M. Baptista. 2003. Bat Species Richness in Atlantic Forest: What Is the Minimum Sampling Effort? Biotropica 35(2): 278-288.

BERGALLO, H. G., C. F. D. ROCHA, M. A. S. ALVES, & M. VAN SLUYS. 2000. A fauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de Janeiro. EdUERJ Rio de Janeiro.

BERROCAL, J. et alli. Sismicidade do Brasil. Inst. Astronômico e Geofísico, USP, 320pp., 1984. Bras. Geofísica, 1, 67-88, 1983.

BIGARELLA, j. j; MAZZUCHOWSKI, J. Z. Visão integrada da problemática da erosão. Livro Guia do III Simpósio Nacional de Controle da Erosão. Maringá, 1985. p. 01-19; 93-121.

Biodiversitas. 2006. Lista da Fauna Ameaçada de Extinção de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.biodiversitas.org.br>. Acessado em: 8 de setembro de 2009.

Biodiversitas. *Biodiversidade em Minas Gerais: um Atlas para sua conservação*. Costa, M. R. C. *et al.* (orgs.) Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas, 94 p. (1998).

BirdLife International. 2008a. Jacamaralcyon tridactyla. *In*: IUCN. *2008 IUCN Red List of Threatened Species*. <www.iucnredlist.org> Acesso em 18 de março de 2009.

BirdLife International. 2008b. Primolius maracana. In: IUCN. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Acesso em 18 de março de 2009.

Bizerril, C. R. S. F & P. B. S. Primo. 2001. Peixes de águas interiores do Estado do Rio de Janeiro. Série SEMADS 5. Projeto Planágua-SEMADS/GTZ de cooperação técnica Alemanha-Brasil. Rio de Janeiro, FEMAR-SEMADS, 417p

Bizerril, C. R. S. F. (1994), Análise taxonômica e biogeográfica da ictiofauna de água doce do leste brasileiro. *Acta Leopoldensia*, 16, 51-80.

Bizerril, C. R. S. F. 1995. Composição taxonômica e análise ecológica da ictiofauna da bacia hidrográfica do rio São João, RJ, Brasil. Dissertação de mestrado. Museu Nacional do Rio de Janeiro, Rio Janeiro, 293 pp.

Bizerril, C. R. S. F. 1998. Contribuição ao conhecimento da bacia do rio Paraíba do Sul. Rio de Janeiro: Aneel, CPRM.

Blacher, C. 1987. Ocorrência e preservação de Lutra longicaudis (Mammalia: Mustelidae) no litoral de Santa Catarina. Boletim da Fundação Brasileira para Conservação da Natureza, Rio de janeiro, 22: 105-117.

Blacher, C. 1994. Strategic Reproduction of *Lutra longicaudis* IUCN Otter Spec. Group Bull. 9: 6

BLAUSTEIN, A.R. 1994. Chicken Little or Nero's fiddle? A perspective on declining amphibian populations. *Herpetologica.* 50:85-97.

BLAUSTEIN, A.R.; WAKE, D.B. & SOUSA, W.P. 1994. Amphibian declines: judging stability, persistence, and susceptibility of populations to local and global extinctions. Conserv. Biol. 8: 60–71.

Blom, C.W.P.M.; Bögemann, G.M.; Laan, P.; van der Sman, A.J.M.;, van de Steeg, H.M.; Voesenek, L.A.C.J. 1990. Adaptation flooding in plants from river areas. Aquat. Bot., 38: 29-47.

Boggs C.T., Keefer M.L., Peery C.A., Bjornn T.C. & Stuehrenberg L.C. Fallback, Reascension, and Adjusted Fishway Escapement Estimates for Adult Chinook Salmon and Steelhead at Columbia and Snake River Dams. Transactions of the American Fisheries Society, 133, 932-949, 2004.

BOND-BUCKUP, G & L BUCKUP. 1999. Infraordem Caridea (pitus, camarões de água doce e marinhos) In: Os Crustáceos do Rio Grande do Sul. Buckup, L. & Bond-Buckup, G. (Organizadores). Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 503pp.

BOND-BUCKUP, G. & L. BUCKUP. 1989. Os Palaemonidae de águas continentais do Brasil Meridional (Crustacea, Decapoda). Rev. Brasil. Biol. 49 (4): 883-896.

BOND-BUCKUP, G. & L. BUCKUP. 1994. A Família Aeglidae (Crustacea, Decapoda, Anomura). Arquivos de Zoologia do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 32 (4): 159-346.

Bonvicino, C. R., J. A. Oliveira, & P. S. D'andrea. 2008. Guia dos roedores do Brasil, com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos. Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - OPAS/OMS, Rio de Janeiro.

Bonvicino, C. R., S. M. Lindbergh, & L. S. Maroja. 2002. Small non-flying mammals from conserved and altered areas of Atlantic Forest and Cerrado: Comments on their potential use for monitoring environment. Brazilian Journal of Biology 62(4b): 765-774.

Bott R. 1969. Die Su¨ sswasserkrabben Su¨ d-Amerikas und ihre Stammesgeschichte. Eine Revision der Trichodactylidae und der Pseudothelphusidae o¨ stlich der Anden (Crustacea, Decapoda). Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft 518: 1–94.

Boyd, C. 1990. Water Quality in Ponds Aquaculture. Alabama: Alabama Agricultural Experimental Station, Auburn University. 482p.

Braga, A. L. 2007. Ictiofauna do rio Pomba: estrutura da comunidade, aspectos biológicos e impactos de represamentos. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Lavras. 117p.

Braga, F. G. 2003. Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), espécie criticamente em perigo: uma preocupação no Estado do Paraná. Acta Biológica Paranaense 33: 193-194.

BRAGA, I. A.; GOMES, A. C.; NELSON, M.; MELLO, R. C.; BERGAMASCHI, D. P.; DE SOUZA, J. M. Comparação entre pesquisa larvária e armadilha de oviposição, para detecção de *Aedes aegypti*. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 33, p. 347–353, 2000.

BRAGA, I. A.; VALLE, D. *Aedes aegypti*: vigilância, monitoramento da resistência e alternativas de controle no Brasil. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 16, p. 295–302, 2007.

Braga,B., 2005. *Introdução à Engenharia Ambiental.* Pearson Prentice Hall, São Paulo.

Branco L.H.Z.; Necchi, O.Jr.; Branco, C.C.Z. 1999. Cyanophyceae from lotic ecosystems of São Paulo State, southeastern Brazil. Algological Studies 94: 63-87.

Branco, C.C.Z.; Krupek, R.A.; Peres, C.K. 2009. Ecological distribution of stream macroalgal communities from mid-western region of Paraná State, Southern Brazil: evidence of the importance of local scale variation. Brazilian Archives of Biology and Technology 52(2): 379-386.

Branco, C.C.Z.; Necchi, O.Jr. 1996. Distribution of stream macroalgae in the eastern Atlantic Rainforest of São Paulo State, sotheastern Brazil. Algological Studies 333: 139-150.

Branco, L.H.Z.; Necchi, O.Jr. 1998. Distribution of macroalgae in three tropical drainage basins of southeastern Brazil. Archiv für Hydrobiologie 142: 241-256.

BRASIL, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA. Termo de Referência para o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do AHE de Itaocara-RJ. Processo: 02001.000175/2008. Outubro de 2008.

BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitossociologia: Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Rosário, Madrid. Blumes, 3ª ed.

BRAZIL, R. P.; PASSOS, W. L.; FUZARI, A. A.; FALCÃO, A. L.; ANDRADE-FILHO, J. D. The peridomiciliar sand fly fauna (Diptera: Psychodidae) in areas of cutaneous leishmaniasis in Além Paraíba, Minas Gerais, Brazil. Journal of Vector Ecology, v. 31, p. 418–420, 2006.

Bredt, A., & W. Uieda. 1996. Bats from urban and rural environments of the Distrito Federal, mid-western Brazil Chiroptera Neotropical 2(2): 54-57.

Brito, D., L. C. Oliveira, M. Oprea, & M. A. R. Mello. 2009. An overview of brazilian mammalogy: trends, biases and future directions. Zoologia 26(1): 67-73.

Brito, E.F; Moulton, T.P.; Souza, M.L.; Bunn, S.E. 2006. Stable isotope analysis indicates microalgae as the predominant source of fauna in a costal forest stream, south-east Brazil. Austral Ecology; 31:623-633.

Britski, H. A. 1970. Peixes de agua doce do Estado de Sao Paulo - sistematica. In: Com. Interest. da Bacia Parana-Uruguai. Poluicao e Piscicultura. Sao Paulo, pp. 79-112.

Britski, H. A. 1972. Sistemática e evolução dos Auchenipteridae e Ageneiosidae (Teleostei, Siluriformes). Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, Brasil. 146pp.

Britski, H. A., Y, Sato and A. B. S. Rosa. 1984. Manual de identificação de peixes da Bacia do São Francisco. Brasília, Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações- CODEVASF, Divisão de Piscicultura e Pesca. 143 p.

Britski, H. A.; Sato, Y.; Rosa, A. B. S. 1988. Manual de identificação de peixes da região de Três Marias: com chave de identificação para os peixes da bacia do São Francisco. Brasília, Câmara dos Deputados/ CODEVASF, 143p.

Britski, H.A. & Figueiredo, J.L. de 1972. Peixes brasileiros que necessitam de proteção. pp. 159-164. In: Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, GB.

BROCHADO, J.P., - Um modelo da difusão da cerâmica e da agricultura no leste da América do Sul. In: Anais do I Simpósio de Pré-história do Nordeste Brasileiro. Clio (série arqueológica) 4:85-8, Recife, 1991.

Brooks, A. River channel change. *In*: Calow, P. & Petts, G. E. (eds.). The rivers handbook, vol. 2. Wiley & Sons, Chichester, UK. 55-75 (1994).

Bruno Pimenta, Oswaldo Luiz Peixoto 2004. Ischnocnema oea. In: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 31 July 2009.

BUDOWSKI, G. 1965. Distribution on tropical american rain Forest species in the light of sucessional processes. Turrialba, 15 (1): p. 20-42.

Burgess, W.E. 1989. An atlas of freshwater and marine catfishes. TFH, Neptune City, 785.

C

Cabelli, V.J. 1978. Microbial indicators system for assessing water quality. Antonie van Leeuwenhock, n.48, p.613-617.

Cáceres, N. C. 2002. Food habits and seed dispersal by the white-eared opossum, *Didelphis albiventris*, in Southern Brazil. Studies on Neotropical Fauna and Environment 37: 97-104.

Cáceres, N. C., & E. L. A. Monteiro-Filho. 2000. The common opossum, *Didelphis aurita*, as a seed disperser of several plants in southern Brazil. Ciência e Cultura 52(1): 41-44.

Cáceres, N. C., V. A. Dittrich, & E. L. A. Monteiro-Filho. 1999. Fruit consumption, distance of seed dispersal and germination of solanaceous plants ingested by common opossum (*Didelphis aurita*) in southern Brazil Revue d`Ecologie 54: 1-9.

Callisto, M.F.P.; Esteves, F. A. 1995. Distribuição de macroinvertebrados bentônicos em um ecossistema impactado por rejeito de bauxita (Pará, Brasil). Oecologia Brasiliensis, 1, 335-348.

CÂMARA, L. A concentração da propriedade agrária no Brasil. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro, v. 7, n. 77, p. 516-528, 1949.

Camargo, A.F.M.; Esteves, F.A. 1995. Biomass and productivity of aquatic macrophytes in Brazilian lacustrine ecosystems. In: Tundisi, J.G.; Bicudo, C.E.M.; Matsumura-Tundisi, T., Limnology in Brazil. São Paulo: ABC/SBL, p. 137-149.

Camargo, A.F.M.; Esteves, F.A. 1996. Influence of water level variation on biomass and chemical composition of the aquatic macrophyte Eichhornia azurea (Kunth) in an oxbow lake of the Rio Mogi- Guaçu (São Paulo, Brazil). Arch. Hydrobiol., 135(3): 423-432.

Camargo, A.F.M.; Pezzato, M.M. & Henry-Silva, G. 2003. Fatores limitantes à produção primária de macrófitas aquáticas. In: Thomaz, S. M. & Bini, L. M. (Ed.) Ecologia e Manejo de macrófitas aquáticas. Maringá: EDUEM. cap. 3, p. 59-83.

CAMARGO, M.N; KLAMT, E; KAUFFMAN, J.H. Sistema brasileiro de classificação de solos. Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, v. 12, n. 1, p. 11-33, jan./abr. 1987.

CAMARGO, S. Impacto do desenvolvimento na expansão da esquistossomose. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, v. 22, p. 117–119, 1980.

CAMPANHARO, L.S.L.O. 2003. Impactos socioambientais decorrentes da formação do Reservatório da Usina Hidrelétrica Eng.º Sérgio Motta no município de Presidente Epitácio/SP. Presidente Prudente. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Geografia). Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Presidente Prudente. 42f.

CAMPBELL, H.W. & S.P. CHRISTMAN. 1982. Field techniques for herpetofaunal communities analysis, p.193-200. In: N.J. Scott Jr. (Ed.). Herpetological communities. Washington U.S. Fish Wild. Serv. Wildl. Resp. Rep. 13, IV + 239p.

CAMPOS, F.S. 1990. Estudo da variabilidade de precipitação. São José dos Campos. Monografia (trabalho Final de Graduação). Instituto Tecnológico da Aeronáutica. 56p.

CANDIDO, Antônio. Os Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida. São Paulo, Livraria Duas Cidades, 1987.

Caramaschi, E. P., J. M, R. Aranha, H. S. Thiago, D. F. Moraes JR., D. A. Halboth, J. H. C. Gomes, M. Vianna, M. S. Menezes, D. Francischini. 1991. Levantamento da ictiofauna do rio Paraíba do Sul e ciclo reprodutivo das principais espécies, no trecho compreendido entre Três Rios e Campos. Vol I e II. Rio de Janeiro, Furnas Centrais Elétricas S. A. 190p.

CARAUTA, J. P. P & ROCHA, E. de F. S. 1988. Conservação da flora no trecho fluminense da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Albertoa 1 (11) p. 85-136

CARMO, R.L. 2001. A água é o limite?: redistribuição espacial da população e recursos hídricos no Estado de São Paulo. Campinas. Tese (Doutorado em Demografia). Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas. 194f.

CARNEIRO, PAULO R. F. (2004). Água e Conflito na Baixada dos Goytacazes. Revista REGA Vol. 1 nº 2 p 87-100, jul-dez 2004.

CARSS, D.N. & PARKINSON, S.G. 1996. Errors associated with otter *Lutra lutra* faecal analysis. I. Assessing general diet from spraints. *J. Zool., Lond.* 238: 301-317.

CARVALHO, F. A., NASCIMENTO, M. T. & OLIVEIRA-FILHO, A. T. 2008. Composição, riqueza e heterogeneidade da flora arbórea da bacia do rio São João, RJ, Brasil. Acta bot.bras. 22(4): 929-940.

CARVALHO, O. S.; MASSARA, C. L.; ROCHA, R. S.; KATZ, N. Esquistossomose mansoni no Sudoeste do Estado de Minas Gerais (Brasil). Revista de Saúde Pública, v. 23, p. 341–344, 1989.

CARVALHO-E-SILVA, A. M. T., G. R. SILVA & S. P. CARVALHO-E-SILVA. Anuros da Reserva Rio das Pedras, Mangaratiba, RJ, Brasil. Biota Neotropica 8:199-209. 2008.

Castro, R. M. C. 1990. *Revisão taxonômica da família Prochilodontidae (Ostariophysi: Characiformes)*. Dissertação (Doutorado em Ciências - Zoologia). Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo.

CERUTTI JR, C.; BOULOS, M.; COUTINHO, A. F.; HATAB, M. C. L. D.; FALQUETO, A.; REZENDE, H. R.; DUARTE, A. M. R. C.; COLLINS, W.; MALAFRONTE, R. S. Epidemiologic aspects of the malaria transmission cycle in area of very low incidence in Brazil. Malaria Journal, v. 6, p. 1–12, 2007.

Chambers, P. A. 1987. Nearshore occurrence of submersed aquatic macrophytes in relation to wave action. Can. J. Fish. aquat. Sci 44: 1666–1669.

Chame, M. 2003. Terrestrial mammal feces: a morphometric summary and description. Mem Inst Oswaldo Cruz 98 (Suppl. I): 71-94.

CHANIN, P. 1985. *The Natural History of Otters*. Croom Helm. Austrália. 179p.

Charles-Dominique, P.; Atramentowicz, M.; Charles-Dominique, M.; Gerard, H.; Hladik, A.; Hladik, C.M.; Prévost, F. 1981. Les mammifères frugivores arboricoles nocturnes d'une forêt guyanaise: interrelations plantes-animaux. Rev Ecol (Terre Vie) 35: 341-435.

Chehébar, C. 1990. Action Plan for Latin American Otters. In: Foster-Turley, P; Macdonald, S. & Mason, C. (eds). Otters: An Action Plan for their Conservation. Otter Specialist Group/IUCN. 126pp.

Chiarello, A. G. 2000. Influência da caça ilegal sobre mamíferos e aves das matas de tabuleiro do norte do estado do Espírito Santo. Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão 11(12): 229-247.

Chiarello, A. G., L. M. D. S. Aguiar, R. Cerqueira, F. R. D. Melo, F. H. G. Rodrigues, & V. M. F. D. Silva. 2008. MamíferosIn: Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção (A. B. M. Machado, G. M. Drummond and A. P. Paglia, eds.). Fundação Biodiversitas, Brasília.

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 2008. Appendices I, II & III. Disponível em: <www.cites.org>. Acesso em: 24/06/2009.

CITES, 2009. *Appendices I, II e III*. http://www.cites.org/eng/app/e-appendices.pdf.

CITES. 2009. Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora. Appendices I, II and III. http://www.cites.org UNEP.

Clay, C. H. *Design of Fishways and Other Fish Facilities*. Second Edition, CRC Press, Boca Raton, Florida. 248p. (1995).

COBLENTZ, D. D. & RICHARDSON, R. M. Analysis of the South American intraplate stress field. J. of Geoph. Res., Vol. 101, No. B4, p. 8643-8657, April 10, 1996.

Coelho, P.A. & M. Ramos-Porto. 1985. Camarões de água doce do Brasil: DistribuiÇão Geográfica. Revta bras. Zool. 2 (6):405-410.

Coelho, P.A. & Melo, G.A.S in Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, Volume 1, Capítulo: Invertebrados Aquáticos, Ministério do Meio Ambiente, 2008.

COELHO-NETTO, A.L. Evolução das cabeceiras de drenagem no Médio Vale do Rio Paraíba do Sul: a formação e o crescimento da rede de canais sob controle estrutural. Revista Brasileira de Geomorfologia, ano 4, nº. 2: 69-100. 2003.

Colares, E.P. & Sabato, E.L. 1995. Binomio desenvolvimento/conservação: Estudo de caso com lontras em empreendimentos hidroelétricos. In: III Congreso Latinoamericano de Ecologia. 22-28/10/1995. Mérida - Venezuela. Resumos.

Colares, E.P. & Waldemarin, H.F. 1998. Neotropical river otter (*Lutra longicaudis*) in the Paranapanema River Hydroeletrics, São Paulo State, Brazil. In: VII International Otter Colloquium. 14 a 19/03/1998. Trebon/República Tcheca. Apresentado.

COLWELL, R. K. EstimateS: Statistical estimation of species richness and shared species from samples. Version 7.5. User's Guide and application published at: http://purl.oclc.org/estimates, v. p. 2005.

COMASE. 1994. Seminário Sobre Fauna Aquática e o Setor Elétrico Brasileiro: Fundamentos. Comitê Coordenador das Atividades de Meio Ambiente do Setor Elétrico, Eletrobrás, caderno 1. 61p.

COMASE. 1994. Seminário Sobre Fauna Aquática e o Setor Elétrico Brasileiro: Conservação. Comitê Coordenador das Atividades de Meio Ambiente do Setor Elétrico, Eletrobrás, caderno 3. 40p.

COMASE. 1995. *Seminário Sobre Fauna Aquática e o Setor Elétrico Brasileiro: Estudos e Levantamentos*. Comitê Coordenador das Atividades de Meio Ambiente do Setor Elétrico, Eletrobrás, caderno 4. 104p.

COMISSÃO MUNDIAL DE BARRAGENS – CMB. 1999. Estudo de caso da usina hidrelétrica de Tucuruí (Brasil): relatório final da fase de escopo. Rio de Janeiro: CMB, 80p.

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. 2008. *Listas das aves do Brasil*. Versão 5/10/2008. Disponível em <http://www.cbro.org.br>. Acesso em: 15/02/2009.

Comitê Gestor do PAC – Relatório do Programa de Aceleração do Crescimento. 2 Anos – Rio de Janeiro. Brasília. 2009.

CONSOLI, R. A. G. B.; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, R. Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fundação Oswaldo Cruz, 1994.

CONSOLIM, J.; LUZ, E.; TORRES, P. B. Flebótomos (Diptera; Psychodidae) da área do reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu, Estado do Paraná, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 6, p. 86–89, 1990.

Contribuição ao conhecimento da herpetofauna do nordeste do estado de minas gerais, Brasil Feio e Caramaschi 2002 - Phylomedusa 1(2): 105-111.

COPPE (2002). Balanço entre Disponibilidade e Demandas Futuras dos Recursos Hídricos, em Quantidade e Qualidade, com Indicação de Conflitos Potenciais, do Plano de Recursos Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança na Bacia do Rio Paraíba do Sul.

COPPETEC/ CEIVAP (2001). Diagnóstico e Prognóstico do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.

CORN, P.S. 1994. Straight-line drift fences and pitfall traps, p. 109-117. In: W.R. Heyer; M.A. Donnely; R.W. McDiarmid; L.-A. Hayek & M. Foster (Eds.).Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for amphibians. Washington, D.C., Smithsonian Institution Press, XIX + 364p.

CORREA, M. P & PENA L, de A. 1926-1978. Dicionário das Plantas Úteis do Brasil e exóticas cultivadas. IBDF. Ministério da agricultura. Rio de Janeiro, 6v.

Costa, G. 1994. Caracterização histórica, geomorfológica e hidráulica do estuário do rio Paraíba do Sul. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 97p.

Costa, W. J. E. M. Feeding habits of a fish community in a tropical coastal stream, rio Mato Grosso, Brazil. *Studies on Neotropical Fauna and Environment*, 22: 145-153 (1987).

COURA, J. R. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

COUTINHO, J. O. Distribuição geográfica dos anofelinos do Estado do Rio de Janeiro. Arquivos de Higiene e Saúde Pública, v. 11, p. 439–457, 1946.

COUTO, Oscar Graça. Parecer nº 1256/2008.

CPRM (Junho de 2002). Estudo de Regionalização de Vazões da Sub-Bacia 58.

CPRM. Geomorfologia do estado do Rio de Janeiro. Ministério de Minas e Energia, Projeto Rio de Janeiro DEAN, W. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica Brasileira. São Paulo, Ed. Companhia das Letras, 380p. 1997.

CPT – Comissão Pastoral da Terra – Áreas de Conflito no Campo, 2008 Página: http://www.cptnac.com.br Acesso Julho 2009.

CPTEC. Glossário Climatológico. 2008. Disponível em: http://www.cptec.inpe.br/glossario_tecnico/glos_ABC.shtml. Acesso em: junho de 2008.

CPTEC-INPE. Plataforma de Coleta de Dados. Dados Meteorológicos, Hidrológicos e Ambientais. Disponível em: http://satelite.cptec.inpe.br/PCD/metadados. Acesso em agosto de 2009.

CRONQUIST, A. 1988. The evolution and classification of flowering plants. 2. ed. New York: The New Botanical Garden.

Crowl, T. A., W. H. McDowell, A. P. Covich, and S. L.Johnson.. Freshwater shrimp effects on detrital processing and nutrients in a tropical headwater stream. Ecology 82:775–783, 2001.

CULLEN, L. & RUDRAN, R. 2003. Transectos lineares na estimativa de densidade de mamíferos e aves de médio e grande porte. In: CULLEN, L.; RUDRAN, R. & VALLADARES-PÁDUA, C. orgs. Métodos de estudos em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Curitiba, UFPR. p.169-179.

Cunha, A. A., & M. V. Vieira. 2002. Support diameter, incline, and vertical movements of four didelphis marsupials in the Atlantic forest of Brazil. J. Zool. Lond. 258: 419-426.

CURTY, Carlos Elias dos Santos. Romaria: Esporte e fé sobre quatro patas. Barra Mansa-RJ, Prosa e Verso Editora LTDA. 1999.

Cybis, L. F.; Bendati, M.M.; Maizonave, C.R.M.; Werner, V.R.; Domingues, C.D. 2006. Manual para estudo de cianobactérias planctônicas em mananciais de abastecimento público: Caso da represa Lomba do Sabão e lago Guaíba, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 1.ed. Rio de Janeiro: ABES.

D

D'andrea, P. S., R. Gentile, L. S. Maroja, F. A. Fernandes, R. Coura, & R. Cerqueira. 2007. Small mammal populations of an agroecosystem in the Atlantic Forest domain, southeastern Brazil. Revista Brasileira de Biologia 67(1): 179-186.

DAS, B. P.; KABILAN, L.; SHARMA, S. N.; LAL, S.; REGU, K.; SAXENA, V. K. Detection of Dengue Virus in wild caught *Aedes albupictus* (Skuse) around Kozhikode Airport, Malappuram District, Kerala, India. Dengue Bulletin, v. 28, p. 210–212, 2004.

de la Peña, M. R. & Rumboll, M. 1998. Birds of Southern South America and Antartica. New Jersey: Princeton University Press.

DEAN, W. – 1996 – A Ferro e Fogo: A história da devastação da Mata Atlântica Brasileira. Companhia das Letras, São Paulo. 426p.

DEGALLIER, N.; TEIXEIRA, J. M.; SOARES SD SDA, S.; PEREIRA, R. D.; PINTO, S. C.; CHAIB AD ADE, J.; VASCONCELOS, P. F.; OLIVEIRA, E. *Aedes albopictus* may not be vector of dengue virus in human epidemics in Brazil. Revista de Saúde Pública, v. 37, p. 386-387, 2003.

Delciellos, A. C., & M. V. Vieira. 2006. Arboreal walking performance in seven didelphid marsupials as an aspect of their fundamental niche. Austral Ecology 31: 449-457.

DEUS, C.E.O. Papel da formiga saúva na hidrologia e erosão dos solos em ambiente de pastagem, Bananal, SP. Dissertação de Mestrado, PPGG-UFRJ, 236p. 1991.

DEUS, Leandro Andrei Beser; PEITER, Carlos Cesar e MENEZES, Paulo Márcio Leal. Geoprocessamento aplicado à gestão de áreas de produção mineral. Sem local e data. Disponível em http://www.cartografia.org.br/xxi_cbc/244-SG52.pdf. Acessado em 25/04/2009.

Develey, P. F. & Endrigo, E. 2004. Aves da Grande São Paulo: guia de campo. São Paulo: Aves e Fotos Editora.

Di Bitetti, M. S. 2001. Home-range use by the tufted capuchin monkey (*Cebus apella nigritus*) in a subtropical rainforest of Argentina Journal of Zoology 253(1): 33-45.

DIAS, J. C.; SILVEIRA, A. C.; SCHOFIELD, C. J. The impact of Chagas disease control in Latin America: a review. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 97, p. 603–612, 2002.

DIAS, N.L.; OKAWA, C.M.P.; ARAÚJO, A.A.M. & GOBBI, M.F. 1999. Estudo dos impactos sobre o clima urbano regional do reservatório de Itaipu. In: Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, 15. Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu.

DIAS, O.F. A evolução da cultura em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Anuário de Divulgação Científica. Goiânia: Instituto Goiano de Pré-História, III(3): 110-130. 1976/1977.

DIAS, O.F. Considerações iniciais sobre o terceiro ano de pesquisas no Estado do Rio de Janeiro. PRONAPA 3. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi. Publicações avulsas 13: 143-156. 1969.

DIAS, O.F. Ocupação do território de Minas Gerais: grupos de horticultores ceramistas. In: OLIVEIRA, A.P.P.L. (org.) Arqueologia e Patrimônio de Minas Gerais. Juiz de Fora: Editar. 91-107. 2007.

DIAS,O.F. & CARVALHO,E. A pré-história da serra fluminense e a utilização das grutas do Estado do Rio de Janeiro. *In*: Schmitz P.I. (ed). Pesquisas. São Leopoldo: Instituto Anchietano de Pesquisa, 31: 43-86. 1980.

DIEGUES, Antonio Carlos. A sócio-antropologia das comunidades de pescadores marítimos no Brasil. Em: "Etnográfica", Vol. III (2), 1999, pp. 361-375.

DONALÍSIO, M. R.; GLASSER, C. M. Vigilância Entomológica e Controle de Vetores do Dengue. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 5, p. 259–272, 2002.

DRUMMOND, G.M. 2002. Distribuição, status populacional e conservação do cágado *Phrynops hogei* (Mertens, 1967) (Testudines: Chelidae) no rio Carangola. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais. 101p.

DRUMMOND, G.M. 2002. Status Populacional e *Conservação do Cágado* Phrynops hogei (Mertens, 1967) (Testudinae: Chelidae) no rio Carangola. 101 f. Dissertação. *Mestrado* em *Ecologia*, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. UFMG.

DRUMMOND, G.M., MARTINS, C. S., MACHADO, A.B.M, STEHMANN, J.R. & MENDONÇA, M. P. 2008. Listas das Espécies da Fauna e Flora Ameaçadas de Extinção de Minas Gerais. Biodiversitas. CD ROM.

DRUMMOND, G.M.; C.S. MARTINS; A.B.M. MACHADO; F.A. Sebaio & Y. Antonini. 2005. Biodiversidade em Minas Gerais: um atlas para a sua conservação. Belo Horizonte, Fundação Biodiversitas, 222p.

Duarte, C. M., J. Kalff & R. H. Peters. 1986. Patterns in biomass and cover of aquatic macrophytes in lakes. Can. J. Fish. aquat. Sci. 43: 1900–1908.

DUMONT, Sandra Regina Tôrres. "São Francisco – Caminho Geral do Sertão: Cenários de vida e trabalho de pescadores Tradicionais em Pirapora e Buritizeiro – Norte de Minas Gerais". Dissertação (Mestrado em Geografia) Instituto de Geografia Universidade Federal de Uberlândia UFU. Uberlândia 2006.

DUNNE, T. e LEOPOLD,L. –1978 –Water in Environmental Planning – Ed. John Wiley & Sons Ltd.

Dunning, J. S. 1988. South american birds: a photographic aid to identification. Pennsylvania: Harrowood Books.

Duplaix, N.; Waldemarin, H.F.; Groenedijk, J.; Munis, M.; Valesco, M. & Botello, J.C. 2008. *Pteronura brasiliensis*. In: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.1. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24/06/2009.

Durkheim, Emile. Regras do método sociológico. 16 ed. São Paulo. Companhia Editora Nacional. 2001.

E

Eigenmann, C. H.. The Pygidiidae, a family of South American catfishes. *Mem. Carnegie Mus.*, 7 (5): 259-398, pls. 36-56 (1918).

Eigenmann, C.H. & Myers, G.S. 1929. The American Characidae. *Mem. Mus. Comp. Zool.*, 43 (5): 429-458, 11 pls.

Eigenmann, C.H. 1917-1927. The American Characidae. *Mem. Mus. Comp. Zool.*, 43 (1-4): 1-428, 90 pls.

Eisenberg, J. F., & K. H. Redford. 1999b. Mammals of the Neotropics: The Central Neotropics: Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil. Vol. 3. University Of Chicago Press.

Eisenberg, J.F. & Thorington, R.W. 1973. A preliminary analysis of a neotropical mammal fauna. Biotropica, 5 :150-161.

Eisenberg, J.F.; O'Connell, M.A.; August, P.V. 1979. Density, productivity and distribution of mammals in two venezuelan habitats. Pp: 187-207 in J. F. Eisenberg. Vertebrate Ecology in the Northern Neotropics. Smithsonian Institution Press, Washington.

Eletrobrás. 1999. O tratamento do impacto das hidrelétricas sobre a fauna terrestre (L. M. Vasconcellos, ed.), Rio de Janeiro.

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos (Rio de Janeiro, RJ) Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - Brasília: Embrapa Produção de Informação; Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2006. 2 ed., 306p.:Il.

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos (Rio de Janeiro, RJ). Manual de métodos de análise de solo. Rio de Janeiro, 1997. 212p. (EMBRAPA-CNPS. Documentos, 1).

EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos (Rio de Janeiro, RJ). Definição e notação de horizontes e camadas do solo. Rio de Janeiro, 1988a. 54p. (EMBRAPA-SNLCS. Documentos, 3).

EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos (Rio de Janeiro, RJ). Critérios para distinção de classes de solos e de fases de unidades de mapeamento: normas em uso pelo SNLCS. Rio de Janeiro, 1988b. 67p. (EMBRAPA-SNLCS. Documentos, 11). ESTADOS UNIDOS. Department of Agriculture. Soil Survey Division. Soil Conservation Service. Soil Survey Staff. Soil taxonomy: a basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys. Washington, 1975. 754p. (USDA. Agriculture Handbook, 436).

Emmons, L., & F. Feer. 1997. Neotropical rainforest mammals. University of Chicago Press, Chicago.

Emmons, L.H. 1984. Geographic variation in densities and diversities of non-flying mammals in Amazonia. Biotropica 16 (3): 210-222.

Engevix. 2000. UHE Itaocara - Relatório de Impacto Ambiental. Light Serviços de Eletricidade S.A. junho.

Entwisle, T.J. 1990. Macroalgae in the upper Yarra & Watts River catchments: Distribution & Phenology. Australian Journal of Marine and Freshwater Research 41: 505-522.

EPE. Avaliação Ambiental Integrada: AAI de aproveitamentos hidrelétricos. Disponível em http://www.epe.gov.br/MeioAmbiente/Paginas/MeioAmbiente_1.aspx?CategoriaID. Acesso em 17 de janeiro de 2009.

Erize, F., Mata, J. R. R. & Rumboll, M. 2006. *Birds of South America, Non-Passerines: Rheas to Woodpeckers*. New Jersey: Princeton Universety Press.

ERLINGE, S. 1968. Food studies on captive otters *Lutra lutra* L. *Oikos*. 19: 259-270.

ERNST,C.H. & BARBOUR,R.W. 1989. Turtles of the World. Smithsonian Institution Press, Washington D.C. – London.

Esbérard, C. E. L. 2003. Diversidade de morcegos em área de Mata Atlântica regenerada no sudeste do Brasil. Revista Brasileira de Zoociências 5(2).

Esbérard, C. E. L., & H. G. Bergallo. 2005. Research on bats in the State of Rio de Janeiro, Southeastern Brazil. Mastozoologia Neotropical 12(2): 237-243.

Esbérard, C. E. L., T. Jordão-Nogueira, J. L. Luz, G. Gomes, C. Enrici, & H. Bergallo. 2006. Morcegos da Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ, Sudeste do Brasil. Revista Brasileira de Zoociências 8(2): 147-153.

Eschmeyer, W. N. 1998. Catalog of Fishes. Special publication nº 1 of the Center for Biodiversity Research and Information. California Academy of Sciences. vols. 1-3: 1-2905.

ESTADOS UNIDOS. Department of Agriculture. Soil Survey Division. Soil Conservation Service. Soil Survey Staff. Soil survey manual. Rev. enlarg. ed. Washington, D.C., 1993. 437p. (USDA. Agriculture Handbook, 18).

Esteves, F.A. 1998, Fundamentos de limnologia. Interciencia/FINEP, Rio de Janeiro, 575p.

F

FACURI,F. 2002. Avaliação e interpretação dos dados geológicos da região de Itaocara, noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Relatório final de Iniciação Científica, 34p.

FALAVIGNA-GUILHERME, A. L.; SILVA, A. M.; GUILHERME, E. V.; MORAIS, D. L. Estudo retrospectivo da prevalência de malária e do gênero *Anopheles* na área de influência do reservatório de Itaipu Binacional. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, v. 47, p. 81–86, 2005.

FALQUETO, A.; SESSA, P. A.; FERREIRA, A. L.; VIEIRA, V. P.; SANTOS, C. B.; VAREJÃO, J. B. M.; CUPOLILLO, E.; PORROZZI, R.; CARVALHO-PAES, L. E.; GRIMALDI JR, G. Epidemiological and clinical features of *Leishmania (Viannia) braziliensis* American cutaneous and mucocutaneous leishmaniasis in the State of Espírito Santo, Brasil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 98, p. 1003–1010, 2003.

FAO (Roma, Itália). Soil map of the world: 1:500.000 legend. Paris: Unesco, 1974. v. 1.

Fausch, K. D.; Lyons, J.; Karr, J. R. & Angermeier, P. L. 1990. Fish communities as indicator of environmental degradation. American Fisheries Society Symposium, 8: 123-144.

FAY, R. W.; ELIASON, D. A. A prefered oviposition site as a surveillance method for *Aedes aegypti*. Mosquito News, v. 26, p. 531–535, 1966.

FEARNSIDE, P.M. 2004. As usinas hidrelétricas mitigam o efeito estufa?: O caso da barragem de Curuá-UNA. Manaus: INPA.

Feema, 2009. Disponível em: <http://www.feema.rj.gov.br/bacia-rio-paraiba-sul.asp?cat=75>. Acessado em 31.08.09.

FEIO, R.N. & CARAMASCHI, U. Contribuição ao conhecimento da herpetofauna do nordeste do estado de minas gerais, Brasil 2002 - Phylomedusa 1(2): 105-111.

FERNANDEZ, M. A., THIENGO, S. C. & AMARAL R. S. 2008. Técnicas Malacológicas *In*: *Vigilância e Controle de Moluscos de moluscos de Importância Médica: Diretrizes Técnicas.* MS, Secretaria de Vigilância em Saúde, Editora do Ministério da Saúde, Brasília, p. 43-71.

FERRARI, A. L. 2001. Evolução Tectônica do Graben da Guanabara. Doutorado em Geociências (Geologia Sedimentar), Inédito. Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

Ferreira, A. G. & Lima, N. R. W. 1996. Qualidade do pescado co complexo Lagoa de Cima – Lagoa Feia, RJ. In: I Jornada de Ictiologia do Rio de Janeiro, Resumos, Museu Nacional, Rio de Janeiro. 21.

Ferreira, A. G. & Lima, N. R. W. 1997. Nível de metais pesados no pescado de Campos, RJ. In: II Encontro de Iniciação científica, Resumos. Universidade Estadual do Norte Fluminese, Campos dos Goytacazes. 47.

FERREIRA, A. G. 1997 *Níveis de metais pesados no pescado do complexo lagoa de Cima-lagoa Feia, Campos, RJ.* Campos dos Goytacazes, Universidade Estadual do Norte Fluminense. 78p. (Monografia de Bacharelado em Biologia. Centro de Biociências e Biotecnologia, UENF)

FERREIRA, A. L.; SESSA, P. A.; VAREJÃO, J. B. M.; FALQUETO, A. Distribution of sand flies (Diptera: Psychodidae) at different altitudes in an endemic region of american cutaneous leishmaniasis in the State of Espírito Santo, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 96, p. 1061–1067, 2001.

FERREIRA, E.; DE SOUZA, P. S.; DA FONSECA FILHO, M.; ROCHA, I. Nota sobre a distribuicao geografica do *Triatoma vitticeps* Stal, 1859 (Hemiptera, Reduviidae) no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Revista Brasileira de Malariologia e Doenças Tropicais, v. 38, p. 11–14, 1986.

FERREIRA, J. M. & M. ASSUMPÇÃO. Sismicidade do Nordeste do Brasil. Rev.

FERREIRA, J. M. Sismicidade do Nordeste do Brasil. Tese de Mestrado. Inst. Astronômico e Geofísico, USP, 192pp. 1983.

FISCH, G.F.; JANUÁRIO, M. & SENNA, R.C. 1990. Impacto ecológico em Tucuruí (PA): climatologia. Acta Amazônica, 20(1): 49-60.

FISCH, G.F.; MARENGO, J.A. & NOBRE, C.A. 1998. Uma revisão geral do clima da Amazônia. Acta Amazônica, 28(2): 101-126.

Fonseca, G. A. B., & J. G. Robinson. 1990. Forest size and structure: Competitive and predatory effects on small mammal communities. Biological conservation 53(4): 265-294.

Fonseca, G. A. B., G. Herrmann, Y. L. R. Leite, R. A. Mittermeier, A. B. Rylands, & J. L. Patton. 1996. Lista anotada dos mamíferos do Brasil. Occasional Papers in Conservation Biology 4: 1-38.

Fonseca, I.A. 2008. Composição, recrutamento e potencialidade toxigênica de cianobactérias em um tributário do reservatório de Rosana, Paraná, Brasil. Tese (doutorado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais)--Universidade Estadual de Maringá, Dep. de Biologia.

FORATTINI, O. P. Culicidologia médica. Vol. 2. São Paulo: Edusp, 2002.

FORATTINI, O. P.; MARQUES, G. R. M. Nota sobre o encontro de *Aedes aegypti* em bromélias. Revista de Saúde Pública, v. 34, p. 543–544, 2000.

FORD, D.C. & WILLIAMS, P.W. 1989. Karst Geomorphology and Hidrology. London. Unwin Hyman.

Foster-Turley, P.; Macdonald, S. e Mason, C. 1990. Otters: An Action Plan for their Conservation. Otter Specialist Group/ IUCN. 126pp.

Fowler, H. W. 1948 Os peixes de água doce do Brasil (1ª entrega). Arquivos de Zoologia 6:1-204.

Fowler, H. W. 1950. Os peixes de água doce do Brasil (2a entrega). Arquivos de Zoologia 6:205-404.

Fowler, H. W. 1951. Os peixes de água doce do Brasil (3a entrega). Arquivos de Zoologia 6:405-628.

Fowler, H. W. 1954. Os peixes de água doce do Brasil (4a entrega). Arquivos de Zoologia, 9:1-400.

Franco, Maria Sylvia de Carvalho. Homens Livres na Ordem Escravocrata. 4ª edição. Ed. Unesp. São Paulo. 1997.

Freeman, M.C.; Pringle, C.M.; Greathouse, E.A. & Freeman B.J. Ecosystem-Level Consequences of Migratory Faunal Depletion Caused by Dams In: Biodiversity, Status, and Conservation of the World's Shads. American Fisheries Society Symposium, pp. 255-266, 2003.

Freitas, S. R., D. Ástua De Moraes, R. T. Santori, & R. Cerqueira. 1997. Habitat preference and food use by *Metachirus nudicaudatus* and *Didelphis aurita* (Didelphimorphia, Didelphidae) in a restinga forest at Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Biologia 57: 93-98.

Frisch, J. D. & Frisch, C. D. 2005. Aves brasileiras e plantas que as atraem. São Paulo: Dalgas Ecoltec.

FROST, D. R. 2009. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 5.3 (12 February, 2009). Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/ American Museum of Natural History, New York, USA.

FROTA, Ivaldo. O Setor Elétrico e seus Conflitos: Os Novos e Velhos Desafios. In A Difícil Sustentabilidade – Política Energética e conflitos ambientais. Bursztyn, Marcel (org.) Rio de Janeiro. Ed. Garamond. 2001 p.152

FUNASA. Dengue – Instruções para pessoal de combate ao vetor: Manual de normas técnicas. Brasília: Ministério da Saúde: Fundação Nacional de Saúde, 2001.

Fundação Biodiversitas 2008. Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção / editores Angelo Barbosa Monteiro Machado, Gláucia Moreira Drummond, Adriano Pereira Paglia. - 1.ed. - Brasília, DF : MMA; Belo Horizonte, MG.

Fundação Biodiversitas, 2007. Lista das Espécies da Flora e da Fauna Ameaçadas de Extinção do Estado de Minhas Gerais. Disponível em: <http://www.biodiversitas.org.br/listas-mg>. Acesso em: 24/06/2009.

Fundação COPPETEC – Laboratório de Hidrologia e Estudos de Meio Ambiente. 2006. Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Diagnóstico dos Recursos Hídricos. AGEVAP.

FUNDAÇÃO COPPETEC / UFRJ. Diagnóstico e prognóstico do plano de recursos hídricos da bacia do rio Paraíba do Sul. v.1, 487p. 2002.

Fundação COPPETEC. Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul. Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –AGEVAP. Resende Dezembro. 2007.

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica: período de 2000 a 2005. São Paulo: http://mapas.sosma.org.br/, 2008.

Furness, R. W. & Greenwood, J. J. D. 1993. *Birds as monitors of environmental change*. London: Chapman & Hall.

Fusco-Costa, R.; Castellani, T.T.; Tomas, W.M. Abundância e locais de ocorrência do jacaré-de-papo-amarelo (*Caiman latirostris*, Alligatoridae) no noroeste da Ilha de Santa Catarina, SC.. Biotemas (UFSC), v. 21, p. 183-187, 2008.

G

GALATI, E. A. B. Morfologia e taxonomia. Morfologia, terminologia de adultos e identificação dos táxons da América. In RANGEL, E. F.; LAINSON, R. (org.) Flebotomíneos do Brasil. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Oswaldo Cruz, p. 53–175, 2003.

Galetti, M., & I. Sazima. 2006. Impacto de cães ferais em um fragmento urbano de Floresta Atlântica no sudeste do Brasil. Natureza & Conservação 4(1): 58-63.

Garavello, J.C. & Britski, H.A. 1988. *Leporinus macrocephalus* sp. n. da bacia do rio Paraguai (Ostariophysi, Anostomidae). *Naturalia,* 13*:* 67-74.

Garavello, J.C. 1979. Revisão taxonômica do gênero *Leporinus* Spix, 1829 (Ostariophysi, Anostomidae). São Paulo, IBUSP, 451 p. Tese de Doutoramento, Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo.

Garavello, J.C. *Revisão taxonômica do gênero Leporinus Spix, 1829 (Ostariophysi, Anostomidae).* São Paulo, IBUSP, 451 p. Tese de Doutoramento, Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. (1979).

GARCIA, P. O. 2007. Estrutura e Composição do Estrato Arbóreo em Diferentes Trechos da Reserva Biológica Municipal Santa Cândida, Juiz de Fora - MG. Dissertação de mestrado – Univrsiade Federal de Juiz de Fora, PGECOL.

Garcia, Q. S., J. L. P. Rezende, & L. M. S. Aguair. 2000. Seed dispersal by bats in a disturbed area of Southeastern Brazil. Revista de Biologia Tropical 48(1): 125-128.

Garutti, V. & Britski, H.A. Descrição de uma espécie nova de *Astyanax* (Teleostei: Characidae) da bacia do alto rio Paraná e considerações sobre as demais espécies do gênero na bacia. *Comum. Mus. Ciênc. Tecnol. PUCRS. sér. Zool*., 13: 65-88 (2000).

Gerking, S. D. 1994. *Feeding ecology of fishes*. Academic Press, London. 416p.

Géry, J. 1977. *Characoids of the world*. Neptune: New Jersey, TFH Publications. 672p.

GIARETTA A.A., FACURE K.G., SAWAYA R.J., MEYER J.H.D. & CHEMIN N. 1999. Diversity and abundance of litter frogs in a montane forest of southeastern Brazil: Seasonal and altitudinal changes. Biotropica 31: 669–674.

Giller, P.S.; Malmqvist, B. 1998. The Biology of Streams and Rivers: biology of habitat. Oxford University Press, Oxford.

GIOVANELLI, A. et al. 2005. Habitat preference of freshwater snails in relation to environmental factors and the presence of the competitor snail Melanoides tuberculatus (Müller, 1774). Mem Inst Oswaldo Cruz 100 (2): 169-176.

GIULIETTI, A.M, HARLEY, R.M, QUEIROZ, L.P. de, WANDERLEY, M.G.L. & VAN DEN DEN BERG. C. 2005. “Biodiversity and Conservation of Plants in Brazil” Conservation Biology v.19. n. 3. pp. 632-639.

Glanz, W.E. 1982. The terrestrial mammal fauna of Barro Colorado Island: censuses and long-term changes. In: E.G. Leigh, A.S. Rand and D.M. Windsor (eds.): The Ecology of a Tropical Forest: Seasonal Rhythms and Long-terms Changes. Smithsonian Institution Press, Washington, D. C.: 455-468.

GOLDENBERG, Miriam. A arte de pesquisa. Rio de Janeiro: Record, 2002.

GOMES CORRÊA, M. M. 1977. Palemonídeos do Brasil (Crustacea: Decapoda: Natantia). Tese de mestrado, não publicada, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 135p.

GOMES, E.P.; MANTOVANI, W. E KAGEYAMA, P.Y. 2003. Mortality and recruitment of trees in a secondary montane rain forest in southeastern Brazil. Braz. J. Biol. 63 (1) 47-60.

GOMES, L.M., REIS, R.B & CRUZ, C.B.M. 2009. Análises da cobertura florestal da Mata Atlântica por município do Estado do Rio de Janeiro. Anais do XIV Simpósio de Sensoriamento Remoto. Natal, Brasil. P. 3849-3857.

GOMES, Mauro Leão. Ouro, posseiros e fazendas de café. A ocupação e a degradação ambiental da região das Minas do Canta Galo na província do Rio de Janeiro. Tese de Doutorado em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. CPDA/UFRRJ. Rio de Janeiro, 2004.

Gomes-Correa, M. M., 1973. Descrição de uma espécie nova do gênero *Cryphiops* (Decapoda: Natantia: Palaemonidae). *Revta bras. Biol.*, Rio *de J 33:*169-173.

Gomes, Paulo Emílio Salles. Humberto Mauro, Cataguases, Cinearte. Ed. USP. São Paulo. 1974

GOMIERO, L.M.; BRAGA, F.M.S. Relação pesocomprimento e fator de condição de Brycon opalinus (Pisces, Characiformes) no Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Santa Virginia, Mata Atlântica, Estado de São Paulo, Brasil. Acta Sci. Biol. Sci., Maringá, v. 28, n. 2, p. 135-141, 2006.

GONÇALVES, T. C.; DE OLIVEIRA, E.; DIAS, L. S.; ALMEIDA, M. D.; NOGUEIRA, W. O.; PIRES, F. D. An investigation on the ecology of Triatoma vitticeps (Stal, 1859) and its possible role in the transmission of Trypanosoma cruzi, in the locality of Triunfo, Santa Maria Madalena municipal district, state of Rio de Janeiro, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 93, p. 711–717, 1998.

Gore, J. A. 1994. Hydrological change. pp: 33-54 *In*: Callow, P. & Petts, G. E. (eds) The rivers handbook. Hydrological and ecological principles. Blackwell Science, Massachusetts

GORI, M.; CARPANETO, G. M. & OTTINO, P. 2003. Spatial distribution of the neotropical otter *Lontra longicaudis* in the Ibera Lake (northern Argentina). Acta Theriologica 48: 495-504.

Gosline, W. A., 1947. Contributions to the classification of the Loricariidae catfishes. Arq. Mus. Nac. Rio de Janeiro, 41:79-134, pls.1-9

Gotelli, N. J. 2007. Ecologia. Editora Planta, Londrina

Gotelli, N. J., & A. M. Ellison. 2004. A primer of ecological statistics. Sinauer Associates.

Gotelli, N.J. 2007. Crescimento Logístico de Populações. Em: Ecologia. Editora Planta, Londrina/PR. 251 pp. 2ª Edição.

Graipel, M. E., J. J. Cherem, E. L. A. Monteiro-Filho, & L. Glock. 2006. Dinâmica populacional de marsupiais e roedores no Parque Municipal da Lagoa do Peri, Ilha de Santa Catarina, sul do Brasil. Mastozoología Neotropical 13(1): 31-49.

GRAULT C. E., MELLO-SILVA C. C. C., COSTA M. J. F. S., LENZI M. F., CRUZ O. J., ALMEIDA A. S., SILVA M. Q., BEZERRA R. M. P., COSTA V. 1998. Potential spread of schistossomiasis in the periphery of greater metropolitan region of Rio de Janeiro. *Mem Inst Oswaldo Cruz*, 93 (Suppl. I): 293-294.

Greathouse, E.; Pringle, C.M.; Holmquist, J.G. Conservation and management of migratory fauna: dams in tropical streams of Puerto Rico. Aquatic Conservation: Marine Freshwater Ecosystems, 16: 695-712, 2006a.

GRECO, Leonardo. Competências constitucionais em matéria ambiental. Revista dos Tribunais. N. 687: 23 – 33. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.

Gregorin, R. 1998. Extending geographic distribution of *Chiroderma doriae* Thomas, 1891 (Phyllostomidae, Stenodermatinae). Chiroptera Neotropical 4(2): 98-99.

Grelle, C. E. V. 2003. Forest Structure and Vertical Stratification of Small Mammals in a Secondary Atlantic Forest, Southeastern Brazil Studies on Neotropical Fauna and Environment 38(2): 81-85.

Grelle, C. E. V., M. A. S. Alves, H. G. Bergallo, L. Geise, C. F. D. Rocha, M. Van Sluys, & U. Caramaschi. 2005. Prediction of threateaned tetrapods based on the species-area relationship in Atlantic Forest, Brazil. Journal of Zoology 265: 359-364.

GRIMALDI JR, G.; TESH, R. B.; MCMAHON-PRATT, D. A review of geographical distribution and epidemiology of leishmaniasis in the New World. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 41, p. 687–725, 1989.

GRIMM, A.M. 1988. Verificação de variações climáticas na área do lago de Itaipu. Congresso Brasileiro de Meteorologia, 5. Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro.

Groenendijk, J. et al. 2005. Surveying and Monitoring Distribution and Population Trends of the Giant Otter (Pteronura brasiliensis). Habitat 16. 53 pg.

Groombridge, B. 1992. Global biodiversity: status of the Earth's living resources. Chapman & Hall, London.

GUEDES-BRUNI, R. R.; NETO, S.J.S.; MORIM, M. P. E MONTAVANI, W. 2006. Composição florística e estrutura de dossel em trecho de Floresta Ombrófila Densa atlântica sobre morrote mamelonar na Reserva Biológica de Poço das Antas, Silva Jardim, Rio de Janeiro, Brasil. Rodriguesia 57(3): 429-442.

GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas. In: GUERRA, A. J. T; CUNHA, S. B. da. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. p. 149-209.

GUERRA, A.J.T. & CUNHA, S.B. Geomorfologia e Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 372p. 2000.

GUERRA, A.J.T. & MARÇAL, m.S. Geomorfologia Ambiental. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 192p. 2006.

GUERRA,A.J.T. - 1991 - Soil characteristics and soil erosion, with particular reference to organic matter content. Tese de doutorado, Universidade de Londres, 441p.

GUIDON, M.A.A.O. 1991. Estudo das variações climáticas na área do lago de Tucuruí. São Paulo. Dissertação (Mestrado em Geografia Física). Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo.

GUIJT, Irene. Monitoramento participativo: conceitos e ferramentas práticas para a agricultura sustentável. Tradução de Annemarie Hohn. 1 ed. Rio de Janeiro: IIED, AS-PTA.1999.

GUIMARÃES, A. E.; GENTILE, C.; ALENCAR, J.; LOPES, C. M.; MELO, R. P. Ecology of Anophelinae (Diptera, Culicidae), malaria vectors around the Serra da Mesa reservoir, State of Goiás, Brazil. 1 – Frequency and climatic factors. Cadernos de Saúde Pública, v. 20, p. 291–302, 2004.

GUIMARÃES, A. E.; MELO, R. P.; LOPES, C. M.; ALENCAR, J.; GENTILE, C. Prevalência de anofelinos (Diptera: Culicidae) no crepúsculo vespertino em área da usina hidrelétrica de Itaipu, no Município de Guaíra, Estado do Paraná, Brasil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 92, p. 745–754, 1997.

GUIX, C.J.; J.R. MIRANDA & V.S. Nunes. 1992. Observaciones sobre la Ecologia de Hidromedusa Maximiliani. Bol. Asoc. Herpetol. Esp.3.

GUNKEL, G.; LANGE, U.; WALDE, D. & ROSA, J.W.C. 2003. The environmental and operational impacts of Curuá-Una, a reservoir in the Amazon region of Pará, Brazil. Lake & Reservoirs: Research and Management, 8(3-4): 201-220.

H

HADDAD, C.F.B. 2008. Uma análise da lista de espécies de anfíbios ameaçada de extinção. Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção.

HAMMER, Ø.; HARPER, D. A. T.; RYAN, P. D. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. . Palaeontologia Electronica, v. 4, p. 1-9, 2001.

Hass, A. 2002. Efeitos da criação do reservatório da UHE Serra da Mesa (Goiás) sobre a comunidade de aves. Tese de doutorado, Universidade Estadual de Campinas. Campinas.

HASUI, Y. e PONÇANO, W. L. Geossuturas e sismicidade no Brasil, In: Congr. Bras. Geol. Eng., 2, São Paulo, Anais ABGE/IPT, V. i, pág. 331-338, 1978.

HEILBRON, m.; SOARES, Antonio Carlos Pedrosa; CAMPOS NETO, Mario; SILVA, Luiz Carlos; TROUW, Rudolph; JANASI, Valdeci. Província Mantiqueira. In: Virgino Mantesso-Neto; Andrea Bartorelli; Celso Dal Ré Carneiro; Benjamin Bley de Brito Neves. (Org.). Geologia do Continente Sul Americano: Evolução da Obra de Fernando Flávio Marques de Almeida. 1ª ed. São Paulo: Beca Produções Culturais Ltda., 2004, v. I, p. 203-234.

Heller, C. 1862. Neue Crustaceen gesammelt während der Weltumseglung der k.k. Fregatte Novara: Zweiter vorläufiger Bericht. Verhandlungen der Kaiserlich-königlichen Zoologisch-botanisch Gesellschaft in Wien 12:519-528.

HEREDIA, Beatriz Maria Alasia. A morada da vida: trabalho familiar de pequenos produtores do Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1979.

HICON ENGENHARIA LTDA (2002). Estudos Hidrológicos do Rio Macaé para Subsidiar o Projeto da Tomada d'Água. Relatório Técnico para UTE Norte Fluminense. Abril de 2002.

HICON ENGENHARIA LTDA (2006). Atualização dos Estudos Hidrológicos do Rio Macaé – Relatório Final. Relatório Técnico para UTE Norte Fluminense. Julho de 2006.

HIJMANS, R. J.; CAMERON, S. E.; PARRA, J. L.; JONES, P. G.; JARVIS, A. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, v. 25, p. 1965–1978, 2005.

Hilsdorf, A.W.S. & Petrere JR., M., 2002. Conservação de peixes na bacia do rio Paraíba do Sul. *Ciência Hoje*, vol. 30, no. 180, p. 62-65.

Höfling, E & Camargo, H. F. A. 2002. Aves no campus da cidade universitária Armando de Salles Oliveira. São Paulo: Edusp.

Holmiquist, J.G.; Schmidt-Gengenbach, J.M.; Yoshioka, B.B. High dams and marine-freshwater linkages: effects on native and introduced fauna in the Caribbean. Conservation Biology, 12: 621-630, 1998.

Holthuis, L.B. 1951. A general revision of the Palaemonidae (Crustacea Decapoda Natantia) of the Americas. 1. The subfamilies Euryrhynchinae and Pontoniinae. Los Angeles: The University of Southern California Press, 1. (*Allan Hancock Foundation Publications. Occasional Papper 11*), 332pp.

HOLTHUIS, L.B. 1952. A general revision of the Palaemonidae (Crustacea, Decapoda, Natantia) of the Americas. II. The subfamily Palaemoninae. Occasional Paper of the Allan Hancock Foundation, Los Angeles, 12: 1-396.

HORTON,R.E., 1945 - Erosional development of streams and their drainage basins, hydrophysical approach to quantitative morphology. Geological Society American Bulletin vol. 56 pp. 275-316.

Howes, G. 1982. Review of the genus *Brycon* (Teleostei: Characoidei). *Bull. Br. Mus. nat. Hist.* (Zool.) 43(1):1-47.

Hudon, C., S. Lalonde; P. Gagnon. 2000. Ranking the effects of site exposure, plant growth form, water depth, and transparency on aquatic plant biomass. Can. J. Fish. aquat. Sci. 57: 31–42.

HUSSAIN, S.A. & CHOUDHURY, B.C. Distribution and Status Of The Smooth-Coated Otter *Lutra Perspicillata* In National Chambal Sanctuary, India Biological conservation. 1997.

I

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Disponível em: <http://www.ibama.gov.br>. Acesso em: 24/06/2009.

IBAMA, 2004. Lista oficial do MMA/IBAMA de espécies brasileiras ameaçadas de Extinção. <www.ibama.gov.br>. Acessado em janeiro de 2010.

IBAMA. Escritório Regional em Nova Friburgo. 2009. Disponível em: http://ibamanovafriburgo.blogspot.com/2008/06/ibama-o-escritrio-regional-de-nova.html. Acesso em: agosto de 2009.

IBGE. Documentação Territorial do Brasil. Disponível em http://biblioteca.ibge.gov.br/. Acesso Agosto 2009.

IBGE. 1993. Mapa de vegetação do Brasil. Departamento de Cartografia DECAR/DEDIT/CDDI. Escala 1:5.000.000 – IBGE – IBAMA, Rio de Janeiro.

IHERING, H. VON. 1897. Os camarões de água doce do Brasil. Revista do Museu Paulista, São Paulo, 2: 421-432.

Ihering, R. von, 1931. Cyprinodontes brasileiros (peixes “guarus”). Sistemática e informações biológicas. *Arq. Inst. Biol.*, 4:243-280, pls. 26-29.

INCRA, Instituto de Colonização e Reforma Agrária. Assentamentos Rurais no Brasil até dezembro de 2007. Disponível em: http://www.incra.gov.br/arquivos/0277102527.pdf Capturado em novembro de 2008.

INMET. Instituto Nacional de Meteorologia. 2009a. Normais Climatológicas. Disponível em: http://www.inmet.gov.br/html/clima/mapas/#. Acesso em agosto de 2009a.

INMET. Instituto Nacional de Meteorologia. 2009b. Superfície Convencional INMET. Aquisição de dados das estações Cordeiro e Itaperuna – 3ª DISME/INMET.

Instituto Butantan. 2007a. Material Didático Serpentes Peçonhentas. Disponível em: <www.butantan.gov.br> Acessado em: 19 de agosto de 2009.

Instituto Butantan. 2007b. Material Didático Número 9 - Acidentes com Animais Peçonhentos. Disponível em: <www.butantan.gov.br> Acessado em: 19 de agosto de 2009.

Instituto Butantan. 2007c. Material Didático Número 4 – Escorpiões, Aranhas e Lacraias. Disponível em: <www.butantan.gov.br>. Acessado em: 19 de agosto de 2009.

Instituto do Patrimônio, Histórico e Artístico Nacional. Jongo Patrimônio Imaterial Brasileiro. 2005.

Instituto Vital Brasil. 2005a. Animais - Serpentes. Disponível em: <www.ivb.rj.gov.br>. Acessado em: 19 de agosto de 2009.

Instituto Vital Brasil. 2005b. Primeiros Socorros. Disponível em: <www.ivb.rj.gov.br>. Acessado em: 19 de agosto de 2009.

Instituto Vital Brasil. 2005c. Animais - Aranhas. Disponível em: <www.ivb.rj.gov.br>. Acessado em: 19 de agosto de 2009.

Instituto Vital Brasil. 2005d. Animais - Lacraias. Disponível em: <www.ivb.rj.gov.br>. Acessado em: 19 de agosto de 2009.

Isbrücker, I. J. H. 1981. *Provisional key to genera of Loricariidae*. Institute of Taxonomic Zoology, University of Amsterdam. Musée de Zoologie de l'Université et de la Ville de Nancy. 13 p.

ISO 14001 - 2004 (NBR ISO 14001 - Sistema Gestão Ambiental – Especificação e Diretrizes para uso).

ITACARAMBI. 2009. Cidade de Itacarambi. Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Disponível em: www.itacarambi.com. Acesso em: agosto de 2009.

IUCN 2001. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

IUCN, 2009. Disponível em: <http://www.iucnredlist.org/details/10309/0. Acessado em 25.08.09>.

IUCN, 2009. Red List of Threatened Species. Disponível em <www.redlist.org>. Acesso em: 24/06/2009.

IUCN, 2009. Red List of Threatened Species. Disponível em <www.redlist.org>. Acesso em: 6/01/2010.

IUCN. 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnredlist.org.

Iucn. 2009. IUCN Red Listin http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1.

Iucn. 2009. IUCN Red Listin http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1.

J

JAEGER, R.G. 1994. Transect sampling. Em: W.R. Heyer; M.A. Donnely; R.W. McDiarmid; L.-A. Hayek & M. Foster (Eds.). Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for amphibians. Washington, D.C., Smithsonian Institution Press, XIX: 103-107.

Jason, C.H. & Emmons, L.H. 1990. Ecological structure of the nonflying mammal community at Cocha Cashu Biological Station, Manu National Park, Peru. p. 314-338 In: Gentry, A.H. (ed.). Four Neotropical rainforest. Yale University Press. New Haven

JENKINS, D. & BURROWS, G.D. 1980. Ecology of otters in Northern Scotland - III. The use of faeces as indicators of otter (*Lutra lutra*) density and distribution. *J. Anim. Ecol*. 49:755-774.

JESEUS, M. F. S. 2009. Análise dos efeitos de borda sobre a composição, dinâmica e estrutura da comunidade arbórea da Mata Atlântica da Reserva Biológica do Tinguá, RJ. Dissertação de mestrado. Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

JOLY, A. C.; LEITÃO-FILHO, H. F. & SILVA, S. M. 1991. O patrimônio florístico. In: CECHI, J. C. & SOARES, M. S. M. (coods.) Mata Atlântica/Atlântic Rain Forest. Ed. Index, Fundação SOD Mata Atlântica, p. 95-125.

Jones, C. & McShea, W.J. 1996. Capturing Mammals. Em: Wilson, D. E., Cole, F. R., Nichols, J. D., Rudram, R. & Foster, M. S. (orgs.) Measuring and Monitoring Biological Diversity: Standart Methods for Mammals. Smithsonian University Press, Washington.pp: 115-155.

JOSEF, C. F. & PRADO, P. I. K. L . Odorific Comunication by spraints among neotropical otters (Lontra longicaudis). In: IX International Otter colloquium, 2004, Frostburg. Proceedings of IX otter Colloquium, 2004.

Junior, I. B. 2003. Modelos de crescimento e decomposição de macrófitas aquáticas. In: Thomaz, S. M. & Bini, L. M. (Ed.). Ecologia e manejo de macrófitas aquáticas. Maringá: EDUEM. cap. 4, p.85-126.

Junk & Piedade 1993. Biomass and primary-production of herbaceous plant communities in the Amazon floodplain. Hydrobiologia. 263 (3):155-162.

K

KAGEYAMA P. Y. & VIANA, V. M. 1989. Tecnologia de sementes e grupos ecológicos de espécies arbóreas tropicais. In: Anais do II Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Sementes Florestais. Atibaia, SP.

KAGEYAMA, P. Y. & GANDARRA, F. B., 1995. Dinâmica de populações de espécies arbóreas: Implicações para o manejo e a conservação. In: Simpósio de Ecossistemas da Costa Brasileira (3). Academia de Ciências de São Paulo, SP. p. 1-9.

KÄMPF, N.; KLAMT, E.; SCHNEIDER, P. Óxidos de ferro em latossolos do Brasil Sudeste e Sul. In: REUNIÃO DE CLASSIFICAÇÃO, CORRELAÇÃO DE SOLOS E INTERPRETAÇÃO DE APTIDÃO AGRÍCOLA, 3., 1988, Rio de Janeiro, RJ. Anais... Rio de Janeiro: EMBRAPA-SNLCS, 1988. p.153-183.

Karr, J. R. 1981. Assessment of biotic integrity using fish communities. Fisheries 6(6): 21-17.

Kasper, C.B, Feldens, M.J, Salvi, J. and Grillo, H.C.Z. (2004). Estudo preliminar sobre a ecologia de *Lontra longicaudis* (Olfers) (Carnivora, Mustelidae) no Vale do Taquari, sul do Brasil. Revista Brasileira de Zoologia 21: 65-72.

KATO, Karina Yoshie Martins. A agricultura e o desenvolvimento sob a ótica da multifuncionalidade: o caso de Santo Antônio de Pádua. Dissertação de mestrado, CPDA/UFRRJ, Rio de Janeiro, 2006.

KLINK, Carlos A. O Papel da Pesquisa Ecológica na Gestão Ambiental e Manejo dos Ecossistemas. In A Difícil Sustentabilidade – Política Energética e conflitos ambientais. Bursztyn, Marcel (org.) Rio de Janeiro. Ed. Garamond. 2001 p.77.

KOHLER, H.C. 2001. Geomorfologia Cárstica. In: GUERRA, A.J.T. & CUNHA, S.B. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. 309-334.

Komárek, J.; Anagnostidis, K. 1989. Modern approach to the classification system of Cyanophytes 4 - Nostocales. Arch Hydrobiol Suppl 82, 247–345.

KÖPPEN, W. 1948. Climatologia: um estudo dos climas da Terra. México: Fundo de Cultura Econômica. 478p.

Krebs C.J. Ecological methodology. New York: Harper and Hall. 654p. 1989.

KREBS, C. J. Ecological methodology. San Francisco: Benjaming Cummings, 1989.

Krupek, R.A.; Branco, C.C.Z.; Peres, C.K. 2007. Distribuição ecológica das comunidades de macroalgas da bacia de drenagem do Rio das Pedras, região centro-sul do estado do Paraná, Sul do Brasil. Revista Brasileira de Botânica 30(2): 173-182.

Kruuk, H. Wild Otters: Predation and Populations. Oxford: Oxford University Press, 1995.

KUNSCH, Margarida M. Krohling. Planejamento de relações públicas na comunicação integrada. Edição revisada, ampliada e atualizada. São Paulo: Summus, 2003.

KUNTZ. B. & ARAÚJO, D. S. D. 2000. Composição florística e estrutura do componente arbóreo de um trecho de Mata Atlântica na Estação Ecológica Estadual do Paraíso. Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro. Rodriguésia, Rio de Janeiro, v. 51, n. 78/79 p. 69-111.

L

Lack-Ximenes, G. E. 2005. Revisão de *Trinomys* Thomas 1921 (Rodentia: Echimyidae), USP, São Paulo.

LACOMBA, I., SOUTULLO, A. and PRIGIONI, C.M. 2001. Distribution and conservation status of the Neotropical river otter (*Lontra longicaudis*) in the coastal lagoons of the Uruguayan Atlantic basin and their main tributaries. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin* 18(1): 20-24.

Lair, N.; Reyes-Marchant, P. 1997. The potamoplankton of the Middle Loire and the role of the 'moving littoral' in downstream transfer of algae and rotifer. – Hydrobiologia 356: 33–52.

Lamas, I. R. 1993. *Análise de características reprodutivas de peixes brasileiros de água doce, com ênfase no local de desova*. UFMG, Belo Horizonte, 72p. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais.

Latreille, P.A. 1828. Squille, *Squilla*. Encyclopèdie Méthodique. Entomologie ou Histoire naturelle de Crustacés, Arachnides et des Insectes 10:467-475.

LEITÃO-FILHO, H. F. 1987. Considerações sobre a florística de florestas tropicais e subtropicais do Brasil. IPEF, Piracicaba, 35, p. 41-46.

Leite, Y. L. R. S., J.R. & Costa, L.P. 1994. Partição de recursos entre espécies simpátricas de marsupiais na Reserva de Poço das Antas, Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Biologia 54(3): 525-536.

LEMOS, R.C.; SANTOS, R.D. dos. Manual de descrição e coleta de solo no campo. 3. ed. Campinas : Sociedade Brasileira de Ciência do Solo / Rio de Janeiro : EMBRAPA-CNPS, 1996. 83p.

LEWINSOHN, T. M. & PRADO, P. I. 2005. How may species are the in Brazil" Conservation Biology v.19. n. 3. pp. 619-628.

LEWINSOHN, T. M. & PRADO, P. I. 2005. How may species are the in Brazil" Conservation Biology v.19. n. 3. pp. 619-628.

Lima V.N., Oliveira, A.F., Machado-Silva, F. Sato, C.Y.S., Andrade, P.M., Moulton, T.P. As evidências de isótopos estáveis de carbono indicam que o perifíton sustenta as teias tróficas de córregos florestados do sistema hidrográfico Guapi-Macacu. XII Congresso Brasileiro de Limnologia, Gramado, 2009.

Lima, D. De A. 1989. Plantas da Caatinga. Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro.

LIMA, E.A.C. & L.M.Y. OSHIRO. 2000. Distribuição, abundância e biologia reprodutiva de *Macrobrachium potiuna* (Müller, 1880) (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae) do Rio Paraíba do Sul, RJ. Acta Biologica Leopoldensia, São Leopoldo, 22 (1): 67-77.

Lima, F.C.T. & Britski, H.A. 1997. Revisão das espécies do gênero *Brycon* Müller & Troschel dos rios do sudeste da América do Sul (Characiformes, Characidae). *In*: Resumos do XII Encontro Brasileiro de Ictiologia, Instituto Oceanográfico da USP, São Paulo. pg. 89.

Lima, R.S 1997. Ictiofauna do alto curso do rio Paraíba do Sul. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo - USP. 222 p.

Lima, V.N. Estudo de estruturas tróficas e de impactos antropogênicos em córregos do sistema hidrográfico Guapi-Macacu usando isótopos estáveis. Dissertação de mestrado – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

Lima-Borges, P.A. & Tomás, W.M. 2004. Guia de rastros e outros vestígios de mamíferos do Pantanal. Embrapa Pantanal, Corumbá.

LIMA-CAMARA, T. N.; HONÓRIO, N. A.; LOUREÇO-DE-OLIVEIRA, R. Freqüência e distribuição espacial de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* (Diptera, Culicidae) no Rio de Janeiro, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 22, p. 279–284, 2006.

LIMBERGER, L. 2007. O clima do oeste do Paraná: análise da presença do lago de Itaipu. Rio Claro. Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Rio Claro. 136f.

LINHARES, Maria Yedda e TEIXEIRA, Francisco Carlos . História da Agricultura Brasileira – Combates e Controvérsias. Ed. Brasiliense. São Paulo. 1981.

Lins, L.V.; Machado, A.B.M.; Costa, C.M.R. & Herrmann, G. 1997. Roteiro metodológico para elaboração de listas de espécies ameaçadas de extinção (contendo a lista oficial da fauna ameaçada de extinção de Minas Gerais). Publicações Avulsas da Fundação Biodiversitas, 1: 50 pp

LIRA, Bertrand. Reflexões sobre o uso da imagem. Lítica e Trabalho 13 - Setembro/1997.

LITTLE, Paul E. Os Conflitos Socioambientais: um Campo de Estudo e de Ação Política. In A Difícil Sustentabilidade – Política Energética e conflitos ambientais. Bursztyn, Marcel (org.) Rio de Janeiro. Ed. Garamond. 2001.

LOMBARDI NETO, F.; BERTONI, J. Erodibilidade de solos paulistas. Boletim Técnico do Instituto Agronômico. Campinas, N° 27, 1975.

Lomolino, M. V. & Weiser, M. D. 2001. Towards a more general species-area relationship: diversity on all islands, great and small. Journal of Biogeography, 27: 17-26.

LORENZI, H. Árvores brasileiras. Manual de Identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa. Ed. Plantarum. 1992. 352p.

LORENZI, H; 2000. Plantas Daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas, 3a edição. Nova Odessa – SP. Ed. Plantarum.

Loretto, D., & M. V. Vieira. 2008. Use of space by the marsupial Marmosops incanus (Didelphimorphia, Didelphidae) in the Atlantic Forest, Brazil. Mammalian Biology 73: 255-261.

LOROSA, E. S.; VALENTE, M. V. M. P.; CUNHA, V.; LENT, H.; JURBERG, J. Foco de doença de Chagas em Arcádia, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 98, p. 885–887, 2003.

LOUZADA M. A. P. & VIEIRA, C. M. 2003. Levantamento da Flora do Domínio das Ilhas Fluviais do Médio Inferior Rio Paraíba do Sul. Relatório, A.PA.R.P.S.-Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul. Rio de Janeiro. RJ.

LOUZADA, M.A.P.1; VIEIRA, C.M. & SOUZA, G. (2004). A flora do Domínio das Ilhas Fluviais do Curso Médio Inferior do Rio Paraíba do Sul. XXIII Jornada Fluminense de Botânica, Campos dos Goytacazes, RJ, de 19 a 21 de novembro de 2004.

Lowe-McConnell, R. H. 1975. Fish Communities in Tropical Freshwaters, their distribution, ecology and evolution. London - New York: Longman. 337p.

Lowe-McConnell, R. H. 1987. Ecological studies in tropical fish communities. New York: Cambridge University Press. 382p.

Loyola, R. D., U. Kubota, & T. M. Lewinsohn. 2007. Endemic vertebrates are the most effective surrogates for identifying conservation priorities among Brazilian ecoregions. Diversity and Distributions 13: 389-396.

LUEDERWALDT, H. 1919a. Os Manguesaes de Santos. Revista do Museu Paulista, São Paulo, 11: 309-409.

LUEDERWALDT, H. 1919b. Lista dos crustáceos superiores (Thoracostraca) do Museu Paulista que foram encontrados no Estado de São Paulo. Revista do Museu Paulista, São Paulo, 11: 427-453.

Lund, J.W.H.; Kipling, C.; Lecren, E.D. 1958. The inverted microscope method of estimating algal number and statistical basis of estimating by counting. Hydrobiologia, 11: 143-170.

M

MACDONALD, S.M.; MASON, C.F. & DE SMET, K. 1985. The otter (*Lutra lutra*) in north-central Algeria. *Mammalia*. 49(2):215-219.

MACHADO, A.B.M., FONSECA, G.A.B.; MACHADO, R.B.; AGUIAR, L.M.S. & LINS, L.V. (eds.). 1998. Livro vermelho das espécies ameaçadas de extinção da fauna de Minas Gerais. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte, Brasil.

MACHADO, A.B.M., MARTINS, C.S. & DRUMMOND, G.M.. 2005. Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: incluindo as espécies quase ameaçadas e deficientes em dados. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas. 160p.

MAGALHÃES, C. & M. TÜRKAY 1996. Taxonomy of the Neotropical freshwater crab family Trichodactylidae I. The generic system with description of some new genera (Crustacea: Decapoda: Brachyura). Senckenbergiana biologica, Frankfurt, 75 (1/2): 63-95.

MAGALHÃES, C. Crustáceos decápodos. In: ISMAEL, D.; VALENTI, W. C.; MATSUMURA-TUNDISI, T.; ROCHA, O. (Ed.). Invertebrados de água doce. São Paulo: Fapesp, 1999. p. 127-133.

MAGURRAN, A. E., 1989 Diversidade ecológica y su medición. Barcelona, Ediciones Vedrá.

Mallar, R., 1987. Proposta de programa interdisciplinar para recuperação e manutenção da qualidade ambiental da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. FEEMA, Rio de Janeiro. 48 pp.

MANSUR, M. C. D., CALLIL, C. T., CARDOSO, F. R., IBARRA, J. A.A. Uma retrospectiva e Mapeamento da Invasão de Espécies de *Corbicula (*Mollusca, Bivalvia, Veneroida, Corbiculidae) oriundas do Sudeste Asiático, na América do Sul. *In*: SILVA, J. S. V. de & SOUZA, R. C. C. L. de. (orgs). Água de Lastro e Bioinvasão. Cap.5. p.39-58. Rio de Janeiro: Interciência. 2004.

MANYNARI, W. V. 2007. Impactos Ambientais à Jusante de Hidrelétricas – O caso da Usina de Tucuruí. Tese. UFRJ.

MARENGO, J.A. & ALVES, L.M. Tendências hidrológicas da bacia do rio Paraíba do Sul. Revista Brasileira de Meteorologia, v.20 (2): 215-226. 2005.

Margalef, R. 1983. Limnologia. Ed. Omega, Barcelona. 1010 pp.

MARQUES, M. do C.M. & NOVAES, J. R. C. 1996. Espécies coletadas no Estado do Rio de Janeiro depositadas no Herbário RB. Rio de Janeiro, Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

MARQUES, M.; MACIEL, G. F.; DALL'AGLIO SOBRINHO, M. 2007. Estimativas das máximas pistas de vento no reservatório da barragem de Ilha Solteira, Estado de São Paulo. Acta Scientiarum Technology, 29(1): 79-84.

Martens, E. Von. 1869. Sudbrazilianische suss und Brackwasser-Crustaceen nach den Sammlungen des Dr. Reinh. Hensel. *Archiv für Naturgeschichte 35*: 1-37.

Martins, M. & Molina, F.B. Panorama geral dos répteis ameaçados do Brasil. In: MACHADO, A.; DRUMMOND, G. M.; PAGLIA, A. P.. (Org.). Livro Vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. 1 ed. Brasília/Belo Horizonte: Ministério do Meio Ambiente/Fundação Biodiversitas, 2008, v. 2, p. 327-334.

MARTINS, V. E. P.; MARTINS, M. G.; ARAÚJO, J. M. P.; SILVA, L. O. R.; MONTEIRO, H. A. O.; CASTRO, F. C.; VASCONCELOS, P. F. C.; GUEDES, M. I. F. Primeiro registro de *Aedes (Stegomyia) albopictus* no Estado do Ceará, Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 40, p. 737–739, 2006.

MASCARENHAS, Rodrigo Tostes de Alencar. Competência legislativa concorrente: possibilidade de atuação do legislativo estadual. Revista de Direito da Defensoria Pública. N. 16: 198 – 224. Rio de Janeiro: Procuradoria Geral da Defensoria Pública, 2000.

Mason, C.F. 1990. An introduction to the Otters. In: Foster-Turley, P; Macdonald, S. & Mason, C. (eds.). Otters: An Action Plan for their Conservation. Otter Specialist Group/IUCN: 4-7.

Mason, C.F.; Macdonald, S.M. Otters: ecology and conservation. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

MATSUMURA-TUNDISI, T. 1999. Diversidade de zooplâncton em represas do Brasil. *In:* HENRY, R. eds. Ecologia de reservatórios: estrutura, função e aspectos sociais. Botucatu, FUNDBIO/FAPESP. p.39-54.

MATTEUCCI, S. D., COLMA, A. 1982. Metodologia para el estudio de la vegetacion. Wasshigton, Organization of American States.

MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo, Cosac e Naify. 2003.

Mazzoni, R., U. Caramaschi, & C. Weber1994. Taxonomical revision of the species of *Hypostomus* Lacépède, 1803 (Siluriformes, Loricariidae) from the lower rio Paraíba do Sul, state of Rio de Janeiro, Brazil. *Revue suisse Zoologie* 101:3-18.

McCune, B.; E. W. Beals. 1993. History of the development of Bray-Curtis ordination. Pages 67-79. In J. S. Fralish et al., editors, Fifty Years of Wisconsin Plant Ecology. Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters, Madison.

MEDINA, Heloísa Vasconcellos; PEITER, Carlos Cesar e DEUS, Leandro Andrei Beser. A cadeia produtiva de rochas ornamentais em Santo Antônio de Pádua. XIII ENEGEP, Ouro Preto/MG, 2003.

Mees, G. F., 1974. Auchenipteridae and Pimelodidae of Suriname (Pisces, Nematognathi). *Zool. Verh. Leiden* (132):1-256 pls. 1-15.

MEIS, m.R m.; MOURA,J.R. e SILVA, T.O. - 1981 - Os "complexos de rampa" e a evolução das encostas no planalto sudeste do Brasil. Anais da Academia Brasileira de Ciências - 53 (3)

Mello, M. A. R., E. K. V. Kalko, & W. R. Silva. 2008. Movements of the bat Sturnira lilium and its role as a seed disperser of Solanaceae in the Brazilian Atlantic forest. Journal of Tropical Ecology 24: 225-228.

MELO, A. L. 2008. Formas larvais de trematódeos encontradas em moluscos límnicos In: Vigilância e Controle de Moluscos de moluscos de Importância Médica: Diretrizes Técnicas. MS, Secretaria de Vigilância em Saúde, Editora do Ministério da Saúde, Brasília, p. 71-80.

MELO, G.A.S. 2003. Famílias Atyidae, Palaemonidae e Sergestidae, p. 289-409. *In:* G.A.S. MELO (Ed.). Manual de Identificação dos Crustacea Decapoda de água doce do Brasil. São Paulo, Editora Loyola, 429p.

Melo, P.A. & Coelho, G.A.S. in Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, Volume 1, Capítulo: Invertebrados Aquáticos, Ministério do Meio Ambiente, 2008.

MENDIGUREN, J. A. & F. M. RICHTER. On the origin of compressional intraplate stresses in South America. Phys. Earth Planet. Inter. 16, p. 318-326, 1978.

MENDONÇA, F. & DANNI-OLIVEIRA, I.M. 2007. Climatologia: Noções básicas e climas do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos.

Mendonça, R.; Felfili, J.M.; Walter, B.M.T.; Silva Júnior, M.C.; Rezende, A.V.; Filgueiras, T.S. & Nogueira, P.E.N. 1998. Flora vascular do Cerrado. Pp. 287-556. In: S. Sano & S. Almeida (eds.). Cerrado: ambiente e flora. EMBRAPA-CPAC, Planaltina.

MENEGUZZI, V.C. 2006. Importância vetorial das espécies de anofelinos (Diptera: Culicidae) na transmissão de malária e estudo dos fatores geoclimáticos determinantes de sua distribuição geográfica no estado do Espírito Santo. *Ano de Obtenção:* 2006.

Menezes C.F.S.; Esteves, F.; Anesio, A.M. Influência da variação artificial do nível d'água da represa do Lobo (SP) sobre a biomassa e produtividade de Nymphoides indica (L.) O. Kuntze e Pontederia cortada L. Acta Limnol. Brasil., 6: 163-172. 1993.

Menezes, N. A. 1987. Três espécies novas de *Oligosarcus* Günther, 1864 e redefinição taxonômica das demais espécies do gênero (Osteichthyes, Teleostei, Characidae). *Boletim de Zoologia, Universidade de São Paulo* 11:1-39.

Menezes, N. A. et al., 2007. Peixes de Água Doce da Mata Atlântica – Lista preliminar das espécies e comentários sobre conservação de peixes de água doce neotropicais, 408 p., MZUSP.

Merritt, R.W.; Cummins K.W. (eds). 1996. An Introduction to the Aquatic Insects of North America. Kendal/Hunt, Dubuque, IA, USA.

MEYER, Doris Rinaldi. A terra do santo e o mundo dos engenhos: estudo de uma comunidade rural nordestina. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1979.

Miguel Trefaut Rodrigues, Ana Maria Telles 2004. Scinax trapicheiroi. In: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 31 July 2009.

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina – jurisprudência – glossário. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

MILLER, B. R.; BALLINGER, M. E. *Aedes albopictus* mosquitoes introduced into Brazil: vector competence for yellow fever and dengue viruses. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, v. 82, p. 476–477, 1988.

Milne Edwards, H. 1853. Memoire sur la Famille des Ocypodien. *Annales des Sciences Naturelles, Zoologie*, 20(3e série): 163-228.

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA/ INCRA – Projetos de Reforma Agrária Conforme Fases de Implantação. 1900-2007.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Informe Epidemiológico da Dengue. http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/boletim_dengue_maio2008.pdf, v. Jan–Abr, p. 13, 2008.

Ministério das Cidades. Resoluções Recomedadas. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/conselho-das-cidades/resolucoes-concidades/resolucoes-recomendadas>. Acesso em 23 de janeiro de 2009).

Ministério do Meio Ambiente. Instrução Normativa no. 3 de 27 de maio de 2003. Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Lista oficial das espécies da flora brasileiras ameaçadas de extinção. Instrução normativa nº 6, de 23 de setembro de 2008.

MIOTO, J. A. Sismicidade induzida e risco sísmico. Ata da I Mesa Redonda sobre Risco Sísmico, São Paulo. Pág.20-34. 1980.

MIRANDA, J.C. Intercepção das chuvas pela vegetação florestal e serapilheira nas encostas do maciço da Tijuca: Parque Nacional da Floresta da Tijuca, RJ. Dissertação de Mestrado, PPGG-UFRJ, 100p. 1992.

MITCHELL, C. J.; MILLER, B. R. Vertical transmission of dengue viruses by strains of *Aedes albopictus* recently introduced into Brazil. Journal of the American Mosquito Control Association, v. 6, p. 251–253, 1990.

MITTERMEIER, R. A., R. P. GIL, M. HOFFMAN, J. PILGRIM, T. BROOKS, C. G. MITTERMEIER, J. LAMOREUX, & G. A. B. FONSECA. 2005. Hotspots revisited: earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions, University of Chicago Press, Boston.

MITTERMEIER, R.A., A.G.J. RHODIN, R. ROCHA-E-SILVA & N.A. DE OLIVEIRA. 1980. Rare Brazilian sideneck turtle. *Oryx.* 15:473-475.

MITTERMEIER, R.A., RHODIN, AG.J., ROCHA E SILVA, R. AND ARAUJO DE OLIVEIRA, N. 1980. Rare brazilian sideneck turtle. *Oryx*, 15(5): 473-475.

Miyamoto, C. T. 1990. *Aspectos reprodutivos de espécies de teleósteos da bacia do rio Paraná: uma revisão*. FUEM, Maringá, 108 p. Monografia de Especialização. Fundação Universidade Estadual de Maringá.

MMA e MEC, Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA. 3ª Edição. Brasília: MMA e MEC, 2005.

Modesto, T. C., F. S. Pessôa, M. C. Enrici, N. Attias, T. Jordão-Nogueira, L. M. Costa, H. G. Albuquerque, & H. G. Bergallo. 2008a. Mamíferos do Parque Estadual do Desengano, Rio de Janeiro, Brasil. Biota Neotropica 8(4): 152-159.

Modesto, T. C., F. S. Pessôa, T. Jordão-Nogueira, M. C. Enrici, L. M. Costa, N. Attias, J. Almeida, D. S. L. Raíces, H. G. Albuquerque, & B. C. Pereira. 2008b. Mammals, Serra da Concórdia, state of Rio de Janeiro, Brazil. Check List 4(3): 341-348.

MOLINA, F.B. 1989. Observações sobre a biologia e o crescimento de Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812) em cativeiro (Reptilia, Testudines, Chelidae). Dissertação de Mestrado. São Paulo, 1989.

MOLINA, F.B. 1990. Reproductive biology of Phrynops geoffroanus (Testudines: Chelidae) in captivity. Tortoises and Turtles, 5: 8. Gland: IUCN/SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group.

MOLINA, F.B. 1992. O comportamento reprodutivo de quelônios. Biotemas, 5: 61-70.

MOLION, L.C.B. & CARVALHO, J.C. 1987. Southern Oscillation and river discharge of selected rivers of tropical south america. In: Conference of Geophysical Fluid Dynamics with special emphasis on "El Niño". Ministério da Ciência e Tecnologia e Centro Latinoamericano de Física. São José dos Campos, 13-17 July: 343 – 354.

MOLION, L.C.B., 1993. Amazonian rainfall and its variability. In: Hydrology and Water Management in the Humid Tropics: 99-111, Cambridge University Press.

Montenegro, S.C.S.; Nordi, N.; Marques, J.G.W. Contexto cultural, ecológico e econômico da produção e ocupação dos espaços de pesca pelos pescadores de pitu (Macrobrachium carcinus) em um trecho do Baixo São Francisco, Alagoas-Brasil. Interciencia, 26 (11): 535-540, 2001.

Moreira, C. 1901. Contribuições para o conhecimento da fauna brasileira. Crustaceos do Brasil. Arquivos do Museu Nacional Rio de Janeiro 11:1-51.

MOREIRA, G.M. Hydromedusa maximiliani (Mikan, 1820). P.424-425. 1998. In: MACHADO, A. B. M.; GUSTAVO, A.B.F; RICARDO, B.M; LUDMILLA, M.S.A. e LÍVIA, L. (orgs.) Livro Vermelho das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna de Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas, 605 p.

MORI, S. A. 1989. Easterm, extra-Amazonian Brasil. IN: CAMPBELL, D. G. & HAMMOND, H. D. (eds) Floristic inventory of tropical countries: the status of plant systematies, collctions and vegetation, plus recommendations for the future. New York Botanical Garden, p. 427-454.

Moulton, T.P.; Melo, G.A.S.; Nessimian, J.; Salgado, N.C., Paiva, P.C. de; Absalão, R.S.; Santos, S.B. de; Veloso, V.G.; Costa, J.M. Invertebrados aquáticos. In: H. de G. Bergallo; C.F.D. de Rocha; M.A. de S. Alves; M. Van Sluys (eds.), A fauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 45-52, 2000.

Moulton, T.P.; Souza, M.L. de; Silveira, R.M.L.; Krsulovic, F.A.M. Effects of ephemeropterans and shrimps on periphyton and sediments in a coastal stream (Atlantic forest, Rio de Janeiro, Brasil). Journal of the Noth American Benthological Society, 23: 868-881, 2004.

Moulton, T.P.; Souza, M.L.; Oliveira, A.F. Conservation of catchments: some theoretical considerations and case histories from Rio de Janeiro. Neotropical Biology and Conservation, 2 (1): 28-35, 2007.

MOURA, J.R.S. e SILVA, T.M. Complexos de Rampa de Colúvio. In: CUNHA, S.B. e GUERRA, AJT (Org.). Geomorfologia do Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.

Muanis, M.C. 2004. Hábito alimentar da lontra (*Lontra longicaudis*) e da ariranha (*Pteronura brasiliensis*) na RPPN da Fazenda Rio Negro, Pantanal, MS: implicativos a sua conservação. Projeto de Monografia em Ecologia (Bacharelado) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Escola de Ciências Biológicas, Departamento de Ciências Naturais. 46pp.

MÜLLER, F. 1880. Palaemon Potiuna. Ein Beispiel abgekürzter Verwandlung. Zoologischer Anzeiger, Leipzip, 3: 152-157.

MÜLLER, F. 1892a. *Trichodactylus,* siri de água doce sem metamorfose. Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 8: 125-133.

MÜLLER, F. 1892b. O Camarão miúdo do Itajahy *Ayoida potimirim*. Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 8: 155-178.

MUELLER-DOMBOIS, D. & ELLEMBERG, H. 1974. Aims and methods of vegetation ecology. New York, Wlley and Sons.

Mugnai, R.; Nessimian, J.L.; Baptista, D.F. Manual de identificação de macroinvertebrados aquáticos. Ed. Technical Books, 2009.

MURAD, Mauricio. Dos pés à cabeça - elementos básicos de sociologia do futebol. Rio de Janeiro: Irradiação Cultural, 1996.

Mwebaza-Ndawula, L.; Sekiranda, S.B.K.; Kiggundu, V. 2005. Variability of zooplankton community along a section of the Upper Victoria Nile, Uganda. – African J. Ecol. 43: 251–257.

MYERS, N.; Mittermeier, R.A.; Mittermeier, C.G.; da Fonseca, G.A.B. & Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 403: 853-858.

N

Necchi, O.Jr. 1993. Distribution and seasonal dynamics of Rhodophyta in the Preto River basin, southeastern Brazil. Hydrobiologia 250: 81-90.

Necchi, O.Jr.; Branco, C.C.Z.; Branco, L.H.Z. 2000. Distribution of stream macroalgae in São Paulo State, southeastern Brazil. Algological Studies 97: 43-57.

Necchi, O.Jr.; Branco, L.H.Z.; Branco, C.C.Z. 1995. Comparison of three techniques for estimating periphyton abundance in bedrock streams. Archiv für Hydrobiologie 134: 393-402.

Necchi, O.Jr.; Branco, L.H.Z.; Branco, C.C.Z. 2003. Ecological distribution of stream macroalgal communities from a drainage basin in the Serra da Canastra National Park, Minas Gerais, Southeastern Brazil. Brazilian Journal of Biology 63: 1-12.

Necchi, O.Jr.; Branco, L.H.Z.; Spezamiglio, D.N. 2008. Distribuição ecológica de comunidades de macroalgas de ambientes lóticos do Parque Nacional de Itatiaia (RJ, MG) Brasil. Revista Brasileira de Botânica 31(1):135-145.

Necchi, O.Jr.; Dip, M.R.; Góes, R.M. 1991. Macroalgae of a stream in southeastern Brazil: composition, seasonal variation and relation to physical and chemical variables. Hydrobiologia 213: 241-250.

Necchi, O.Jr.; Pascoaloto, D.; Branco, L.H.Z. 1994. Distribution of macroalgae in a tropical river basin from southeastern Brazil. Archiv für Hydrobiologie 129: 459-471.

Neiff, J.J. 1975. Fluctuaciones anuales en la composition fitocenotica y biomassa de la hidrofitia en lagunas islenas del Paraná Medio. Ecosur, 2(4): 153-183.

NEWMAN, D.G. & GRIFFIN, C.R. 1994. Wetland use by river otters in Massachusets. *J. Wildl. Manage*. 58(1): 18-23.

Nilsson C., Reidy C.A., Dynesius M. & Revenga C. Fragmentation and Flow Regulation of the World's Large River Systems. Science, 308, 405-408, 2005.

Nunes, M. F. Distribuição do maracanã-verdadeiro Primolius maracana (Psittacidae): preferência de hábitat e fatores que influenciam na manutenção de suas populações remanescentes. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo. Piracicaba. 2003.

O

ODUM, E. P. 1988. Ecologia. Rio de Janeiro, Guanabara. 434p.

OLIFIERS, N. 2002. Fragmentação, habitat e as comunidades de pequenos mamíferos da bacia do rio Macacu, RJ. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Ix, 81p.

Olifiers, N., R. Gentile, & J. T. Fiszon. 2005. Relation between small mammal species composition and anthropic variables in the Brazilian Atlantic Forest. Brazilian Journal of Biology 65(3): 495-501.

OLÍMPIO, J. 1992. Considerações preliminares sobre hábitos alimentares de *Lutra longicaudis* (OLFERS,1818) (Carnivora :Mustelidae) na Lagoa do Peri, Ilha de Santa Catarina. In: III Reunión de Trabajos de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur. Montevideo. Anales. 36-42.

OLIVEIRA FILHO, A. T. 1989. Composição florística e estrutura comunitária da floresta de galeria do córrego da Paciência, Cuiabá - MT. Acta Botânica Brasílica, V.3, P. 91-112.

OLIVEIRA FILHO, A. T., ALMEIDA R. J., MELLO, J. M., & GAVILANES, M. L. 1994. Estrutura fitossociológica e variáveis ambientais em trecho de mata ciliar do córrego dos Vilas Boas, Reserva Biológica do Poço Bonito, Lavras – MG. Revista brasil. Bot. Vol. 7 nº 1, p. 67-85.

Oliveira, F. C. G. 2008.Avaliação preliminar de impacto ambiental sobre a fauna de pequenos mamíferos e suas taxas de infecção por Trypanosoma cruzi e hantavírus na área de Influência da Usina Hidrelétrica Espora, Aporé – GO. Dissertação de Mestrado Universidade Católica de Goiás, Goiânia.

OLIVEIRA, J. B. de.; JACOMINE, P. K. T.; CAMARGO, M. N. Classes Gerais de Solos do Brasil: guia auxiliar para seu reconhecimento. 2 ed. Jaboticabal, FUNEP, 1`992. 201p.

OLIVEIRA, L.P.H. 1945. Verificação da existência de *Atya scabra* Leach, camarão d'água doce da família Atyidae, Crustacea, no Nordeste do Brasil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 43 (1): 177-190.

OLIVEIRA, Leila Bueno. Introdução ao estudo de adobe: construção de alvenaria. 2005. Disponível em www.unb.br/fau/pos_graduacao/paranoa/edicao2005/adobe.pdf. Capturado em setembro de 2008.

OLIVEIRA, Roberto Cardoso. "O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever" In: O trabalho do Antropólogo. 2 ed. Brasília: Paralelo 15; São Paulo. Editora UNESP, 2000.

Oliveira, T. G., & K. Cassaro. 2005. Guia de campo dos felinos do Brasil. Unstituto Pró Carnívoros, São Paulo.

OLIVEIRA-FILHO, A. T. & MACHADO, J. N. M. 1993. Composição florística de uma floresta semidecídua Montana, na Serra de São José, Tiradentes, MG. Acta Botânica Brasílica 7: 71-88.

Olmos, F.; Silva, W. A. G. & Albano, C. G. 2005. Aves em oito áreas de Caatinga no Sul do Ceará e Oeste de Pernambuco, nordeste do Brasil: composição, riqueza e similaridade. *Papéis avulsos de zoologia*, 45(14): 179-199.

ORTMANN, A. 1897. Os camarões de água doce da América do Sul. Revista do Museu Paulista, São Paulo, 2: 173-216.

Oyakawa, O. T. 1993. Cinco espécies novas de *Harttia* Steindachner, 1876 da região sudeste do Brasil e comentários sobre o gênero (Teleostei, Siluriformes, Loricariidae). *Comun. Mus. Ciênc. PUCRS, Sér. Zool., Porto Alegre*, 6: 3-28

Oyakawa, O. T.; Akama, A.; Mautari, K. C. & Nolasco, J. C. 2006. Peixes de riachos da Mata Atlântica nas unidades de conservação do vale do rio Ribeira de Iguape no estado de São Paulo. São Paulo, Editora Neotrópica, 201 p.

P

Pace M.L., Findlay S.E.G.; Lints D. 1992. Zooplankton in advective environments: The Hudson River community and a comparative analysis. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 49:1060-1069.

Pacheco, J. F.; Parrini, R.; Whitney, B. M.; Fonseca, P. S. M. & Bauer, Claudia. 1996. Novos registros de aves para o estado do Rio de Janeiro: Vale do Paraíba Norte. *Atualidades Ornitológicas*, 73(6): 6.

Pádua, M.T.J. & Audi, A. 1984. Espécies da fauna silvestre ameaçados de extinção - sua ocorrência e proteção nos parques nacionais e reservas biológicas federais. *Boletim FBCN*, 19: 49-80.

PARAENSE, W. L. & L. R. CORRÊA. 1989. A potential vector of *Schistosoma mansoni* in Uruguay. *Mem Inst Oswaldo Cruz*, 84 (3): 281-288.

PARAENSE, W. L. 1986. A xistosomose mansoni no Pará. Instituto Evandro Chagas, *Fundação Serviços de Saúde Pública*, Belém, 1: 207-219.

PARDINI, R. & TRAJANO, E. 1999. Use of shelters by the Neotropical river otter (*Lontra longicaudis*) in an Atlantic forest stream, southeastern Brazil. *Journal Of Mammalogy* 80(2): 600-610.

Pardini, R. & Trajano, E. 1999. Use of shelters by the Neotropical river otter (Lontra longicaudis) in an Atlantic forest stream, southeastern Brazil. Journal Of Mammalogy 80(2): 600-610.

Pardini, R. 2004. Effects of forest fragmentation on small mammals in an Atlantic Forest landscape. Biodiversity and conservation 13(3): 2567-2586.

Pardini, R. S., S.M.; Braga-Neto, R. & Metzger, J.P. 2005. The role of forest structure, fragment size and corridors in maintaining small mammal abundance and diversity in an Atlantic forest landscape. Biological conservation 124: 253-266.

Pardini, R., & F. Umetsu. 2006. Pequenos mamíferos não-voadores da Reserva Florestal do Morro Grande – distribuição das espécies e da diversidade em uma área de Mata Atlântica. Biota Neotropica 6(2): 1-22.

Parera, A. 1993. The Neotropical River Otter *Lutra longicaudis* in Iberá Lagoon, Argentina. IUCN Otter Spec. Group Bull. 8: 13 – 16.

PASSAMANI, M & LUCENA, S.M. 2007. *Espécies* da fauna *ameaçadas* de extinção no estado do Espírito Santo. 1 ed. Vitória:IPEMA.

Passos, F. C., W. R. Silva, W. A. Pedro, & M. R. Bonin. 2003. Frugivoria em morcegos (Mammalia, Chiroptera) no Parque Estadual Intervales, sudeste do Brasil. Revista Brasileira de Zoologia 20(3): 511-517.

PATRÍCIA A. ABRUNHOSA, HENRIQUE WOGEL AND JOSÉ P. POMBAL JR. HERPETOLOGICAL JOURNAL, Vol. 16, pp. 115-122 (2006). ANURAN TEMPORAL OCCUPANCY IN A TEMPORARY POND FROM THE ATLANTIC RAIN FOREST, SOUTH-EASTERN BRAZIL.

Patton, J. L., & J. R. Malcolm. 1994. Gene genealogy and differentiation among arboreal spiny rats (Rodentia: Echimyidae) of the Amazon basin: a test of the riverine barrier hypothesis. Evolution 48(4): 1314-1323.

PAULA, M. B.; GOMES, A. C. Culicidae (Diptera) em área sob influência de construção de represa no Estado de São Paulo. Revista de Saúde Pública, v. 41, p. 284–289, 2007.

PAULA, Maria Aparecida de & ALMEIDA, Ana Luisa de Castro. Relações com a comunidade. In: KUNSCH, Margarida M. Krohling.(Org.) Obtendo resultados com relações públicas. São Paulo: Pioneira, 1998.

Pavlov, D.S. 1984. Structures Assisting the Migrations of Non-Salmonid Fish: USSR. *FAO_Fisheries Technical Paper*, 308, Rome, FAO. 97p.

PCE / UHE Itaocara (julho de 2009). Memória Técnica - Estudo de Vazões Mínimas. PJ0722-B-H01-GR-MT-006-0A.

PCE / UHE Itaocara (julho de 2009). Memória Técnica – Série de Vazões Médias Mensais. PJ0722-B-H01-GR-MT-004-0A.

PCE / UHE Itaocara (julho de 2009). Memória Técnica - Vazões Máximas. PJ0722-B-H01-GR-MT-005-0A.

Pedro, W. A., F. C. Passos, & B. K. Lim. 2001a. Morcegos (Chiroptera; Mammalia) da Estação Ecológica dos Caetetus, Estado de São Paulo. Chiroptera Neotropical, Brasília 7(1-2): 136-140.

PEIXOTO, A. L. 1991/92. Vegetação da costa atlântica IN: MONTEIRO, S. &KAZ, L. (Coords.) Floresta Atlântica. Rio de Janeiro, Edições Alumbramento, Livroarte Editora, p. 33-42.

Pellegrino, K. C. M., M. T. Rodrigues, A. N. Waite, M. Morando, Y. Y. Yassuda, & J. W. Sites. 2005. Phylogeography and species limits in the Gymnodactylus darwinii complex (Gekkonidae, Squamata): genetic structure coincides with river systems in the Brazilian Atlantic Forest. Biological Journal of the Linnean Society 85(1): 13-26.

PEREIRA, A.O. 2006. Caracterização do uso e ocupação do solo na área de influência do reservatório de Ilha Solteira. Ilha Solteira. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia, Ilha Solteira. 96f.

PEREIRA, José Roberto. DRPE-Diagnóstico Rápido Participativo Emancipador: a base para o desenvolvimento sustentável dos assentamentos da Reforma Agrária. Viçosa, UFV, 1998. 17p. (mimeo).

Peres, C.K.; Branco, C.C.Z.; Krupek, R.A. no prelo. Distribuição ambiental e temporal das comunidades de macroalgas da Serra da Prata, estado do Paraná, Sul do Brasil. Revista Brasileira de Botânica.

PETERSEN, Paulo; ROMANO, Jorge. Abordagens participativas para o desenvolvimento local. Rio de Janeiro, AS-PTA/Actionaid-Brasil, 1999.

Petts, G. E. 1984. Long-term consequences of upstream impoundment. *Environmental Conservation* 7: 325-332.

Piedade, M.T.F.; Junk, W.J.; Long, S.P. 1991. The productivity of the C4 grass Echinochloa polystachya on the Amazon floodplain. Ecology, 72(4): 1456-1463.

Pielou, E.C. 1969. The measurement of diversity in different types of biological colections. Journal of Theoretical Biology, New York, 13: 131-144.

PIMENTA, B. & PEIXOTO, O.L. 2004. *Ischnocnema oea*. In: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 31 July 2009.

Pimenta, F. E.; Drummond, J. C. P. & Lima, A. C. 2007. Aves aquáticas da Lagoa da Pampulha: seleção de hábitats e atividade diurna. Lundiana, 8(2): 89-96.

PINÃ-RIDRIGUES, F. C. M; COSTA L. G. REIS, A. 1990. Estratégia de estabelecimento de espécies arbóreas e o manejo de florestas tropicais. In: Anais do 6º Congresso Florestal Brasileiro. Campos do Jordão, SP, p, 676-683.

Pinto, B. C. T.; Araújo, F. G. and Hughes, R. M. 2006. Effects of landscape and riparian condition on a fish index of biotic integrity in a large southeastern Brazil river. *Hydrobiologia*, 556, 69-83

Pivatto, M. A. C.; Sabino, J.; Favero, S. & Michels, I. L. 2007. Perfil e viabilidade do turismo de observação de aves no Pantanal Sul e Planalto da Bodoquena (Mato Grosso do Sul) segundo interesse dos visitantes. Revista Brasileira de Ornitologia, 15(4): 520-529.

Poff NL, Allan JD, Bain MB, Karr JR, Prestegaard KL, Richter BD, Sparks RE, Stromberg JC. 1997. The natural flow regime. A paradigm for river conservation and restoration. Bioscience 47: 769-784.

Poletto, F.; Anjos, L.; Lopes, E. V.; Volpato, G. H.; Serafini, P. P. & Favaro, F. L. 2004. Caracterização do microhabitat e vulnerabilidade de cinco espécies de arapaçus (Aves: Dendrocolaptidae) em um fragmento florestal do norte do estado do Paraná, sul do Brasil. *Ararajuba*, 12(2): 89-96.

Pompêo, M.L.M.; Moschini-Carlos, V. 1997. Produtividade primária da macrófita aquática livre flutuante Utricularia gibba L. na Lagoa Dourada (Brotas, SP). Acta Limnol. Brasil. 9: 1-9.

POMPEU, P.S. & VIEIRA, F. Relatório de Controle Ambiental da PCH Carrapatos, rio Pomba, bacia do rio Paraíba do Sul, MG (ictiofauana). 2004.

Pompeu, P.S; Vieira, F; Martinez, C.B. Utilização do mecanismo de transposição de peixes da Usina Hidrelétrica Santa Clara por camarões (Palaemonidae), bacia do rio Mucuri, Minas Gerais, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 23 (1): 293-297, 2006.

PORROZZI, R.; COSTA, M. V. S.; TEVA, A.; FALQUETO, A.; FERREIRA, A. L.; SANTOS, C. B.; ET AL. Comparative evaluation of enzime-linked immunosorbent assays based on crude and recombinant leishmanial antigens for serodiagnosis of symptomatic and asymptomatic *Leishmania infantum* visceral infections in dogs. Clin Vaccine Immunol, v. 14, p. 544–548, 2007.

Portobrás (1978). A Rede Hidroviária Brasileira.

Pott, J.V.; Pott, A. 2000. Plantas aquáticas do Pantanal. Brasília: Embrapa Comunicação para a Transferência de Tecnologia.

Power, M.E.; Dietrich, W. E. & Finlay, J. C. 1996. Dams and downstream aquatic biodiversity: potential food web consequences of hydrologic and geomorphic change. *Environmental Management*, 20(6): 887-895.

PRADO, G.M. & POMBAL JR., J.P. 2005. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, v.63, n.4, p.685-705. ISSN 0365-4508. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DOS ANUROS EM UM BREJO DA RESERVA BIOLÓGICA DE DUAS BOCAS, SUDESTE DO BRASIL.

PRADO, Regina de Paula. Todo Ano Tem: as festas na estrutura social camponesa. Rio de Janeiro, UFRJ-Museu Nacional, 1977 (Dissertação de mestrado).

Pringle, C.M. Exploring how disturbance is transmitted upstream: going against the flow. Journal of the North Americam Benthological Society, 16: 425-438, 1997.

Prefeitura Municipal de Cantagalo. http://www.cantagalo.rj.gov.br/. Acesso Maio 20009

Pringle, C.M., Hamazaki, T. The role of omnivory in a neotropical stream: separating diurnal and nocturnal effects. Ecology, 79(1): 269-280, 1998.

Projeto Piabanha. 2007. Relatório "Diagnóstico da cadeia produtiva pesqueira do município de Itaocara e seus impactos na fauna aquática do Domínio das Ilhas Fluviais do Curso Médio Inferior Rio Paraíba do Sul". www.corredores.org.br. Acessado em 23.04.09.

PROJETO RIO DE JANEIRO. Relatórios Técnicos. Brasília, CPRM - Serviço Geológico do Brasil, Departamento de Recursos Minerais - DRM - RJ. Vol. I, Tomo 1 a 3, Estudos e Levantamentos Pedológicos. 2000.

Projeto Uatú Piranga, 1996. Peixes do rio Piranga: surubim. *Museu de Zoologia, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa, nº. 3*: 7 p.

Q

QUEIROZ, Maria Izaura Pereira. Variações sobre a técnica de gravador no registro da informação viva. São Paulo, 1983.

QUINTAS, J.S., *et all*. Pensando e praticando a educação ambiental não processo de gestão Ambiental – Uma concepção pedagógica e metodológica para a prática da educação ambiental no licenciamento. Brasília: IBAMA, 2006.

R

Radambrasil. 1983. Levantamento de recursos naturais. Vol. 32, Rio de Janeiro.

RAMALHO FILHO, A.; PEREIRA, E.G.; BEEK, K.J. Sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras. 3.ed. rev. Rio de Janeiro : SUPLAN/EMBRAPA-SNLCS, 1995. 65p.

RAMOS, R.R.C.; BRAGA, M.V.C.; OZANICK, C.; JATOBA, L.O. & CASTRO, J.W.A. 2005. Primeiro registro de tufas calcárias no Estado do Rio de Janeiro. *In*: X Congreso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, 2005, Guarapari/ES. X Congresso da ABEQUA, 2005. v. 1.

Ramos-Porto, M. & Coelho, P.A. 1999. malacostraca-Eucarida-Caridea (Alpheoidea excluded). *In:* YOUNG, P.S. (ed.) *Catalogue of crustacea of Brazil*. Rio de Janeiro, Museu Nacional. P. 325-350 (Série Livros, nº6)

RANGEL, E. F.; LAINSON, R. Ecologia das leishmanioses. Transmissores da leishmaniose tegumentar americana. In RANGEL, E. F.; LAINSON, R. (org.) Flebotomíneos do Brasil. Rio de Janeiro: Editora da Fiocruz, p. 291–310, 2003a.

RANGEL, E. F.; LAINSON, R. Flebotomíneos do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003b.

Reis, N. R. D., A. L. Peracchi, W. A. Pedro, & I. P. D. Lima. 2007. Morcegos do Brasil, Londrina.

Reis, N. R., A. L. Peracchi, & F. R. Andrade. 2008. Primatas brasileiros. Technical Books, Londrina.

Reis, N. R., A. L. Peracchi, W. A. Pedro, & I. P. Lima. 2006. Mamíferos do Brasil, Londrina.

Reis, R. E. & E. H. L. Pereira 2000. Three new species of the loricariid catfish genus *Loricariichthys* (Teleostei: Siluriformes) from southern South America. *Copeia* 2000:1029-1047

REUNIÃO TÉCNICA DE LEVANTAMENTO DE SOLOS, 10., 1979, Rio de Janeiro, RJ. Súmula... Rio de Janeiro : EMBRAPA-SNLCS, 1979b. 83p. (EMBRAPA-SNLCS. Série Miscelânia, 1).

REUTHER, C. 2000. Results of an initial field survey for otter (*Lutra lutra*) in Jordan. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin.* 17(2): 75-79.

REUTHER, C. & DOLEV, A. 2000. New findings of otters (*Lutra lutra*) in Israel. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin.* 17(2): 80-82.

Reuther, C. & Dolev, A. 2000. New findings of otters (*Lutra lutra*) in Israel. IUCN Otter Specialist Group Bulletin. 17(2): 80-82.

Reuther, C. 2000. Results of an initial field survey for otter (*Lutra lutra*) in Jordan. IUCN Otter Specialist Group Bulletin. 17(2): 75-79.

REY, L. 2003. Parasitologia. Editora Guanabara Koogan S., Rio de Janeiro, 731p.

Reynolds, C.S.; Descy, J-P; Padisák, J. 1994. Are phytoplankton dynamic in rivers so different from those in shallow lakes? Hydrobiologia 285:1–7.

REZENDE, H. R.; SESSA, P. A.; FERREIRA, A. L.; SANTOS, C. B.; LEITE, G. R.; FALQUETO, A. Efeitos da implantação da Usina Hidrelétrica de Rosal, Rio Itabapoana, Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, sobre anofelinos, planorbídeos e flebotomíneos. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 42, p. 2009.

REZENDE, H.R. 2007. Distribuição mensal, espacial e frequencia horária de anofelinos (diptera: culicidae) em área de malária autóctone na região serrana do Espírito Santo, Brasil, *Ano de Obtenção:* 2007.

RHODIN, A.G.J & MITTERMEIER, R.A. 1983. Description of Phrynops williamsi, a new species of chelid turtle of the South American P. geoffroannus complex. In: Advances in Herpetology and Evolutionary Biology: Essays in Honor of Ernest Williams. RHODIN, A.G.J. & MIYATA, K. (Eds.), pp.58-73. Cambridge, MA: Museum of Comparative Zoology, Harvard University.

RHODIN, A.G.J, ROCHA E SILVA, R. & MITTERMEIER, R.A. 1984. Distribution of the South American chelid turtles Platemys radiolata and P. spixii. Copeia 1984(3): 780-786.

RHODIN, A.G.J. 1982. *Phrynops hogei*. In: IUCN Amphibia and Reptilia Red Data Book Part I:Testudines, Crocodylia and Rhynchocephalia. Gland, IUCN. 98.

Rhodin, A.G.J., R.A. Mittermeier and R. Rocha-e-Silva. 1982. Distribution and taxonomic status of Phrynops hogei, a rare chelid turtle from southeastern Brazil. Copeia. (1):179-181.

RHODIN, AG.J. Red-headed sideneck turtle, Phrynops rufipes (Spix, 1824). In: IUCN Red Data Book: Amphibia-Reptilia. Testudines, Crocodylia, Rhynchocephala. Gland, IUCN. Part 1, pp. 273-274.

RHODIN, AG.J., MITTERMEIER, R.A., & ROCHA E SILVA, R. 1982. Distribution and Taxonomy Status of Phrynops hogei, a rare chelidae turtle from Southeastern Brazil. *Copeia*, 1: 179-181.

RIBEIRO, F.M. 2003. Inventário de ciclo de vida da geração hidrelétrica no Brasil - Usina de Itaipu: primeira aproximação. São Paulo. Dissertação (Mestrado em Energia). Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, São Paulo. 456f.

Ribeiro, M. C. L. B. 1995. Conservação e manejo da integridade ecológica em ecossistemas aquáticos: abordagem quantitativa. In: Tauk-Tornisielo, S. M.; Gobbi, N.; Foresti, C. & Lima, S. T. Análise ambiental: estratégias e ações. T. A. Queiroz Ltda, São Paulo, 130-134.

Ricklefs, R.E. A Economia da Natureza. 5ª ed, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan S.A, 542p. 2003.

RICOMINNI,C.; SANT'ÀNA,L.G. e FERRARI,A.L., Evolução Geológica do *Rift* Continental do Sudeste do Brasil. In: MANTESSO-NETO,A.; BARTORELLI,A.; DALKÉ CARNEIRO, C.; BRITO-NEVES,B.B. (Orgs), Geologia do Continente Sul Americano: Evolução da Obra de Fernando Flávio Marques de Almeida. São Paulo: Ed. Beca, 647p. 2004.

Ridgley, R. S. & Tudor, G. *1994. The Birds of South America. Vol. 2.* Austin: University of Texas.

RIZZINI, C. T. 1997. Tratado de Fitogeografia Brasileira. Aspectos ecológicos, sociológicos e florísticos. Rio de Janeiro. Âmbito Cultural Edições Ltda.

Robert, C. 1987. Loss of genetic diversity from managed populations: Interacting effects of drift, mutation, immigration, selection, and population subdivision. Conservation Biology 1(2): 143-158.

Rocco, Rogério. Legislação Brasileira do Meio Ambiente. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

ROCHA C.F.D.; D. VRCIBRADIC; M.C. KIEFER; M. ALMEIDA-GOMES; V.N.T. BORGES-JUNIOR; P.C.F. CARNEIRO; R.V. MARRA; P. ALMEIDA- SANTOS; C.C. SIQUEIRA; P. GOYANNES; C.G.A. FERNANDES, E.C.N. RUBIÃO & M. VAN SLUYS. 2007. A survey of the leaf-litter frog assembly from an Atlantic forest area (Reserva Ecológica de Guapiaçu) in Rio de Janeiro State, Brazil, with an estimate of frog densities. Tropical Zoology 20:99-108.

ROCHA E SILVA, R. DA & KISCHLAT, E. 1992. Considerações sobre quelônios de água-doce no estado do Rio de Janeiro. Second International Symposium on Environmental Studies of Tropical Rainforests, pp. 24-29 May, 1992, Rio de Janeiro, Brazil,

ROCHA, C. F D., M. VAN SLUYS, G. PUORTO, R. FERNANDES, J. D. BARROS FILHO, R. R E. SILVA, F. A. NÉO, AND A. MELGAREJO. 2000. Répteis. pp 79–87. In Bergallo, H. G., C. F D. Rocha, M. A S. Alves, and M. Van Sluys, editors. (Eds.). A fauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de Janeiro. Editora da UERJ. Rio de Janeiro.

Rocha, C. F. D., H. G. Bergallo, J. P. Pombal Jr, L. Geise, M. Van Sluys, R. Fernandes, & U. Caramaschi. 2004. Fauna de anfíbios, répteis e mamíferos do Estado do Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil. Publicações Avulsas do Museu Nacional 104: 3-23.

Rocha, C. F. D., H. G. Bergallo, M. A. S. Alves, and M. Van Sluys. 2003. A biodiversidade nos grandes remanescentes florestais do Estado do Rio de Janeiro e nas Restingas da Mata Atlântica. RiMa, São Carlos.

ROCHA, C. F. D.; H. G. BERGALLO; J. P. POMBAL JR; L. GEISE; M. VAN SLUYS; R. FERNANDES & U. CARAMASCHI. 2004. Fauna de anfíbios, répteis e mamíferos do Estado do Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil. Publicações Avulsas do Museu Nacional 104: 3-23.

ROCHA, C. F. D.; H. G. BERGALLO; M. A. S. ALVES & M. VAN SLUYS. 2003. A biodiversidade nos grandes remanescentes florestais do Estado do Rio de Janeiro e nas Restingas da Mata Atlântica. RiMa, São Carlos.

Rocha, C.F.D.; Van Sluys, M.; Alves, M.A.S.; Bergallo, H.G. & Vrcibradic, D. 2000. Activity of leaf-litter frogs: when should frogs be sampled? J. Herpetol. 34: 285-287.

ROCHA, S. S. & BUENO, S. L. S. Crustáceos decápodes de água doce com ocorrência no Vale do Ribeira de Iguape e rios costeiros adjacentes, São Paulo, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, v. 21, n. 4, p. 1001-1010, 2004.

ROCHA-E-SILVA, R. DA & KISCHLAT, E. 1992. Considerações sobre quelônios de água-doce no estado do Rio de Janeiro. *Second International Symposium on Environmental Studies of Tropical Rainforests*, pp. 24-29 May, 1992, Rio de Janeiro, Brazil.

Rodden, M., F. Rodrigues, & S. Bestelmeyer. 2004. Maned wolf (*Chrysocyon brachyurus*). Pp. 38-44 In: Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. Status Survey and Conservation Action Plan (C. Sillero-Zubiri, M. Hoffmann and D. W. Macdonald, eds.). IUCN/SSC Canid Specialist Group Gland, Switzerland & Cambridge.

RODRIGUERO, M. S.; GORLA, D. E. Latitudinal gradient in species richness of the New World Triatominae (Reduviidae). Global Ecology & Biogeography, v. 13, p. 75–84, 2004.

Rodrigues, André Figueiredo. Os sertões proibidos da Mantiqueira: desbravamento, ocupação da terra e as observações do governador dom Rodrigo José de Meneses in Rev. Bras. Hist. vol.23 no.46 São Paulo 2003.

RODRIGUES R. R. & NAVE, A. G.. 2000. Heterogeneidade florística de matas ciliares. P. 45-71. IN: R. R. Rodrigues & H. F. Leitão Filho (eds.). Matas ciliares: Conservação e recuperação. São Paulo, Edusp/Fapesp.

Rodrigues, F. H. G., A. Hass, A. C. R. Lacerda, R. L. S. C. Grando, M. A. Bagno, A. M. R. Bezerra, & W. R. Silva. 2007. Feeding habits of the maned wolf (Chrysocyon brachyurus) in the Brazilian Cerrado. Mastozoología Neotropical 14(1): 37-51.

Rodrigues, M. 2006. Hidrelétricas, ecologia comportamental, resgate de fauna: uma falácia. Natureza & Conservação, 4(1): 29-38.

RODRIGUES, M.T. & TELLES, A.M. 2004. *Scinax trapicheiroi*. In: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 31 July 2009.

Rojo, C.; Colbelas, M.A.; Arauzo M. 1994. An elementary structure analysis of the river phytoplakton. Hydrobiologia 285:43–55.

Rosa, P. G. 2008. Comunidade zooplanctônica de cinco reservatórios tropicais do sistema Furnas S. A. (Brasil): abundância e biomassa de carbono. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Juiz de Fora, 133pp.

Rosa, R. S. & N. A. Menezes. 1996. Relação preliminar das espécies de peixes (Pisces, Elasmobranchii, Actinopterygii) ameaçadas do Brazil. Rev. Bras. Zool 13 (3): 647-667. São Paulo, 1998.

Rosas, F.C.W. 2004. Lontra, Lontra longicaudis (Carnivora: Mustelidae). Pp. 261-264. In: R. Cintra (ed.). História natural, ecologia e conservação de algumas espécies de plantas e animais da Amazônia. EDUA/INPA, Manaus, 333 pp.

ROSAS, F.C.W.; COLARES, E.P.; COLARES, I.G. & SLVA, V.M.F. 1991. Mamíferos aquáticos da Amazônia brasileira. 405-411. In: Val, A.L.; Figliuolo, R. & Feldsberg, E. Bases científicas para o estabelecimento de estratégias de preservação e desenvolvimento da Amazônia: fatos e perspectivas. vol.1, 440 p.

Rosemberg, D.N.; Resh, V.H. (eds). 1993. Freshwater biomonitoring and benthic macroinvertebrates. Chapman & Hall, New York, 488p.

Rosemond, A. D., Pringle, C. M., Ramírez, A. Macroconsumer effects on insect detritivores and detritus processing in a tropical stream. Freshwater Biology, 39 (3), 515-523(9), 1998.

ROSS, J.L.S., Geomorfologia, ambiente e planejamento, São Paulo, Ed. Contexto, 1990, 85p.

ROSS,J.L.S., Geografia do Brasil. Ed. USP, São Paulo, 2000.

ROTHMAN, Franklin Daniel. Mobilização, resistência e participação das comunidades atingidas por barragens: O projeto de assessoria e o movimento dos atingidos por barragens em Minas Gerais. Disponível: em http://www.unizar.es/fnca/america/docu/1711.pdf. Capturado em agosto de 2006.

ROWE-ROWE, D.T. 1977. Food ecology of otters in Natal, South Africa. *Oikos*. 28(2-3): 210-219.

RUIZ-OLMO J. & GOSÁLBEZ J. 1997. Observations on the sprainting behaviour of the otter *Lutra lutra* in the NE Spain. *Acta Theriologica* 42: 259-270.

S

Sabino, J. & Castro, R. M. C. 1990. Alimentação, período de atividade e distribuição espacial dos peixes de um riacho da Floresta Atlântica (Sudeste do Brasil). *Rev. Brasil. Biol.* 50: 26-36

Saldanha, R.V. 1987. Ocorrência de Atya scabra (Leach, 1815), Crustacea, Decapoda, Atyidae) no Estado do Rio de Janeiro. Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, Rio de Janeiro, 12pp.

Sale, M.J. 1985. Aquatic ecosystem response to flow modification: an overview of the issues. *Proceedings of the Symposium on small hydropower and fisheries*. 25-31.

SALLES, R.O. L. & SILVEIRA, A.L. 2009. Distribuição geográfica dos quelônios continentais do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Caderno de Resumos do IV Congresso Brasileiro de Herpetologia.

SANCHES, F. & FISCH, G. 2005. As possíveis alterações microclimáticas devido à formação do lago artificial da hidrelétrica de Tucuruí – PA. Acta Amazônica, 35(1): 41-50.

Sanches, L. H. 2008 Avaliação de Impactos Ambientais, Conceitos e Métodos. Ed. Livraria Conceito, 2008.

Santori, R. T., D. A. D. Moraes, & R. Cerqueira. 1995. Diet composition of *Metachirus nudicaudatus* and *Didelphis aurita* (Marsupialia, Didelphoidea) in Southeastern Brazil. Mammalia 59(4): 511-516.

SANTOS, C. B.; FERREIRA, A. L.; LEITE, G. R.; FERREIRA, G. E. M.; RODRIGUES, A. A. F.; FALQUETO, A. Peridomiciliary colonies of *Triatoma vitticeps* (Stal, 1859) (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae) infected with *Trypanosoma cruzi* in rural areas of the state of Espírito Santo, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 100, p. 471–473, 2005.

SANTOS, C. B.; LEITE, G. R.; FERREIRA, G. E. M.; FERREIRA, A. L. Infecção natural de *Triatoma vitticeps* (Stal, 1859) por flagelados morfologicamente semelhantes a *Trypanosoma cruzi* (Chagas, 1909) no Estado do Espírito Santo, Brasil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 39, p. 89–91, 2006a.

SANTOS, C. B.; LEITE, G. R.; SESSA, P. A.; FALQUETO, A. Dynamics of feeding and defecation in *Triatoma vitticeps* (Stal, 1859) (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae) and its potential in the transmission of *Trypanosoma cruzi*. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 101, p. 543–546, 2006b.

SANTOS, Mariana Rodrigues. Mulheres e movimento de atingidos por barragens: participação autorizada ou autônoma? UFV- Viçosa, 2002. (Dissertação de mestrado em Extensão Rural).

SANTOS, R. L. C. Atualização da distribuição de *Aedes albopictus* no Brasil (1997–2002). Revista de Saúde Pública, v. 37, p. 671–673, 2003.

Saraça, C. E. S.; Rahy, I. S.; Santos, M. A.; Costa, M. B.; Alencar, R. S. & Peres, W. R. 2009. A propósito de uma nova regionalização para o estado do Rio de Janeiro. In: Bergallo, H. G.; Fidalgo, E. C. C.; Rocha, C. F. D.; Uzêda, M. C.; Costa, M. B.; Alves, M. A. S.; van Sluys, M.; Santos, M. A.; Costa, T. C. C. & Cozzolino, A. C. R (orgs.). Estratégias e ações para a conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Instituto Biomas.

Saraça, C. E., I. S. Rahy, M. A. Santos, M. B. Costa, & W. R. Peres. 2007. A propósito de uma nova regionalização para o Estado do Rio de Janeiro, Pp. 18-27 in Revista de Economia Fluminense.

SAWAYA, M.P. 1946. Sobre alguns camarões d'água doce do Bra sil. Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, Zoologia, São Paulo, 11: 393-407.

Sazima, M., S. Buzato, & I. Sazima. 1999. Bat-pollinated Flower Assemblages and Bat Visitors at Two Atlantic Forest Sites in Brazil. Annals of Botany 83: 705-712.

SCARPINELLA, C.A. 1999. Porto Primavera: o paradigma de análise e os processos de decisão e implantação. São Paulo. Tese (Doutorado em Energia). Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, Instituto de Eletrotécnica e Energia, Instituto de Física, Faculdade de Economia de Administração, São Paulo. 186f.

SCHÄFFER, W. B.; PROCHNOW, M. MATA ATLÂNTICA. IN: SCHÄFFER, W. B.; PROCHNOW, M. (Org.). A Mata Atlântica e Você: como preservar, recuperar e se beneficiar da mais ameaçada floresta brasileira. Brasília: APREMAVI, 2002. p. 12-45.

SCHMITT, W.L. 1942. The Species of *Aegla,* endemic South American Fresh-water Crustacean. Proceedings of the United States National Museum, Washington, 91 (31-32): 431-524.

SCHUAB, F.B. Contribuições da Geologia Regional e Local em Projetos de Fundação de Barragens: o caso estudado da UHE Itaocara. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Claudio Palmeiro do Amaral.

Schweizer, G. Ariranhas no Pantanal: ecologia e comportamento da *Pteronura brasiliensis*. Curitiba: Edibran. 1992.

Sebastião, H., & C. E. V. Grelle. 2009. Taxon surrogates among Amazonian mammals: Can total species richness be predicted by single orders? Ecological Indicators 9: 160-166.

SERUFO, S. C.; OCA, H. M.; TAVARES, V. A.; SOUZA, A. M.; ROSA, R. V.; JAMAL, M. C.; LEMOS, J. R.; OLIVEIRA, M. A.; NOGUEIRA, R. M.; SCHATZMAYR, H. G. Isolation of dengue virus type 1 from larvae of *Aedes albopictus* in Campos Altos, state of Minas Gerais, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 88, p. 503–504, 1993.

SEVERO, Christiane Marques. "Pesca artesanal em Santa Catarina: Evolução e diferenciação dos pescadores da Praia da Pinheira". Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento Rural, Porto Alegre, 2008.

Shannon CE, Weaver W. 1963. The Mathematical Theory of Communication. Illinois University Press: Urbana, USA.

Sheath, R.G.; Burkholder, J. 1985. Characteristics of softwater stream in Rhode Island. II: Composition and seasonal dynamics of macroalgae communities. Hydrobiologia 128: 109-118.

Sheath, R.G.; Cole, K.M. 1992. Biogeography of stream macroalgae in North America. Journal of Phycology 28: 448-460.

Sheath, R.G.; Müller, K.M. 1997. Distribution of stream macroalgae in four high artic drainage basins. Artic 50: 355-364.

Sheldon F. & Walker K.F. Spatial distribution of littoral invertebrates in the lower Murray-Darling River system, Australia. Marine and Freshwater Research, 49, 171-182, 1998.

Sherwood, A.R.; Sheath, R.G. 1999. Seasonality of macroalgae and epilithic diatoms in spring-fed streams in Texas, U.S.A. Hydrobiologia 390: 73-82.

Sick, H. 1997. Ornitologia Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.

Sigrist, T. 2006. Aves do Brasil. São Paulo: Avis Brasilis.

Sigrist, T. 2009a. Guia de campo avis brasilis – avifauna brasileira: pranchas e mapas. São Paulo: Avis Brasilis.

Sigrist, T. 2009b. Guia de campo avis brasilis – avifauna brasileira: descrição das espécies. São Paulo: Avis Brasilis.

Silfvergrip, A. M. C. 1996. *A systematic revision of the Neotropical catfish genus Rhamdia (Teleostei, Pimelodidae*). Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden. 156 p. ()

Silva Jr., N. J., H. L. R. Silva, M. C. Costa, M. A. Buononato, M. L. S. Tonial, R. S. Ribeiro, L. A. Moreira, & A. D. M. Pessoa. 2007. Avaliação preliminar da fauna silvestre terrestre do Vale do rio Caiapó, Goiás: Implicações para a conservação da biodiversidade regional. Estudos, Goiânia 34(11/12): 1057-1094.

Silva, E. F., E. Z. F. Setz, & N. Gobbi. 2003. Diet of the maned wolf (Chrysocyon brachyurus) and its role in seed dispersal on a cattle ranch in Brazil. Journal of Zoology 260: 203-208.

Silva, E.O.; Novelli. Biologia reprodutiva da lagosta de São Fidélis Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758). Livro de Resumo do VI Congresso de Ecologia do Brasil, Fortaleza, 2003.

SILVA, G. C & Nascimento, M. T. 2001. Fitossociologia de um remanescente de mata sobre tabuleiros no norte do estado do Rio de Janeiro (mata do Carvão). Rer. Bras. Bot. V. 24 n. 1. São Paulo-SP.

SILVA, N. R. S., MARINS, S. V., MEIRA NETO, J. A. A. & SOUZA, A. L. 2004. Composição florística e estrutura de uma Floresta Estacional Semidecidual Montana em Viçosa, MG. Revista Árvore, v. 28 nº. 3, p. 397-405.

Silva-Filho, J. D. & Melo-Júnior, T. A. 2004. Padrão de distribuição da população do cuitelão (Jacamaralcyon tridactyla) na PCH Cachoeira Encoberta, Muriaé – MG. *Livro de resumos do XXII Congresso Brasileiro de Ornitologia, Blumenau, SC*.

Silveira, L. F. e Nobre, H. R. 1998. New records of Three-toed Jacamar Jacamaralcyon tridactyla in Minas Gerais, Brazil, with some notes on its biology. *Cotinga*, 9: 47-51.

SILVEIRA, L.F. & Straube, F.C. Aves ameaçadas de extinção no Brasil.. In: A.B.M.Machado; G.M Drummond; A.P.Paglia. (Org.). Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas, 2008, v. 2, p. 378-679.

Smith, W.S. & Petrere Jr., M. 2001. Peixes em represas: o caso de Itupararanga. Ciência Hoje, 29: 74-77.

Soares, M.C.S; Huszar V.; Roland F. 2007. Phytoplankton dynamics in two tropical rivers with different degrees of human impact (Southeast Brazil). River. Res. Applic. 23: 698–714.

SOCIEDADE CARIOCA DE PESQUISAS ESPELEOLÓGICAS - SPEC, 1998. Diagnóstico Ambiental e Avaliação do Potencial Turístico da Gruta Novo Tempo, Município de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro. SPEC, DRM-RJ, SEBRAE, Prefeitura Municipal de Cantagalo. Rio de Janeiro: 45 p.

Soldateli, M. & Blacher, C. 1996. Considerações preliminares sobre o número e distribuição espaço/temporal de sinais de *Lutra longicaudis* (Olfers,1818)(Carnivora: Mustelidae) nas lagoas da Conceição e do Peri, Ilha de Santa Catarina, SC, Brasil. Biotemas. 9:(1)38-64

SONDOTÉCNICA & EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Avaliação Ambiental Integrada dos aproveitamentos hidrelétricos da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. 4 volumes, 2007.

SOS Mata Atlântica/INPE/ISA, 2002. Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica no período de 1995 - 2000. Relatório Final. dig. 46p.

Souza, D. C. 2000. Padrões de diversidade α e β da assembléia de macrófitas aquáticas em diferentes escalas espaciais no reservatório de Itaipu. Dissertação (Mestrado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais) – Departamento de Ecologia da Universidade Estadual de Maringá. Maringá,

Souza, F. L. 1999. Ecologia do cágado *Phrynops geoffroanus* (Schweigger, 1812) em ambiente urbano poluído (Reptilia, Testudines, Chelidae). Tese de Doutorado Não-publicada. Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, Brasil

SOUZA, F. L. 2004. Uma revisão sobre padrões de atividade, reprodução e alimentação de cágados brasileiros (Testudines, Chelidae). Phyllomedusa 3(1): 15-27.

Souza, F. L. e A. S. Abe. 1997. Population structure, activity, and conservation of the Neotropical freshwater turtle, *Hydromedusa maximiliani*, in Brazil. *Chelonian Conservation and Biology 2*: 521–525.

SOUZA, F.L. 2005. The Brazilian snake-necked turtle, Hydromedusa maximiliani. Reptilia, 40:47-51.

Souza, Franco, L., Cunha, A.F., Oliveira, M. A,. Pereira, G. A.G & Reis, S.F. 2002. Estimating dispersal and gene flow in the neotropical freshwater turtle *Hydromedusa maximiliani* (Chelidae) by combining ecological and genetic methods. *Genetics and Molecular Biology*, 25, 2, 151-155 .

SOUZA, Franco, L., CUNHA, A.F., OLIVEIRA, M. A,. PEREIRA, G. A.G & REIS, S.F. 2002. Estimating dispersal and gene flow in the neotropical freshwater turtle Hydromedusa maximiliani (Chelidae) by combining ecological and genetic methods. Genetics and Molecular Biology, 25, 2, 151-155.

SOUZA, M. B.; MARZOCHI, M. C. A.; CARVALHO, R. W.; RIBEIRO, P. C.; PONTES, C. S.; CAETANO, J. M.; MEIRA, A. M. Ausência da *Lutzomyia longipalpis* em algumas áreas de ocorrência de leishmaniose visceral no Município do Rio de Janeiro. Cadernos de Saúde Pública, v. 19, p. 1881–1885, 2003.

SOUZA, M.B. & GALVANI, E. 2009. Influência da formação de reservatórios no microclima: estudos preliminares de Presidente Epitácio (SP). In: XII Encuentro de Geografos de América Latina: Caminando en una América Latina em transformación – Montevidéu/Uruguai.

Souza, M.L.; Moulton, T.P. The effects of shrimps on benthic material in a Brazilian island stream. Freshwater Biology, 50: 592-602, 2005.

SOUZA, R. C. M.; BARBOSA, S. E.; SONODA, I. V.; AZEREDO, B. V. M.; ROMANHA, A. J.; DIOTAIUTI, L. Population dynamics of *Triatoma vitticeps* (Stal, 1859) in Itanhomi, Minas Gerais, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 103, p. 12–20, 2008.

SOUZA, R.L. Os sentidos do povoamento: aspectos da ocupação territorial de Minas Gerais. Revista Ciências Humanas. Universidade de Taubaté. 1(1): 1-19. 2009.

Sperber, Dan. Estudo antropológico das representações: problemas e perspectivas. in As representações sociais. Jodelet, Denise (org). Rio de Janeiro. ED UERJ. 2001.

Spinola R.M. & Vaughan; C. (1995) Abundancia relativa y actividad de marcaje de la nutria Neotropical (Lutra longicaudis) en Costa Rica. Vida Silvestre Neotropical, 4, 38-45.

Stanley, E.H. and Doyle, M.W. A geomorphic perspective on nutrient retention following dam removal. BioScience 52: 693–701, 2002.

STEFANICK, M. & JURDY, D.M. Stress observation and driving force models for South American Plate. Journal of the Geophysical Res., 97(B8), 11.905-11.913. 1992.

STF, Tribunal Pleno, ADIn 3.378-6/DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Brasília, DJE 20/06/08

SUDIA, W. D.; CHAMBERLAIN, R. W. Battery operated light trap, an improved model. Mosquito News, v. 22, p. 126–129, 1962.

SYKES, L. R. Intraplate seismicity, reactivation of preexisting zones of weakness, alkaline magmatism and other tectonism post-dating continental fragmentation. Rev. Geophys. Space Phys., 16, 621-688, 1978.

T

TADEI, W. P.; THATCHER, B. D.; SANTOS, J. M. M.; SCARPASSA, V. M.; RODRIGUES, I. B.; RAFAEL, M. S. Ecology observations on anophelinae vectors of malaria in the brazilian amazon. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 59, p. 325–335, 1998.

TAUIL, P. L. Urbanização e ecologia do Dengue. Cadernos de Saúde Pública, v. 17, p. 99–102, 2001.

Tavares, M.S. 1993. Toward the history of pre-Linnean carcinology in Brazil. In: Truesdale, F. (ed.) History of carcinology. Rotterdam: A.A. Balkema. p. 7-29.

Teixeira, T. P., Pinto, B. C. T., Terra, B. F., Estiliano, E. O., Gracia,D., Araújo, F. G. 2005. Diversidade das assembléias de peixes nas quatro unidades geográficas do rio Paraíba do Sul. Iheringia, Ser. Zool., Porto Alegre, 95 (4) :347-357

TEODORO, U.; GUILHERME, A. L. F.; LOZOVEI, A. L.; SALVIA-FILHO, V. L.; FUKUSHIGUE, Y.; SPINOSA, R. P.; FERREIRA, M. E. M. C.; BARBOSA, O. C.; LIMA, E. M. Culicídeos do lago de Itaipu, no Rio Paraná, Sul do Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 29, p. 6–14, 1995.

Terborgh, J. 1983. Five New World primates - a study in comparative ecology. Princeton University Press, Princeton, NJ.

Terborgh, J., L. Lopez, P. Nunez, M. Rao, G. Shahabuddin, G. Orihuela, M. Riveros, R. Ascanio, G. H. Adler, T. D. Lambert, & L. Balbas. 2001. Ecological meltdown in predator-free forest fragments. Science 294(5548): 1923-6.

THIENGO S. C., FERNANDEZ M. A., BOAVENTURA M. F. F., GRAULT C. E., SILVA H. F. R., MATTOS A. C., SANTOS S. B. 2001. Freshwater snails and schistosomiasis mansoni in the state of Rio de Janeiro, Brazil: I – Metropolitan Mesoregion. Mem Inst Oswaldo Cruz 96 (Suppl.): 177-184.

THIENGO S. C., FERNANDEZ M. A., BOAVENTURA M. F. F., SANTOS S. B., MATTOS A. C. 2002ª. Freshwater snails and schistosomiasis mansoni in the state of Rio de Janeiro, Brazil: II – Centro Fluminense Mesoregion. *Mem Inst Oswaldo Cruz* 97: 621-626.

THIENGO S. C., FERNANDEZ M. A., BOAVENTURA M. F. F., STORTTI M. A. 1998. A survey of gastropods in the Microrregião Serrana of Rio de Janeiro, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz 93 (Suppl. I): 233-234.

THIENGO S. C., MATTOS A. C., BOAVENTURA M. F. F., FERNANDEZ M. A. 2004. Freshwater snails and ▫chistosomiasis mansoni in the state of Rio de Janeiro, Brazil: IV – Sul Fluminense Mesoregion. *Mem Inst Oswaldo Cruz* 99 (3): 275-280.

THIENGO S. C., MATTOS A. C., SANTOS S. B., FERNANDEZ M. A. 2006. Freshwater snails and schistosomiasis mansoni in the state of Rio de Janeiro, Brazil: VI – Noroeste Fluminense Mesoregion. Mem Inst Oswaldo Cruz 101 (1): 239-245.

THIENGO, S. C., C. E. BORDA & J. L. B. ARAÚJO. 1993. On Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) (Mollusca, Pilidae). Mem Inst Oswaldo Cruz, 88 (1): 67-71.

THIENGO, S. C., FERNANDEZ, M. A., MATTOS, A. C., BARBOSA, A. F., 2007. Dispersão do molusco introduzido *Melanoides tuberculatus* (Muller, 1774) (Gastropoda; Thiaridae) no Brasil. In: *Tópicos em Malacologia – Ecos do XVIII EBRAM*, Sociedade Brasileira de Malacologia, Rio de Janeiro, pp. 101-106.

THIENGO, S. C.; FERNANDEZ, M. A. Moluscos. In: Ronaldo Santos do Amaral; Silvana Carvalho Thiengo; Otávio Sarmento Pieri. (Org.). Vigilância e Controle de Moluscos de Importância médica: Diretrizes técnicas. 2 ed. Brasília: Editora MS, 2008, v. , p. 13-35.

THIENGO, S. C.; SANTOS, S. B.; FERNANDEZ, M. A. Malacofauna límnica da área de influência do lago da usina hidrelétrica de Serra da Mesa, Goiás, Brasil. I. Estudo qualitativo. Revista Brasileira de Zoologia, v. 22, p. 867–874, 2005.

THOMPSON, Paul. A voz do passado: história oral. Tradução, OLIVEIRA, Lólio Lorenço. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. pp 45-103.

Thorp J.H.; Black A.R.; Lack K.H.; Hagg K.H.; Wehr J.D. 1994. Zooplankton assemblages in Ontario River: Sea-seasonal, tributary and navigation dam effects. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 51: 1634-1643.

Thorp J.H.; Casper A.F. 2003. Importance of biotic interactions in large rivers: an experiment with planktivorous fish, dreissenid mussels, and zooplankton in the St. Lawrence River. River Research and Applications, 19, 265–279.

Tôha, F.A.L.; Velho, L.F.M.; Bonecker, C.C. 1999. Estrutura da comunidade zooplanctônica antes e após a formação do reservatório de Corumbá-GO. In Henry, R.(ed), Ecologia de reservatórios :estrutura, função e aspectos sociais. Botucatu. FAPESP e FUNDBIO. 350- 374pp.

TONHASCA-JUNIOR, A. 2005. Ecologia e história natural da Mata Atlântica. Ed. Interciência. Rio de Janeiro-RJ.

Townsend, C.R.; Begon, M. & Harper, J.L. 2006. Fundamentos em ecologia. 2ª ed. Porto Alegre, Ed. Artmed. 592 p.

TRAVASSOS, L.E.P. 2001. Impactos gerados pela UHE Porto Primavera sobre o meio físico e biótico de Campinas, Presidente Epitácio, SP. Revista de Biologia e Ciências da Terra, 1 (1).

TUBAKI, R. M.; MENEZES, R. M. T.; CARDOSO JR, R. P.; BERGO, E. S. Studies on entomological monitoring: mosquito species frequency in riverine habitats of the Igarapava dam, southern region, Brazil. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, v. 46, p. 223–229, 2004.

TUCKER, J. K., JANZEN, F. J. e PAUKSTIS, G. L.. 1997. Response of embryos of the red-eared turtle (Trachemys scripta elegans) to experimental exposure to water-satured substrates. Chelonian Conservation and Biology 2: 338–344.

TUPINAMBÁ, Miguel; SILVA, Luiz Guilherme Do Eirado; HEILBRON, Monica. O graben de Itaocara, Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. In: IX Simposio Nacional de estudos tectônicos/III International symposium on tectonics, 2003, Buzios. Boletim de resumos. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Geologia, 2003. p. 305-306.

Tupinambá.M., Heilbron.M., Duarte,B.P., Nogueira, J.N. , Valladares.C., Almeida.J., Eirado Silva.L.G., Medeiros.S.R., Almeida,C.G., Miranda, A., Ragatky, C.D., Mendes,J., Ludka, I. - GEOLOGIA DA FAIXA RIBEIRA SETENTRIONAL: ESTADO DA ARTE E CONEXÕES COM A FAIXA ARAÇUAÍ. GEONOMOS 15(1): 67 - 79, 2007.

Turekian, K.K.; Wedepohl, K.H. 1961. Distribution of elements in some major units of the earth´s crust. Geological Society of American Bulletin, 72: 175-192.

TURNER, G. T., GARDNER, R. H., O'NEILL, R. V. *Landscape ecology In theory and practice; pattern and process*, Springer- Verlag,New York, 2001

Turtle Taxonomy Working Group. 2008. An Annotated of Modern Turtle Terminal Taxa with Comments on Areas of Taxonomy Instability and Recent Changes. Chelonian Researches Monographs. 4: 173-179

U

Uehlinger, U., Kawecka, B. & Robinson, C.T. Effects of experimental floods on periphyton and stream metabolism below a high dam in the Swiss Alps (River Spöl). Aquatic Sciences - Research Across Boundaries, 65, 199-209, 2003.

Umetsu, F., L. Naxara, & R. Pardini. 2006. Evaluatin the efficiency of pitfall traps for sampling small mammals in the Neotropics. Journal of Mammalogy 87(4): 757-765.

Utermöhl, H. 1958. Zur vervollkommung der quantitativen phytoplankton - methodik. Mitteilungen der internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie, 9, 1–38.

V

VAINER, Carlos. Entrevista, concedida a Revista Consciência, em fevereiro de 2005. Disponível em: http://www.comciencia.br/entrevistas/2005/02/entrevista2.htm

VALENCIO, Norma Felicidade L S. "A pesca artesanal como identidade: mercantilização e dissolução de um modo de vida rural". Em: http://www.alasru.org/cdalasru2006/27%20GT%20Norma%20Felicidade%20L%20S%20Valencio.pdf . Acessado em 12/07/2009.

Valenti, W.C.; Mello, J.T.C.; Lobão, V.L. Maturation and growth curves of Macrobrachium carcinus (Linnaeus) (Crustacea, Decapoda, Palemonidae) from Ribeira, de Iguape river, southern Brazil. Revista Brasileira de Zoologia, 11(4): 649-658, 1994.

Van den Hoek, C.; Mann, D.G.; Jahns, H.M. 1995. Algae: an introduction to phycology. Cambridge, Cambrige University Press.

VAN DER PIJL, L. 1982. Principles of dispersal in higher plants. Berlin, 3 ed., Berlin, Springer-Verlag.

VANZOLINI, P. E. 1978. On South American *Hemidactylus* (Sauria: Gekkonidae). Pap. Av. Zool., São Paulo, 31(20): 307-343.

Vanzolini, P.E.; A.M.M. Ramos-Costa & L.J. Vitt. 1980. Répteis das caatingas. Rio de Janeiro, *Academia Brasileira de Ciências*. 161 p.

VAREJÃO, J. B.; SANTOS, C. B.; REZENDE, H. R.; BEVILACQUA, L. C.; FALQUETO, A. Criadouros de *Aedes (Stegomyia) aegypti* (Linnaeus, 1762) em bromélias nativas na Cidade de Vitória, ES. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 38, p. 238–240, 2005.

Vari, R.P. 1992. Systematics of the Neotropical Characiform genus *Cyphocharax* Fowler (Pisces: Ostariophysi). *Smithsonian Contributions to Zoology, 529*: 137p.

VASCONCELOS, C.H.; NOVO, E.M.L.M.; DONALÍSIO, M.R. 2006. Uso do sensoriamento remoto para estudar a influência de alterações ambientais na distribuição da malária na Amazônia brasileira. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 22(3): 517-526.

VASCONCELOS, P. F. C. Febre amarela: reflexões sobre a doença, as perspectivas para o século XXI e o risco da reurbanização. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 5, p. 244–258, 2002.

Vazzoler, A. E. A. M. & Menezes, N. A. 1992. Síntese dos conhecimentos sobre o comportamento reprodutivo dos Characiformes da América do Sul (Teleostei, Ostariophysi). *Rev. Brasil. Biol*. 52, 627-640.

Vazzoler, A. E. A. M.; Suzuki, H. I.; Marques, E. E. & Lizama, M. A. P. 1997. Primeira maturação gonadal, períodos e áreas de reprodução. pp. 250-265, *in*.: Vazzoler, A. E. A. M; Agostinho, A.A. & Hahn, N.S. (eds.) A planície de inundação do alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos. Editora da Universidade Estadual de Maringá, Maringá

Velho L.F.M.; Lansac Tôha F.A. 1996. Testate amoebae (Rhizopodea-Sarcodina) from zooplankton of the high Paraná river floodplain, State of Mato Grosso do Sul, Brazil: II. Family Difflugidae. Stud. Neotrop. Fauna Envir. 31: 179–192.

VELOSO, H. P.; RANGEL FILHO, A. L. & LIMA, J. C. A. 1991. Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal. IBGE, Rio de Janeiro.

Vera Y Conde, C. F., & C. F. D. Rocha. 2006. Habitat disturbance and small mammal richness and diversity in an Atlantic Rainforest area in Southeastern Brazil. Brazilian Journal of Biology 66: 983-990.

Verb, R.G.; Vis, M.L. 2001. Macroalgal communities from a acid mine drainage impacted watershed. Aquatic Botany 71: 93-107.

VERDADE, L. M. & PIÑA, C. I. 2006. *Caiman latirostris*. Catalogue of American Amphibians and Reptiles, 833: 1-21.

Verdade, L. M. 1998. Caiman latirostris. In: Ross, J. P. (ed.). Revised action plan for crocodiles. IUCN - The World Conservation Union, Gland, Switzerland, p.18-20.

Verdade, L. M.; Piña, C. I. 2006. Caiman latirostris. Catalogue of American Amphibians and Reptiles, 833: 1-21.

VEROCAI, Iara. Vocabulário Básico de Meio Ambiente. Rio de Janeiro, FEEMA/PETROBRAS, 1990.

Vestergaard, O.; K. Sand-Jensen. 2000. Aquatic macrophyte richness in Danish lakes in relation to alkalinity, transparency, and lake area. Can. J. Fish. aquat. Sci. 57: 2022–2031.

VIANA, V. M., 1995. Conservação da biodiversidade de fragmentos florestais em paisagens tropicais intensamente cultivadas. IN: Abordagens interdisciplinares para a conservação da biodiversidade biológica e dinâmica do uso da terra, Belo Horizonte, p. 135-154.

Vieira, E. M., & E. L. A. Monteiro-Filho. 2003. Vertical stratification of small mammals in the Atlantic rain forest of South-eastern Brazil. Journal of Tropical Ecology 19: 501-507.

Vieira, F. & Pompeu, P. S. 2001. Peixamentos: uma alternativa eficiente? Ciência Hoje, 30 (175): 28-33.

Vieira, M. V. 1997. Body size and form in two Neotropical marsupials, Didelphis aurita and Philander opossum (Marsupialia: Didelphidae). Mammalia 61(2): 245-254.

Vieira, M. V., C. E. V. Grelle, & R. Gentile. 2004. Differential trappability of small mammals in three habitats of southeastern Brazil. Revista Brasileira de Biologia 64(4): 895-900.

VIOTTI, C. B. Sismicidade induzida por reservatórios: barragens de terra e sismiciade brasileira. Construção Pesada, novembro de 1980.

Vogt, R. C. 2001. Turtles of Rio Negro. Conservation and management of ornamental fish resources of Rio Negro Basin, Amazonian, Brazil. (Eds.) Universidade do Amazonas Press. 309p.

W

Waldemarin, H.F. & Alvares, R. 2008. Lontra longicaudis. In: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.1. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 24/06/2009.

WALDEMARIN, H.F. & COLARES, E.P. 2000. Ulization of resting sites and dens by the neotropical river otter (L*ontra longicaudis*) in the south of Rio Grande do Sul State, Southern Brazil. *IUCN Otter Specialist Group Bulletin*. 17(1): 14-19.

Waldemarin, H.F. & Sábato, M.A. 2004. Projeto de Monitoramento de Lontras na área de influência do AHE Queimados. Relatório Final. 42pp.

WALDEMARIN, H.F. 1997. Estudo da ecologia de lontras (*Lontra longicaudis*) no Parque Nacional da Lagoa do peixe: Manejo e Conservação. Fundação Universidade do Rio Grande. Rio Grande – RS. Monografia.

Waldemarin, H.F., 2004. Ecologia da lontra neotropical (*Lontra longicaudis*), no trecho inferior da bacia do rio Mambucaba, Angra dos Reis. 122 pp. Rio de Janeiro: Tese de Doutorado, UERJ.

Weinberg, L. F. 1986. Nova coletânea e listagem das aves de Nova Friburgo, Cantagalo e Trajano de Morais. *Boletim da Fundação Brasileira de Conservação da Natureza*, 21: 168-190.

Westwood, K.J.; Ganf, G.G. 2004. Effect of mixing patterns and light dose on growth of Anabaena circinalis in a turbid, lowland river. River Res. Applic. 20: 115–126.

Wetzel, R.G.; Likens, G.E. 1991 Limnological Analyses, 2nd edition, New York , W.B. Saunders Company, 391p.

Wiegmann, A.F.A. 1836. Beschreibung einiger neuen Crustaceen des Berliner Museums aus Mexico und Brazilien. *Archiv für Naturgeschichte 2*(1): 145-151.

WILLIAMS, D.F. & S.E. BRAUN. 1983. Comparison of pitfall and conventional traps for sampling small mammal populations. Jour. Wildl. Manage. 47: 841-845.

Wilson, D. E., & D. A. M. Reeder. 2005. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. Johns Hopkins University Press.

Wilson, M. V.; Shmida, A. 1984. Measuring beta diversity with presence-absence data. Journal of Ecology, 72: 1055-1064.

WISCHMEIER, W.H.; JOHNSON, C.B.; CROSS, B.V. A soil erodibility nomograph for farmland and construction sites. Journal of Soil and Water Conservation, Ankeny, v.26, n.5, p.189-193, Sept./Oct. 1971.

WOORTMANN, Klass; WOORTMANN, Ellen. O Trabalho da Terra: a lógica e a simbólica da lavoura camponesa. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997.

WWF–Brasil, IIEB – Instituto Internacional de Educação do Brasil . Manual de Comunicação e Meio Ambiente - São Paulo: Petrópolis, 2004. Vários autores.

Y

Yamaschita, C. 1990. Hidromedusa Maximiliano. Ecology. Herp.Review 21(1):19.

Z

Zalewski, M.; Puchalski, W.; Frankiewicz, P. & Bis, B. 1994. Riparian ecotones and fish communities in rivers - intermediate complexity hypothesis. 152-160 *In*: Cowx, I.G. (ed.) Rehabilitation of freshwater fisheries. Fishing New Books, London.

ZELEDÓN, R. Effects of triatominae behavior on trypanosome transmission. In (org.) New approaches in american trypanosomiasis research. Washington: Pan American Health Organization, p. 336–329, 1976.

ZOBACK, L. M & RICHARDSON, R. M. Stress perturbation associated with the Amazonas and other ancient continental rifts. Journal of Geophysical Research, Arizona, Vol. 101, Nº. B3, p. 5459-5475, March 10, 1996.

Rebelo, M. A. **Florística e Fitossociologia de um Remanescente Florestal Ciliar: Subsídio para a Reabilitação da Vegetação Ciliar para a Microbacia do Rio Três Cachoeiras, Laguna, SC**. 2006. 144f. dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais), Área de Ecologia e Gestão de Ambientes Alterados, Ciências Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, Criciúma, SC, 2006.

Silva, N.R.S.; Martins, S.V.; Neto, J.A.A.M.; Souza, A.L. Composição Florística e Estrutura de uma Floresta Estacional Semidecidual Montana em Viçosa, MG. **Revista Árvore**, v.28, n.3, p.397-405, 2004.

Moreno, R.M.; Nascimento, M.T.; Kurtz, B.C. 2003. Estrutura e Composição Florística do Estrato Arbóreo em Duas Zonas Altitudinais na Mata Atlântica de Encosta da Região do Imbé, RJ. **Acta Botanica Brasilica 17**(3): 371-386.

Missouri Botanical Garden – MOBOT. Disponível em <http://www.tropicos.org/Name/21300035?tab=distribution>. Acesso em 5 de abr. 2011.

LORENZI, H. **Árvores Brasileiras**: Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil. Nova Odessa: Plantarum, 1992. v.1.368p.

Borges, P.A.F.; Train S. 2009. Phytoplankton diversity in the Upper Paraná River floodplain during two years of drought (2000 and 2001). Braz. J. Biol., 69(2, Suppl.): 637-647.

Branco, C.C.Z.; Necchi, O.Jr. 1996. Distribution of stream macroalgae in the eastern Atlantic Rainforest of São Paulo State, sotheastern Brazil. Algological Studies 333: 139-150.

Brandimarte, A. L.; Anaya, M.; Shimizu, G.Y. 2070. Comunidades de invertebrados bentônicos nas fases pré- e pós-enchimento em reservatórios: um estudo de caso no reservatório de aproveitamento múltiplo do rio Mogi-Guaçu (SP). In: Henry. (Org.). Ecologia de reservatórios: estrutura, função e aspectos sociais. Botucatu: FUNDIBIO: FAPESP, p. 375-408.

Frutos, M. 1998. Densidad y Diversidad del Zooplancton en los Ríos Salado y Negro – Planicie del Río Paraná – Argentina. Rev. Brasil. Biol., 58(3): 431-444.

Lansac-toha, F.A.; Velho, L.F.M.; Bonecker, C.C. 2007. Estrutura da comunidade zooplanctônica antes e após a formação do reservatório de Corumbá - GO . in: Henry. R. (org.). Ecologia de reservatórios: estrutura, funções e aspectos sociais. 1 ed. botucatu: universidade estadual paulista/fapesp, p. 347-374.

Lansac-Tôha, F.A.; Bonecker, C.C.; Velho, L.F.M.; Simões, N.R.; Dias, J.D.; Alves, G.M.; Takahashi, E.M. 2009. Biodiversity of zooplankton communities in the Upper Paraná River floodplain: interannual variation from long-term studies. Braz. J. Biol., 69(2, Suppl.): 539-549.

Molozzi, J.; Hepp, L.U.; Dias, A.S. 2007. Influence of Rice Crop on the Benthic Community in Itajaí Valley (Santa Catarina, Brazil) Acta Limnol. Bras. 19(4)383-392.

Necchi, O.Jr., Branco, L.H.Z. & Branco, C.C.Z. 2003. Ecological distribution of stream macroalgal communities from a drainage basin in the Serra da Canastra National Park, Minas Gerais, Southeastern Brazil. Brazilian Journal of Biology 63: 1-12.

Necchi, O.Jr.; Pascoaloto, D.; Branco, L.H.Z. 1994. Distribution of macroalgae in a tropical river basin from southeastern Brazil. Archiv für Hydrobiologie 129: 459-471.

Pereira, D.; de Luca, S.J. 2003. Benthic macroinvertebrates and the quality of the hydric sources in Maratá Creek basin (Rio Grande do Sul, Brazil). Acta Limnol. Bras. 15(2):57-68.

Ribeiro, L.O.; Uieda, V.S. 2005. Estrutura da comunidade de macroinvertebrados bentônicos de um riacho de serra em Itatinga, São Paulo, Brasil. Rev. Bras. Zool., vol.22, no.3, p.613-618.

Rodrigues, S.C.; Torgan, L.; Schwarzbold, A. 2007. Composição e variação sazonal da riqueza do fitoplâncton na foz de rios do delta do Jacuí, RS, Brasil. Acta bot. bras. 21(3): 707-721.

Sheath, R.G.; Cole, K.M. 1992. Biogeography of stream macroalgae in North America. Journal of Phycology 28: 448-460.

Sheath, R.G.; Müller, K.M. 1997. Distribution of stream macroalgae in four high artic drainage basins. Artic 50: 355-364.

Sheath, R.G.; Hamilton, P.B.; Hambrook, J.A. & Cole, K.M. 1989. Stream macroalgae of Eastern boreal forest region of North America. *Canadian Journal of Botany* 67: 3553-3562.

Sheath, R.G., Morison, M.O., Korch, J.E., Kaczmarczyk, D. & Cole, K.M. 1986. Distribution of stream macroalgae in South-central Alaska. *Hydrobiologia* 135: 259-269.

SILVEIRA, M. P., BUSS, D. F., NE SSIMIAN , J. L. and BAPTI STA, D. F. 2006. Spatial and temporal distribution of benthic macroinvertebrates in a southeastern Brazilian River. Braz. J. Biol., 66(2B): 623-632.

Soares, MCS; Huszar, VLM e Roland, F. 2007. PHYTOPLANKTON DYNAMICS IN TWO TROPICAL RIVERS WITH DIFFERENT DEGREES OF HUMAN IMPACT (SOUTHEAST BRAZIL). River. Res. Applic. 23: 698–714.

Soares, MCS; Sophia, MG e Huszar, VLM. 2007. Phytoplankton flora of two rivers in Southeast Brazil – Paraibuna and Pomba Rivers, Minas Gerais. Revista Brasil. Bot., V.30, n.3, p.433-450.

Trivinho-Strixino, S. & Strixino, G. 2005. CHIRONOMIDAE (DIPTERA) DO RIO RIBEIRA (DIVISA DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E PARANÁ) NUMA AVALIAÇÃO AMBIENTAL FAUNÍSTICA. Entomol. Vect. 12 (2): 243-253.

Vis, M.L., Sheath, R.G., Hambrook, J.A. & Cole, K.M. 1994. Stream macroalgae of the Hawaiian islands: a preliminary study. *Pacific Science* 48: 175-187.