

ANEXO nº 3 - Lista das espécies que ocorrem em ou perto da AID segundo bancos de dados dos herbários

BRIÓFITAS

BARTRAMIACEAE

Philonotis rond

CALYPERACEAE

Syrrhopodon lonchophyllum Schunaegr. rond

DICRANACEAE

Octoblepharum raphidostegium C.Müll. ex Broth. rond
Rara Prance, G.T. 6024, (INPA);

FISSIDENTACEAE

Fissidens rond

HYPOLEPIDACEAE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn rond

SEMATOPHYLLACEAE

Sematophyllum subsimplex (Hedw.) Mitt. rond
Taxithelium planum (Brid.) Mitt. rond

PTERIDÓFITAS

ADIANTACEAE

Adiantum terminatum Kuntze ex Miq. rond

BLECHNACEAE

Blechnum brasiliensis Lodd. rond
Distribuição conhecida de Amazônia oriental, com uma única coleta na área (Black, G.A. 14480)
"Guaporé, E.F.M.M.". Sua ocorrência deve ser confirmada.

DRYOPTERIDACEAE

Tectaria martinicensis (Spreng.) Copal rond

LINDSAEACEAE

Lindsaea stricta (Sw.) Dryand. rond

METAXYACEAE

Metaxya rostrata (Kunth) C.Presl rond mad

OLEANDRACEAE

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott rond mad

POLYPODIACEAE

Polypodium decumanum Willd. rond

TRICHOMANACEAE

Trichomanes ankersii C.Parker ex Hook. & Grev. rond mad
Trichomanes elegans Rich. rond mad
Trichomanes pennatum Hedw. rond

DICOTILEDONES

ACANTHACEAE

<i>Jacobina tenuistachys</i> Rusby	rond
Possivelmente uma espécie endêmica regionalmente.	
<i>Justicia dubiosa</i> Lindau	rond
Provavelmente endêmica de Rondônia a áreas vizinhas	
<i>Justicia fittonioides</i> Lindau	rond
Potencialmente uma espécie endêmica e rara, uma coleta recente perto de Abuña (Prance, G.T. 6039), e a coleta tipo velha de Acre (Ule, E.H.G. 5457)	
<i>Justicia riedeliana</i> (Ness) Graham	rond
Uma coleta da área Prance, G.T. 5710, (INPA);	
<i>Mendoncia hoffmannseggiana</i> Nees	
<i>Pachystachys spicata</i> (Ruiz & Pav.) Wassh.	rond
<i>Pseuderanthemum bolivianum</i> Lindau	rond
<i>Ruellia yurimaguensis</i> Lindau	rond
<i>Suessenguthia leucerythra</i> (Leonard & L.B.Sm.) Wassh.	

AMARANTHACEAE

<i>Alternanthera micrantha</i> R.E.Fr.	rima	rond
<i>Cyathula</i>		rond
<i>Pfaffia glauca</i> (Mart.) Spreng.		rond
RARA Uma coleta da área (Prance, G.T. 8700)		

ANACARDIACEAE

<i>Astronium gracile</i> Engl.	rond
<i>Astronium graveolens</i> Jacq.	rond

ANNONACEAE

<i>Bocageopsis canescens</i> (Spruce) R.E.Fr.	rima	rond
<i>Duguetia quitarensis</i> Benth.		rond
<i>Fusaea decurrens</i> R.E.Fr.		rond
<i>Guatteria discolor</i> R.E.Fr.		
<i>Guatteria melosma</i> Diels		rond
<i>Guatteria procera</i> R.E.Fr.		rond
<i>Guatteria scytophylla</i> Diels		
<i>Onychopetalum lucidum</i> R.E.Fr.		rond
<i>Xylopia barbata</i> Hofm. ex Mart.		rond
<i>Xylopia cuspidata</i> Diels		rond
<i>Xylopia emarginata</i> Mart.	rima	rond

APIACEAE

<i>Franchetella neblinensis</i> Aubrév.	rond
<i>Hydrocotyle</i>	rond

APOCYNACEAE

<i>Anacampta coriacea</i> (Link.) Mgf.		
<i>Aspidosperma aquaticum</i> Ducke	rond	
<i>Aspidosperma parvifolium</i> A.DC.	rond	mad
<i>Aspidosperma verruculosum</i> Müll.Arg.	rond	
<i>Bonafousia tetrastachya</i> (Kunth) Markgr.	rond	
<i>Couma guianensis</i> Aubl.	rond	
<i>Galactophora crassifolia</i> (Müll.Arg.) Woodson	rond	
<i>Lacmellea arborescens</i> (Müll.Arg.) Monach. var. <i>arborescens</i>		
<i>Lacmellea arborescens</i> (Müll.Arg.) Monach. var. <i>monosperma</i> (Müll.Arg.) Markgr.		

<i>Malouetia duckei</i> Markgr. var. <i>duckei</i>	
<i>Mesechites bicorniculata</i> (Rusby) Woodson	rond
<i>Odontadenia hoffmannseggiana</i> Steud.	rond
<i>Odontadenia hypoglauca</i> (Stadelm.) Müll. Arg.	rond
<i>Odontadenia verrucosa</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) K. Schum. ex Markgr.	rond
<i>Prestonia acutifolia</i> (Benth.) K. Schum.	rond
<i>Rauvolfia sprucei</i> Müll. Arg.	rond
<i>Rhipidia amazonica</i> (Markgr.) Ducke	rond
RARA Única coleta registrada é Cordeiro, M.R. 594 na pista do aeroporto de Boa Vista.	
<i>Stenosolen heterophyllus</i> (Vahl) Markgr.	rond mad
<i>Tabernaemontana coriacea</i> (Link ex Roem. & Schult.) Markgr.	rond
ARALIACEAE	
<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maguire, Steyerl. & Frodin	rima rond
ARISTOLOCHIACEAE	
<i>Aristolochia odoratissima</i> Lam.	rond
ASCLEPIADACEAE	
<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W.D. Stevens	rond
<i>Tassadia obovata</i> Decne.	rond
ASTERACEAE	
<i>Ambrosia</i>	rond
<i>Aspilia</i>	rond
<i>Baccharis trinervis</i> (Lam.) Pers.	rond
<i>Cosmos</i>	rond
<i>Eupatorium laevigatum</i> Lam.	rond
<i>Eupatorium macrophyllum</i> L.	rond
<i>Eupatorium pauciflorum</i> Kunth	rond
<i>Gnaphalium</i>	rond
<i>Mikania divaricata</i> Poepp. & Endl.	rond
<i>Piptocarpha opaca</i> Baker	rond
<i>Strachium sparganophorum</i> (L.) Kuntze	rond
<i>Tagetes patula</i> L.	rond
<i>Vernonia brasiliana</i> (L.) Druce	rond
RARA: Potencialmente uma endêmica local, única coleta: Andrade, P.R.P. 14	
<i>Vernonia ferruginea</i> Less.	rond
<i>Vernonia miersiana</i> Gardner	rond
<i>Vernonia muricata</i> DC.	rond
<i>Vernonia ruficoma</i> Gardner	rond
<i>Vernonia salzmanni</i> DC.	rond
RARA: Potencialmente uma endêmica local, única coleta: , Prance, G.T. 5155 (Jaci-Paraná).	
<i>Zexmenia</i>	rond
BEGONIACEAE	
<i>Begonia guaduensis</i> Kunth	rond
BIGNONIACEAE	
<i>Adenocalymma bracteatum</i> (Cham.) DC.	rond
<i>Adenocalymma uleanum</i> Kraenzl.	rond
RARA: Pouca coletada, possivelmente endêmica ao regiao	
<i>Anemopaegma floridum</i> Mart. ex DC.	
<i>Anemopaegma insculptum</i> (Salm-Dyck) W. Barthlott	rond
<i>Anemopaegma parkeri</i> Sprague	rond

<i>Arrabidaea pubescens</i> (L.) A.H.Gentry	rond
<i>Ceratophytum tetragonolobum</i> (Jacq.) Sprague & Sandwith	rond
<i>Clytostoma decorum</i> (S.Moore) Bureau & K.Schum.	rond
<i>Cuspidaria floribunda</i> (DC.) A.H.Gentry	rond
<i>Cuspidaria lateriflora</i> (Mart.) DC.	rond
<i>Jacaranda rondoniae</i> Vattimo	rond
RARA: Conhecida de uma única coleta (Mota, C.D.A. da 196) da pista do aeroporto de Porto Velho.	
<i>Lundia puberula</i> Pittier	rond
<i>Martinella iquitosensis</i> A.Samp.	rond mad
<i>Memora croatii</i> A.H.Gentry	
RARA: coletada poucas vezes na região, o mais perto sendo em Bolívia, perto de Abana (Prance, G.T. 6101)	
<i>Memora moringifolia</i> (DC.) Sandwith	rond
<i>Mussatia priurei</i> (DC.) Bureau ex K.Schum.	rond
<i>Pleonotoma orientalis</i> Sandwith	
Espécie de possivelmente ampla distribuição mas muita pouca coletada. Uma coleta na região (Nelson, B.W. P21311) do Posto Indígena Karitiana.	
<i>Pyrostegia cinerea</i> Bureau & K.Schum.	rond
<i>Pyrostegia dichotoma</i> Miers	rond mad
<i>Tynnanthus lindmanii</i> K.Schum.	rond
RARA: coletada uma vez na área (Silva, N.T. da 358) em Porto Velho.	
<i>Tynnanthus myrianthus</i> Bureau & K.Schum.	rond
BORAGINACEAE	
<i>Cordia sylvestris</i> Fresenius	rond
<i>Cordia tetandra</i> Aubl.	rond
<i>Cordia ulei</i> I.M.Johnst.	rond
<i>Gerascanthus alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Kulhm. & Mattos	rond
<i>Heliotropium</i>	rond
BURSERACEAE	
<i>Protium cornosum</i> A.C.Sm.	rond
<i>Protium crassipetalum</i> Cuatrec.	rond
<i>Protium rynchophyllum</i> (Rusby)	rond
<i>Trattinnickia glaziovii</i> Swart	rima rond
<i>Trattinnickia rhoifolia</i> Willd. var. <i>sprucei</i> Swart.	
CACTACEAE	
<i>Phyllocactus</i>	rond
CAMPANULACEAE	
<i>Centropogon surinamensis</i> (L.) C.Presl	rond
CAPPARACEAE	
<i>Capparis leprieurii</i> Briq.	rond
<i>Cleome parviflora</i> H.B.K. ssp. <i>brasiliensis</i> (Weinmann) Iltis	
<i>Cleome parviflora</i> Kunth ssp. <i>psoraleaefolia</i> (DC.) Iltis	
Variedade rara, conhecida por duas coletas um perto da AID (Prance, G.T. 8413) em Pando uma em Acre (Prance, G.T. 7292)	
CECROPIACEAE	
<i>Coussapoa cupularis</i> Akkermans & C.C.Berg	rond
RARA: Conhecida através de duas coletas em Porto Velho (Silva, J.F. da 69 e 211)	
<i>Coussapoa nitida</i> Miq.	rond

Pourouma tomentosa Mart. ex Miq. ssp. *apiculata* (Benoist) C.C.Berg & van Heusden

CELASTRACEAE

Maytenus myrsinoides (Kunth) Urb. rond

CHRYSOBALANACEAE

Couepia uiti (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook.f. rond

Hirtella guainiae Spruce ex Hook.f. rond

Hirtella piresii Prance rond

Licania coriacea Benth. rond

Licania paraensis Prance rond

Licania unguiculata Prance rond

CLUSIACEAE

Caraipa savannarum Kubitzki rond

Chrysochlamys membranacea Planch. & Triana rond

Clusia grandifolia Engl. rond

Kielmeyera rubriflora Cambess. var. *rubriflora*

Moronobea coccinea Aubl. rima rond

Rheedia gardneriana Planch. & Triana rond

Vismia cayennensis (Jacq.) Pers. var. *tenuinervia* van den Berg

CONVOLVULACEAE

Bonamia maripoides Hallier f. rond

Calycobolus rond

Dicranostyles globostigma D.F.Austin rond

Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. rond

Ipomoea hederifolia L. rond

Ipomoea reticulata O'Donell rond

Ipomoea tubata Nees rond

Iseia luxurians (Moric.) O'Donell rond

Merremia wurdackii Austin & Staples rond

CUCURBITACEAE

Cayaponia macrocalyx Harms rond

Cayaponia pilosa (Vell.) Cogn. rond

Gurania inaequalis Cogn. rond

DICHAPETALACEAE

Tapura singularis Ducke rond

DILLENIACEAE

Dolioscarpus brevipedicellatus Garcke ssp. *brevipedicellatus*

Dolioscarpus dentatus (Aubl.) Standl. ssp. *latifolius* Kubitzki

Dolioscarpus spatulifolius Kubitzki rond

DROSERACEAE

Drosera colombiana Fernandez-Perez rond

RARA: Uma coleta na área - a única da família, da pista de poso de Mutum-Paraná (Prance, G.T. 8860). Deveria ser coletada de novo para checar esta identificação.

EBENACEAE

Diospyros inconstans Jacq. rond

Diospyros melinoni (Hiern) A.C.Sm. rond

ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum squamatum Sw. rond

EUPHORBIACEAE

Acalypha benensis Britton rond

RARA: Espécie pouca conhecida, uma única coleta na área, de Mutum-Paraná (Prance, G.T. 5471)

Acalypha mapirensis Pax & K. Hoffm.

Adenophaedra grandifolia (Klotzsch) Müll. Arg. rond

Croton gossypifolius Vahl rond

Croton lechleri Müll. Arg. rima rond

Croton nervosus Rich. ex A. Rich. rond

Croton urucurana Baill. rond

Dalechampia tiliifolia Lam. rond

Euphorbia thymifolia L. rond

Hieronima alchorneoides Allemao rond

Julocroton triqueter (Lam.) Baill. var. *triqueter* (Spreng.) Baill.

Mabea indorum S. Moore rond

Pera nitida (Benth.) Jabl. rima rond

Phyllanthus caroliniensis Walter rond

Plukenetia brachybotrya Müll. Arg. rond

Plukenetia macrostyla Ule rond

Sagotia brachysepala (Müll. Arg.) Secco rond

FLACOURTIACEAE

Banara guianensis Aubl. rond

Casearia rusbyana Briq. rond

Laetia procera (Poepp.) Eichler rima rond

Ryania canescens Eichler rond

Ryania speciosa Vahl var. *minor* Monach.

GESNERIACEAE

Episcia fimbriata Fritsch rond

HUMIRIACEAE

Vantanea parviflora Lam. rond

ICACINACEAE

Leretia cordata Vell. rond

LABIATAE

Hyptis atrorubens Poit. rond

Hyptis lutescens Pohl ex Benth. rond

Hyptis parkeri Benth. rond mad

LACISTEMATACEAE

Lacistema grandifolium Schnizl. rond

LAURACEAE

Endlicheria levelii C.K. Allen rond

Endlicheria longicaudata (Ducke) Kosterm. rond

Licaria camara (R.H. Schomb.) Kosterm. rond

Uma espécie bastante rara e desconhecida. Uma coleta na área (Silva, J.F. da 102), Margem do Rio Candeias é identificada como esta espécie.

Licaria canella (Meisn.) Kosterm. rond

Nectandra viburnoides Meisn. rond

<i>Ocotea bofa</i> Kunth			
<i>Ocotea cernua</i> (Nees) Mez			
<i>Ocotea cujumari</i> Mart.			
<i>Ocotea lindbergii</i> Mez		rond	
Uma espécie bastante rara com somente duas coletas registradas, umj de São Paulo, e a outra de Rondônia (Cordeiro, M.R. 762), Sub-base, proj. RADAM, Estrada Belmonte, mata de t. firme. A coleta é identificada por H. van der Werff. A espécie merece ser procurada no campo.			
<i>Ocotea neesiana</i> (Miq.) Kosterm.		rond	
<i>Ocotea nigrescens</i> Vicentini	rima	rond	
<i>Ocotea opifera</i> Mart.		rond	
<i>Pleurothyrium vasquezii</i> van der Werff		rond	
<i>Rhodostemonodaphne kunthiana</i> (Nees) Rohwer		rond	

LECYTHIDACEAE

<i>Cariniana penduliflora</i> Prance		rond	
Espécie potencialmente rara e endêmica à área da AID. Conhecida de somente da coleta tipo (Prance, G.T. 8811), Road Mutumparaná to Porto Velho, 2-4 km east of Mutumparaná. Esta espécies deve ser localizada e estuda.			
<i>Lecythis holcogyne</i> (Sandwith) S.A.Mori		rond	
Espécie do Norte de America do Sul. Uma coleta na área, mas provavelmente uma identificação errada.			

LEGUMINOSAE-CAES

<i>Batesia floribunda</i> Spruce ex Benth.		rond	mad
<i>Bauhinia conwayi</i> Rusby		rond	
RARA: coletada uma vez perto de Abuña (Prance, G.T. 5901) e duas vezes em Acre.			
<i>Bauhinia corniculata</i> Benth.		rond	
<i>Bauhinia forficata</i> Link		rond	
<i>Bauhinia guianensis</i> Aubl.	rima	rond	mad
<i>Bauhinia guianensis</i> Aubl. var. <i>splendens</i> Pulle			
<i>Bauhinia longicuspis</i> Spruce ex Benth.		rond	
<i>Bauhinia splendens</i> Kunth	rima	rond	mad
<i>Bauhinia unguolata</i> L. var. <i>ungulata</i>			
<i>Campsiandra angustifolia</i> Spruce ex Benth.		rond	mad
<i>Campsiandra comosa</i> (Benth.) Cowan var. <i>laurifolia</i> (Benth.) Cowan			
<i>Cassia coluteoides</i> Collad.		rond	
<i>Cassia flexuosa</i> L.		rond	
<i>Cassia fruticosa</i> Mill.		rond	
<i>Cassia mimosoides</i> DC.		rond	
<i>Cassia quinquangulata</i> Rich.		rond	mad
<i>Cassia scarlatina</i> Ducke		rond	
Espécie raramente coletada, uma coleta perto de Abunã em Pando (Prance, G.T. 6098)			
<i>Cassia spinescens</i> Hoffmanns. ex Vogel		rond	
<i>Senna sylvestris</i> (Vell.) H.S.Irwin & Barneby			
Espécie pouca conhecida de Brasil Central.			
<i>Chamaecrista flexuosa</i> (L.) Greene var. <i>flexuosa</i>			
<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench			
<i>Crudia amazonica</i> Spruce ex Benth.	rima	rond	mad
<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith var. <i>heterophyla</i>			mad
Esta variedade provavelmente endêmico a região.			
<i>Dimorphandra caudata</i> Ducke		rond	
<i>Dimorphandra parviflora</i> Spruce ex Benth.		rond	mad
<i>Hymenaea intermedia</i> Ducke	rima	rond	
<i>Macrolobium acaciaefolium</i> Benth.	rima	rond	mad
<i>Macrolobium bifolium</i> (Aubl.) Pers.		rond	

<i>Macrolobium longipedicellatum</i> Ducke	rond	
<i>Macrolobium unijugum</i> (Poepp. & Endl.) R.S.Cowan var. <i>unijugum</i>		
<i>Peltogyne prancei</i> M.F.Silva	rond	mad
Espécie pouca conhecida, provavelmente endêmica regionalmente. Coletada na Represa Samuel (Thomas, W.W. 5187).		
<i>Peltogyne subsessilis</i> W.A.Rodrigues	rond	mad
<i>Peltogyne venosa</i> (Vahl) Benth. ssp. <i>densiflora</i> M.F.da Silva		mad
<i>Recordoxylon amazonicum</i> (Ducke) Ducke	rond	mad
<i>Sclerolobium myrmecophilum</i> Ducke	rima	rond
<i>Sclerolobium prancei</i> H.S.Irwin & Arroyo		
Conhecida somente de uma coleta (Prance, G.T. 5524) no Rio Madeira oposta de Mutum-Paraná.		
<i>Tachigali myrmecophila</i> (Ducke) Ducke	rond	
<i>Tachigali rusbyi</i> Harms	rond	

LEGUMINOSAE-MIM

<i>Abarema jupunba</i> (Willd.) Britton & Killip var. <i>jupunba</i>		mad
<i>Acacia paraensis</i> Ducke	rond	
<i>Acacia weberbaueri</i> Harms	rond	
<i>Albizia subdimidiata</i> (Splitg.) Barneby & J.W.Grimes	rond	mad
<i>Balizia pedicellare</i> (DC.) Barneby & J.W.Grimes	rond	
<i>Hydrochorea corymbosa</i> (Rich.) Barneby & J.W.Grimes	rima	rond
<i>Calliandra tenuiflora</i> Benth.	rond	
<i>Entada polystachya</i> (L.) DC.	rond	
<i>Inga bourgonii</i> (Aubl.) DC.	rond	
<i>Inga cayennensis</i> Sagot ex Benth.	rima	rond
<i>Inga disticha</i> Benth.	rond	mad
<i>Inga grandiflora</i> Ducke	rond	
<i>Inga lateriflora</i> Miq.	rond	
<i>Inga longiflora</i> Spruce ex Benth.	rima	rond
<i>Inga longipes</i> Benth.	rond	
<i>Inga marginata</i> Willd.	rima	rond mad
<i>Inga paraensis</i> Ducke	rima	rond mad
<i>Inga pezizifera</i> Benth.	rond	mad
<i>Inga pilosula</i> (Rich.) J.F.Macbr.	rond	mad
<i>Inga punctata</i> Willd.	rond	mad
<i>Inga rubiginosa</i> (Rich.) DC.	rond	mad
<i>Inga stenoptera</i> Benth.	rond	mad
<i>Inga stipularis</i> DC.	rima	rond mad
<i>Inga umbratica</i> Poepp. & Endl.	rond	mad
<i>Inga vera</i> Willd. ssp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.		
<i>Macrosamanea duckei</i> (Huber) Barneby & J.W.Grimes	rond	mad
<i>Mimosa insidiosa</i> Benth.	rond	
RARA, conhecida de somente uma coleta (Prance, G.T. 5243) entre Jaci-Paraná e Mutum-Paraná.		
<i>Mimosa polycarpa</i> Kunth	rond	
<i>Mimosa pudica</i> L.	rond	
<i>Mimosa sensitiva</i> L.	rond	
<i>Parkia decussata</i> Ducke	rima	rond mad
<i>Parkia nitida</i> Miq.	rima	rond mad
<i>Piptadenia anolidurus</i> Barneby	rond	
Distribuição ampla, mas pouca conhecida no Brasil. A única coleta é perto da área da AID UHE de Samuel, Rio Jamari (Maciel, U.N. 1673).		
<i>Stryphnodendron duckeanum</i> Occhioni	rond	mad
Espécie localmente regionamente. O tipo foi coletado em Porto Velho, existem poucas outras coletas (Humaitá, Acre, UHE Samuel). Sua distribuição deve ser investigada melhor.		
<i>Stryphnodendron foreroi</i> E.M.O.Martins	rond	mad

Espécie localmente endêmica. Conhecida em MTF ao longo do Rio Madeira entre Humaitá e Pando. Potencialmente ameaçada por mudança no uso da terra.

<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W.Grimes	rond	mad
<i>Zygia cataractae</i> (Kunth) L.Rico	rond	mad
<i>Zygia inaequalis</i> (Willd.) Pittier	rond	
<i>Zygia racemosa</i> (Ducke) Barneby & J.W.Grimes	rima	rond mad

LEGUMINOSAE-PAP

<i>Abrus fruticulosus</i> Wight & Arn.	rond	
<i>Abrus precatorius</i> L.	rond	
<i>Abrus pulchellus</i> Wall. ex Thwaites ssp. <i>tenuiflorus</i> (Spruce ex Benth.) Verdc.		
<i>Aeschynomene americana</i> L.		
<i>Aeschynomene pratensis</i> Small	rond	
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.	rond	
<i>Calopogonium plumosum</i> Piper	rond	
Uma amostra coletada em Abunã (Prance, G.T. 5913) tem esta identificação, mas não achei referencia a esta espécie.		
<i>Camptosema ellipticum</i> (Desv.) Burkart	rond	
<i>Dalbergia hygrophyla</i> (Mart. ex Benth.) Hoehne	rond	
Espécie muita raramanete coletada. Uma coleta localmente na Represa Samuel (Thomas, W.W. 5164).		
<i>Dalbergia miscolobium</i> Benth.	rond	
<i>Derris pterocarpus</i> (DC.) Killip	rond	
<i>Desmodium axillare</i> (Sw.) DC.	rond	
<i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC.	rond	
<i>Desmodium scorpiurus</i> (Sw.) Desv.	rond	
Espécie de ampla distribuição mais pouca coletada no Brasil.		
<i>Erythrina ulei</i> Harms	rond	
<i>Hymenolobium nitidum</i> Benth.	rond	
<i>Machaerium acutifolium</i> Vogel var. <i>pseudacutifolium</i> (Pittier) Rudd		
<i>Machaerium altiscandens</i> Ducke	rond	
<i>Machaerium angustifolium</i> Vogel	rond	
<i>Machaerium brasiliense</i> Vogel	rond	
<i>Machaerium costulatum</i> Rudd	rond	
<i>Machaerium frondosum</i> (Mart.) Ducke	rond	
<i>Machaerium macrocarpum</i> Benth.	rond	
<i>Ormosia cuspidata</i> (Pierre ex J.F.Macbr.) Rudd	rond	
Conhecida de uma única coleta na (Silva, N.T. da 366), a 9 km de Porto Velho.		
<i>Phaseolus peduncularis</i> Kunth	rond	
<i>Poecilanthe effusa</i> (Huber) Ducke	rima	rond mad
<i>Pterocarpus officinalis</i> Jacq.	rima	rond
<i>Stylosanthes humilis</i> Kunth	rond	
<i>Swartzia cuspidata</i> Spruce ex Benth.	rond	
<i>Swartzia mangabalensis</i> Cowan	rond	
Espécie muito pouca conhecida. O tipo é do Rio Tapajós, e além disso existem duas coletas da região de Porto Velho - Abuña.		

LORANTHACEAE

<i>Phthirusa angulata</i> K.Krause	rond	
<i>Phthirusa pyrifolia</i> Eichler var. <i>grandifolia</i>		
<i>Psittacanthus leptanthus</i> A.C.Sm.	rond	

LYTHRACEAE

<i>Adenaria floribunda</i> Kunth	rond	
----------------------------------	------	--

MALPIGHIACEAE

- Banisteriopsis erianthera* (A.Juss.) B.Gates rond
Byrsonima lyoniifolia Nied. rond
Espécie rara, coletada uma vez na área (Silva, N.T. da 3660), Rio Abunã, Cachoeira de Dardanelos.
Byrsonima putumayensis Cuatrec. rond
Espécie rara, coletada uma vez na área (Prance, G.T. 8905), vicinity of São Lorenço mines
Byrsonima sinuatum (DC.) A.Juss. rond
Espécie rara, coletada uma vez na área (Thomas, W.W. 4949), Represa Samuel
Heteropterys macrostachya A.Juss. rond
Heteropterys prancei W.R.Anderson rond
Espécie pouca coletada, conhece de 4 coletas em Mato Grosso e um perto de Abuña (Berg, C.C. 6788)
Hiraea fagifolia (DC.) Juss. rond
Stigmaphyllon hypoleucum Miq. rond
Conhecida de poucas coletas em Roraima e Guyana, e uma única coleta em Jaci-Paraná (Prance, G.T. 5396). Potencialmente rara localmente.

MALVACEAE

- Pavonia paniculata* Cav. rond
Sida glomerata Cav. var. *glomerata*
Sida urens L. var. *urens*
Wissadula excelsior (Cav.) C.Presl rond mad

MELASTOMATACEAE

- Aciotis dichotoma* (Benth.) S.Moore rond
Conhecida de poucas coletas em Goiás e Pará, e uma única coleta em Jaci-Paraná (Prance, G.T. 8696), "Rio Madeira between Penha Colorado and Cachoeira Araras, Cliff face". Potencialmente rara localmente.
Bellucia circumscissa Spruce ex Cogn. rond
Conhecida de poucas coletas no Norte de Amazônia, e duas coletas na área: (Prance, G.T. 5229), "Secondary forest between Jaciparaná and Rio Madeira" e (Prance, G.T. 5229), "na Universidade Federal de Rondônia". Potencialmente rara localmente.
Henriettea stellaris Berg ex Triana
Macaírea viscosa Ducke rond
Possivelmente uma espécie localmente endêmica. Coletada 4 vezes entre Abuña e Mutum-Paraná. O tipo é recordado como Mato Grosso.
Miconia poeppigii Triana rima rond mad
Miconia waytkowskii Wurdack
Espécie muito pouca conhecida. O tipo é de Peru, e a única outra coleta identificada assim é da Represa Samuel (Thomas, W.W. 5059), "forest at end of right dike road, ca 1 km N of capinarana". Sua ocorrência na área deve ser confirmada.
Mouriri brachyanthera Ducke rond
Mouriri oligantha Pilg. rond
Conhecida de poucas coletas espalhadas Amazônia, e uma coleta na área: (Prance, G.T. 8709), "E bank of Rio Madeira between Penha Colorado and Abunã. Potencialmente rara localmente.
Mouriri plasschaerti Pulle rond
Mouriri trunciflora Ducke rima rond
Tococa guianensis Aubl. var. *juaruensis* Aubl.
Tococa juruensis (Pilz.) Renner rond mad

MELIACEAE

- Guarea guidonei* (L.) Sleumer rond
Trichillia quadrijuga Kunth ssp. *quadrijuga*

MENISPERMACEAE

- Abuta velutina* Gleason rond
Caryomene prumnoides Barneby & Krukoff rond
Espécie localmente até conhecemos endêmica ao AID (uma coleta do leste do Estado). Tipo é Prance, G.T. 8750, coletada perto de Abuña. Deve ser procurada no campo para saber mais sobre sua ocorrência.
Odontocarya magnifolia (A.C.Sm.) Barneby rond
Possivelmente localmente endêmica. As coletas conhecidas são (Prance, G.T. 8292), 8 km NE de Porto Velho (Anderson, W.R. 12268) Along rio dos Pacaás Novos, just above and below the first cachoeira

MORACEAE

- Brosimum rubescens* Taub. rima rond
Ficus eximia Schott rond
Ficus krukovii (Kunth) Miers rond
Maquira sclerophylla (Ducke) C.C.Berg rond
Naucleopsis glabra Spruce ex Pittier rima rond
Naucleopsis macrophylla Miq. rima rond
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr. rima rond
Pseudolmedia multinervis Mildbr. rond
Espécie endêmica a região de sudoeste de Amazônia.

MYRISTICACEAE

- Iryanthera coriacea* Ducke rima rond
Iryanthera ulei Warb.
Espécies pouca conhecida com poucas coletas, amplamente distribuídas, incluindo um na Serra dos Três Irmãos (Prance, G.T. 8976).
Virola michelii Heckel rond mad

MYRSINACEAE

- Cybianthus surinamensis* (Spruce) G.Agostini rond
Espécies pouca conhecida, mas não coletada n AID

MYRTACEAE

- Calycolpus roraimensis* Steyerm. rond
Uma unica coleta registrada (Prance, G.T. 5430) perto de Mutum-Paraná, mas é provavelmente uma identificação errada.
Calyptranthes cuspidata Mart. ex DC. rima rond
Eugenia anastomosans DC. rond
Eugenia egensis DC.
Eugenia feijoi O.Berg rond
Eugenia flavescens DC. rima rond
Eugenia patens Poir. rond
Eugenia spruceana O.Berg rond
Marlierea summa McVaugh rond
Myrcia acuminata DC. var. *tovarensis*
Variedade conhecida de três coletas, uma em Pará uma em Amapá, e uma em Mutum-Paraná. Precisa ser estudada para entender melhor sua taxonomia.
Myrcia huallagae McVaugh rond
Myrcia lanceolata Cambess. rond
Espécie conhecida de poucas coletas, inclusiva de um no campus de UNIR (Sobreira, F.C.L. 15). Sua identidade deve ser checada.
Myrcia magna Legrand rond

Myrciaria floribunda (West ex Willd.) O.Berg rima rond mad
Psidium densicomum Mart. ex DC. rond
 Espécie conhecida de poucas coletas, inclusiva de duas na área. Sua identidade deve ser checada.
Psidium leptocladum O.Berg
 Espécie conhecida de uma única coleta, perto de Abuña (Prance, G.T. 6063)

OLACACEAE

Cathedra acuminata Benth. ex Miers rond
Curupira tefeensis G.A.Black rond
 Espécie conhecida de poucas coletas, inclusiva de um de Porto Velho (Silva, J.F. da 144). Sua identidade deve ser checada.
Heisteria flexuosa Mart. rond
Heisteria iquitensis Sleumer rond

OLEACEAE

Chionanthus viridiflorus (Mart.) Gilg rond
 Espécie conhecida de poucas coletas, inclusiva de um de Ferrovia Madeira-Mamoré-Madeira (Prance, G.T. 8609). Sua identidade deve ser checada.

ONAGRACEAE

Ludwigia erecta (L.) H.Hara rond

OXALIDACEAE

Oxalis lepedezioides G.Don rond
 Provavelmente endêmico regionalmente. Coletas de Acre e uma perto de Jaci-Paraná. Sua distribuição deve ser melhor conhecida.

PIPERACEAE

Piper amazonicum (Miq.) C.DC. rond
Piper arboreum Aubl. var. *arboreum*
Piper dilatatum Rich. rond
Piper gaudichaudianum (Kunth) Kunth ex C.DC. rond
Piper hispidum Sw. var. *trachydermun*
Piper nigrispicum C.DC. rond
Piper silvigaudens Yunck. rond
 Espécie conhecida de poucas coletas, inclusiva de um entre Mutum-Paraná e rio Madeira (Prance, G.T. 5235). Sua distribuição deve ser checada.
Piper taperanum Yunck. rond
 Espécie do nordeste de Amazônia, mas uma coleta (Prance, G.T. 8847) do pisto de poso de Mutum-Paraná. Sua identidade deve ser checada

PODOSTEMACEAE

Rhyncholacis squamulosa Tul. rond
 Conhecida de uma única coleta (Black, G.A. 14591) "beira da cachoeira Samuel". Sua identidade deve ser checada.
Tristicha trifaria (Bory ex Willd.) Spreng. rond
Weddellina squamulosa Tul. rond

POLYGALACEAE

Diclidanthera penduliflora Mart. var. *penduliflora*
Polygala hebeclada DC. rond
Polygala mandonii Grondona ex Chodat rond
 Espécie aparentemente endêmico do norte de Mato Grosso, com uma única coleta em Porto Velho (Mota, C.D.A. da 126)
Securidaca bialata Benth. rond

POLYGONACEAE		
<i>Coccoloba excelsa</i> Benth.		rond
PORTULACACEAE		
<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.		rond
PROTEACEAE		
<i>Panopsis sessilifolia</i> (L.C.Rich.) Sandwith		rond
QUIINACEAE		
<i>Lacunaria acreana</i> Ducke		rond
<i>Lacunaria crenata</i> (Tul.) A.C.Sm.		rond
<i>Lacunaria macrostachya</i> (Tul.) A.C.Sm.		rond
<i>Quiina nitens</i> J.F.Macbr.		rond
<i>Touroulia guianensis</i> Aubl.		rond
RHAMNACEAE		
<i>Gouania virgata</i> Reissek		rond
RHIZOPHORACEAE		
<i>Cassipourea peruviana</i> Alston		rond
<i>Cassipourea ulei</i> Briq.		rond
Espécie provavelmente endêmica ao sudeste de Amazônia		
RUBIACEAE		
<i>Alibertia hispida</i> Ducke		rond
<i>Bertiera guianensis</i> Aubl. ssp. <i>guianensis</i>		
<i>Bertiera guianensis</i> Aubl. ssp. <i>pubiflora</i> Steyererm.		
Esta subespécie (de uma espécie de ampla distribuição) pode ser localmente endêmica em Porto Velho.		
<i>Borreria latifolia</i> (Aubl.) K.Schum. f. <i>minor</i> (Schum.) Steyererm.		
Esta forma (de uma espécie de ampla distribuição) pode ser localmente endêmica em Porto Velho.		
<i>Diodia hyssopifolia</i> Cham. & Schltl. var. <i>linearis</i> (Winkl. ex Roem. & Schultes) Steyermark.		
Esta variedade (de uma espécie de ampla distribuição) pode ser localmente endêmica na área (coletas de Abuña e Jaci-Paraná).		
<i>Faramea corymbosa</i> Sieber ex DC.	rima	rond
<i>Ferdinandusa rudgeoides</i> Wedd.		rond
<i>Geophila prancei</i> Steyererm.		rond
Conhecida somente através da coleção tipo (Prance, G.T. 8985), Serra dos Três Irmãos, opposite Mutumparaná. Potencialmente uma espécie endêmica ameaçada pela barragem		
<i>Hamelia patens</i> Jacq.		rond
<i>Isertia coccinea</i> (Aubl.) J.F.Gmel.		rond
<i>Malanea gabrielensis</i> Müll.Arg.		rond
<i>Pagamea guianensis</i> Aubl. var. <i>guianensis</i>		
<i>Palicourea bracteosa</i> Standl.		
Espécie provavelmente endêmica ao sudeste de Amazônia.		
<i>Palicourea crocea</i> (Sw.) Roem. & Schult. var. <i>riparia</i> (Benth.) Griseb.		
<i>Palicourea grandiflora</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Standl.		rond
<i>Palicourea subspicata</i> Huber		rond
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Roem. & Schult.	rima	rond
<i>Posoqueria williamsii</i> Steyererm.		rond
Espécie pouca conhecida, mas sem coletas perto de Porto Velho.		
<i>Psychotria cincta</i> Standl.		rond
<i>Psychotria deflexa</i> DC. ssp. <i>deflexa</i>		

Psychotria lupulina Benth. ssp. *rhodoleuca* (Müll.Arg.) Steyerm.
 Variedade pouca conhecida, com uma coleta perto de Abuña.

Psychotria nudiceps Standl. rond

Psychotria racemosa Willd.

Psychotria sphaerocephala Müll.Arg. rond

Psychotria ulviformis Steyerm. rond

Psychotria undulata Benth. rond

Uma coleta (Prance, G.T. 6134), na Serra do Três Irmãos. Potencialmente uma espécie localmente endêmica.

Sickingia tinctoria (Kunth) K.Schum. rond

Simira paraensis (Baill.) Steyerm. rond

Simira rubescens (Benth.) Bremek. ex Steyerm. rond

Spermacoce latifolia Aubl. rond

Stachyarrhena penduliflora K.Schum. rond

Warszewiczia elata Ducke rond

Espécie pouca conhecida, com uma coleta na área (Prance, G.T. 5457) na Serra do Três Irmãos.

RUTACEAE

Rauia prancei W.A.Rodrigues & M.F.Silva rond

Espécie endêmica ao sudeste de Amazônia.

Zanthoxylum tenuiflorum Engl. rond

Espécie aparentemente conhecida de Pernambuco (1 coleta) e a Serra do Três Irmãos (Prance, G.T. 5454). Merece ser melhor investigada.

SAPINDACEAE

Cupania scrobiculata Hook. & Arn. rima rond

Matayba spruceana (Benth.) Radlk. rond

Matayba steinbachii Melch. rond

Paullinia bilobulata Radlk. rond

Espécie muito pouca conhecida, com uma coleta na AID (Prance, G.T. 8879) São Lorenço mines.

Paullinia clavigera Schltld. ssp. *clavigera*

Paullinia exalata Radlk. rond

Espécie provavelmente endêmica ao sudeste de Amazônia.

Radlekoferella macrocarpa (Huber) Aubrév. rond

Serjania caracasana (Jacq.) Willd. rond

Serjania elongata J.F.Macbr. rond

Serjania fuscifolia Radlk. rond

Serjania inscripta Radlk. rond

Espécie provavelmente endêmica ao sudeste de Amazônia.

Serjania lethalis A.St.-Hil.

SAPOTACEAE

Manilkara excelsa (Ducke) Standl. rond

Pouteria cladantha (Sandwith) Aubrév. rond

Pouteria cuspidata (A.DC.) Baehni ssp. *cuspidata*

Pouteria ericoides T.D.Penn. rond

Uma coleta desta espécie recém-descrita de Amazônia central no INPA (Sobreira, F.C.L. 3) do campus do UNIR, mas deve ser confirmada.

Pouteria glomerata (Miquel) Radlkofer ssp. *stylosa* (Pierre) T. D. Pennington

Pouteria manausensis (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn. rond mad

Pouteria reticulata (Engl.) Eyma ssp. *reticulata*

Pradosia praealta (Ducke) Ducke rond

SCROPHULARIACEAE

Torenia thouarsii (Cham. & Schltld.) Kuntze rond

SIMAROUBACEAE

Picrolemma sprucei Ducke rond

Simaba guianensis Aubl. ssp. *ecaudata* Cronquist.

Simaba paraensis Ducke ssp. *paraensis*

SOLANACEAE

Solanum apaporanum R.E. Schult. rond

Espécie de Amazônia oriental, com uma única coleta no AID (Prance, G.T. 5386), de Jaci-Paraná. Sua identidade deve ser confirmada.

Solanum nigrum L. rond

Solanum sisymbriifolium L. rond

Espécie do sul do Brasil e Argentina. Sua localidade mais ao norte ocorre no AID

STERCULIACEAE

Ayenia praeclara Sandwith rond

Byttneria benensis Britton rond mad

Helicteres macropetala A.St.-Hil. rond

Sterculia stipulifera Ducke rond

Espécie provavelmente endêmica ao sudeste de Amazônia.

THEOPHRASTACEAE

Clavija lancifolia Desf. ssp. *chermontiana* (Standl.) Stahl.

TILIACEAE

Apeiba echinata Gaertn. var. *macropetala* Ducke

TRIGONIACEAE

Trigonía echiteifolia Rusby rond

Aparentemente conhecida de uma única coleta (Black, G.A. 14678) de Porto Velho.

Trigonía laevis Aubl. var. *microcarpa*

TURNERACEAE

Turnera odorata Rich. rond

ULMACEAE

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. rond

VERBENACEAE

Aegiphila bracteolosa Moldenke rond

Distribuição ampla, mas seria nova no Estado

Aegiphila elata Sw. rond

Espécie conhecida de poucas coletas, incluindo uma do AID (Prance, G.T. 5240) entre Jaci-Paraná and Rio Madeira. Sua ocorrência deve ser confirmada.

Aegiphila lanceolata Moldenke rond

Espécie conhecida de poucas coletas, incluindo uma do AID (Silva, N.T. 399) entre Jaci-Paraná and Rio Madeira. Sua ocorrência deve ser confirmada.

Petrea bracteata Steud. rond mad

VIOLACEAE

Hybanthus oppositifolius (L.) Taub. rond

Rinorea ovalifolia (Britton) Blake rond

VISCACEAE

Phoradendron acinacifolium Mart. ex Eichler rond

Espécie conhecida de poucas coletas do norte de Amazônia e Suriname, Uma amostra coletada no AID identificada assim (Prance, G.T. 8805) perto de Mutum-Paraná. Sua ocorrência deve ser confirmada.

VITACEAE

Cissus erosa L.C.Rich.

VOCHYSIACEAE

Erismalaurifolium Ducke

rond

Espécie conhecida de poucas coletas, incluindo uma perto do AID (Silva, N.T. 449) perto de Porto Velho. Sua ocorrência deve ser confirmada.

Qualea parviflora Mart.

Espécie possivelmente endêmica a Rondônia, pouca conhecida.

Vochysia fontellae Paula

rond

Potencialmente uma espécie endêmica à AID. Conhecida de duas coletas de perto de Porto Velho (Black, G.A. 14568 e Silva, J.F. da 14)

Vochysia obidensis (Huber) Ducke

rond

Espécie de Amazônia oriental, com uma única coleta perto do AID (Ferreira C.A.C. 7467), de canteiro de obras da usina Hidrelétrica de Balbina. Sua identidade deve ser confirmada.

MONOCOTYLODONES

ALISMATACEAE

- Echinodorus cylindricus* Rataj rond
Espécie endêmica ao AID, conhecida somente da coleta tipo (Oliveira, J. s.n.), estrada de Ferro Madeira Mamoré, rio Abunã. Deve ser procurado para conhecer melhor.

ARACEAE

- Anthurium pentaphyllum* (Aubl.) G. Don rima rond
Monstera obliqua Miq. var. *expilata* (Miq.) Müll. Arg.
Variedade pouca conhecida (de uma espécie de ampla distribuição) conhecida de duas coletas de Pará uma no AID (Prance, G.T. 5379) de Jaci-Paraná.
Philodendron angustisectum Engl. rond
Espécie conhecida de poucas coletas, incluindo uma perto de Abuña (Prance, G.T. 6169).
Potencialmente uma endêmica regional.
Philodendron ernestii Engl. rond mad
Philodendron scabrum Krause rond
Espécie pouca conhecida com uma coleta na região (Santos, A. dos, s.n.), Parque Ecológico de Porto Velho. Mata de terra firme. Sua ocorrência deve ser confirmada.
Philodendron weddellianum Engl. rond
Espécie pouca conhecida com uma coleta na região (Prance, G.T. 6457) Perto de Ribeirão. Sua ocorrência deve ser confirmada.

ARECACEAE

- Bactris balanophora* Spruce rond
Bactris gastoniana Barb. Rodr. rond
Bactris maraja Mart. rond
Bactris riparia Mart. rond
Chelyocarpus chuco (Mart.) Moore rond
Espécie endêmica a região em volta de Abuña, "comum em pântano e floresta inundada perto de rios" (Herderson et al. 1995). O efeito da inundação nesta espécie deve ser avaliado.
Lepidocaryum tenue Mart. var. *tenue*
Oenocarpus minor Mart. rond

BROMELIACEAE

- Pitcairnia caricifolia* Mart. rond
Pitcairnia lanuginosa Ruiz & Pav. rond
Vriesea amazonica Mez rond
Vriesea heliconioides (Kunth) Hook. ex Walp. rond

COSTACEAE

- Costus amazonicus* (Loes.) J.F. Macbr. rond
Costus claviger Benoist rond
Costus subsessilis (Nees & Mart.) Maas rond

CYPERACEAE

- Bulbostylis splendens* M.T. Strong rond
Espécie conhecida somente da coleção tipo (Prance, G.T. 6016), Serra dos Murales, 14 Km NNW of junction of rio Madeira and Abunã. Rocky outcrop at summit. Enquanto sua habitat é fora da área do AID, sua distribuição e estatus de conservação deve ser estudada.
Cyperus diffusus Vahl
Cyperus esculentus L. rond
Cyperus giganteus Vahl rond
Cyperus imbricatus Retz. rond
Cyperus miliifolius Poepp. ex Kunth rond

<i>Cyperus simplex</i> Kunth	rond mad
<i>Eleocharis minima</i> Kunth	rond
<i>Hypolytrum longifolium</i> (Rich.) Schrad. ex Nees ssp. <i>longifolium</i>	
<i>Hypolytrum spongiosum</i> Koyama	rond
Espécie conhecida de poucas coletas, incluindo duas na AID (Prance, G.T. 5326) e Calderón, C.E. 2816). Sua distribuição local deve ser estudada	
<i>Hypolytrum stemonifolium</i> T.Koyama	rond
<i>Kyllinga umbellata</i> Rottb.	rond
<i>Rhynchospora candida</i> (Nees) Ridl.	rond
<i>Rhynchospora emaciata</i> (Nees) Boeck.	rond
<i>Rhynchospora hirsuta</i> (Vahl) Vahl	rond
<i>Rhynchospora setacea</i> Vahl	rond
<i>Rhynchospora tenella</i> (Nees) Boeck.	rond

ERIOCAULACEAE

<i>Syngonanthus biformis</i> (N.E.Br.) Gleason	rond
Espécie conhecida de Pará e Bahia, mas com uma coleta na AID identificada assim (Prance, G.T. 8914) "Vicinity of São Lorenço mines". Sua ocorrência deve ser confirmada.	
<i>Syngonanthus gracilis</i> (Körn.) Ruhland var. <i>aureus</i> Ruhland	
<i>Syngonanthus longipes</i> Gleason	rond

HELICONIACEAE

<i>Heliconia platystachys</i> Baker	
Espécie provavelmente endêmica regionalmente.	
<i>Heliconia stricta</i> Huber	rond

MARANTACEAE

As espécies de Marantaceae são difíceis de identificar, e muitas tem distribuições bem locais.	
<i>Calathea virginalis</i> Linden	rond
Representada nos herbários por uma única amostra, coletada perto de Abuña. Potencialmente uma endêmica local.	
<i>Ischnosiphon martianus</i> Eichler ex Petersen	rond
Espécie de Amazônia central e oriental com uma única coleta na área (Nelson, B.W. P21284). Sua identidade e ocorrência deve ser confirmada.	
<i>Maranta arundinacea</i> L.	rond

MAYACACEAE

<i>Mayaca vandellii</i> Schott & Endl.	rond
Espécie conhecida de poucas coletas, incluindo um perto do AID (Prance, G.T. 6076), perto de Abuña.	

ORCHIDACEAE

<i>Acacallis cyanea</i> Lindl.	rond mad
<i>Acacallis rosariana</i> V.P. Castro & J.B.Silva	rond
Conhecida somente através de duas coletas na região, o tipo (Silva, J.B.F. da 739), UHE de Samuel e (Maciel, U.N. 1643), Parque Estadual de Corumbiara. Sua distribuição deve ser confirmada	
<i>Epidendrum imatophyllum</i> Lindb.	rond
<i>Epidendrum rigidum</i> Jacq.	rond
<i>Maxillaria alba</i> Hook.	rond
<i>Maxillaria amazonica</i> Schltr.	rond
<i>Maxillaria uncata</i> Lindl.	rond
<i>Polystachya luteola</i> (Sw.) Lindl.	rond
<i>Wulfschlaegelia calcarata</i> Benth.	rond

Muitas espécies de Orquídeas são endêmicas localmente, e na Amazônia são pouca coletada. A ocorrência de varias espécies poucas conhecidas na área da AID deve ser estudada... incluindo as seguintes:

<i>Campylocentrum robustum</i> Cogn.	rond
<i>Catasetum ariqueense</i> Miranda & Lacerda	rond
<i>Catasetum caputtinum</i> Lacerda	rond
<i>Catasetum denticulatum</i> Miranda	rond
<i>Catasetum rondonense</i> Pabst	rond
<i>Cyrtopodium punctatum</i> Lindl.	
<i>Epidendrum caxarariense</i> Silva & Oliveira	rond
<i>Erythrodes longicornis</i> (Cogn.) Ames	rond
<i>Galeandra lacustris</i> Rodr.	rond
<i>Leucohyle brasiliensis</i> (Cogn.) Schltr.	rond
<i>Maxillaria pauciflora</i> Barb. Rodr.	
<i>Mormodes itapauense</i> Miranda & Lacerda	rond

POACEAE

<i>Axonopus fissifolius</i> (Raddi) Kuhlms.	rond
<i>Axonopus purpusii</i> (Mez) Chase	rond
<i>Brachiaria decumbens</i> Stapf	rond
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	rond
<i>Echinolaena inflexa</i> (Poir.) Chase	rond
<i>Eragrostis bahiensis</i> Schrad. ex Nees	rond
<i>Eragrostis glomerata</i> (Walter) L.H.Dewey	rond
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	rond
<i>Guadua capitata</i> (Trin.) Munro	rond
Espécie provavelmente endêmica regionalmente.	
<i>Guadua paniculata</i> Munro	rond
<i>Ichnanthus ichnodes</i> (Griseb.) Hitchc. & Chase	rond
<i>Isachne polygonoides</i> (Lam.) Döll	rond
<i>Merostachys rondoniensis</i> Send.	rond
Espécie conhecida somente do tipo (Calderón, C.E. 2780), coletada perto de Porto Velho. Potencialmente uma espécie endêmica da área local.	
<i>Olyra longifolia</i> Kunth	rond
<i>Panicum cyanescens</i> Nees	rond
<i>Panicum grande</i> Hitchc. & Chase	rond
<i>Panicum polygonatum</i> Schrad.	rond
<i>Panicum scabridum</i> Döll	rond
<i>Pariana violascens</i> Swallen	rond
Espécie conhecida de poucas coletas, incluindo uma perto da AID (Black, G.A. 14441).	
<i>Paspalum amazonicum</i> Trin.	rond
<i>Paspalum commutatum</i> Nees	rond
<i>Paspalum plicatulum</i> Michx.	rond mad
<i>Paspalum riparium</i> Nees	rond
<i>Setaria gracilis</i> Kunth	rond
Espécie de ampla distribuição mas raramente coletada.	
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br.	rond

PONTEDERIACEAE

<i>Reussia lagoensis</i> (Warm.) Solms	rond
Espécie endêmica regionalmente (Mato Grosso até Porto Velho). Os efeitos da obra na sua distribuição deve ser estudados.	

RAPATEACEAE

<i>Cephalostemon riedelianus</i> Körn.	rond
--	------

A única coleta da família (Prance, G.T. 5833), Km 216-219 Madeira-Mamoré railroad near Alunã. Savanna forest on periodically Flooded ground", é identificada como está espécie, conhecida de Minas Gerais. Sua identidade deve ser confirmada.

SMILACACEAE

Smilax pseudosyphilitica A.DC.

rond

Smilax syphilitica Humb. & Bonpl. ex Willd.

rond

Espece mais conhecida de Amazônia norte e oriental, possivelmente identificações erradas das duas coletas registradas na área.