

Anexo XIII – Lista de espécies registradas de Avifauna.

Aves registradas na região da AHE Jirau, Porto Velho-RO, com indicação da distribuição das espécies nas áreas de amostragem e do grau de ameaça.

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
TINAMIFORMES						
Tinamidae						
<i>Tinamus tao</i> Temminck, 1815	azulona	H			C,M	C
<i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-preto	L			C,M,A*	C
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	tururim	L			C	C
<i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815)	jaó	L			A*	
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-anhangá	H			M	C
<i>Crypturellus bartletti</i> (Sclater & Salvin, 1873)	inhambu-anhangáí	H			M	C
ANSERIFORMES						
Anhimidae						
<i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766)	anhuma	M			M*	
Anatidae						
<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	asa-branca	L			M*	

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato	M			M*	
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	pé-vermelho	L			A*	
GALLIFORMES						
Cracidae						
<i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825)	aracuã	L			C,M*, A*	C
<i>Penelope jacquacu</i> Spix, 1825	jacu-de-spix	H			C*,M*	
<i>Pauxi tuberosa</i> (Spix, 1825)	mutum-cavalo	H			M*	
Odontophoridae						
<i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	uru-corcovado	H			A*	
PELECANIFORMES						
Phalacrocoracidae						
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	L			M*,A*	
Anhingidae						
<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga	M			M*,A*	
CICONIIFORMES						
Ardeidae						
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi	M			M	C
<i>Agamia agami</i> (Gmelin, 1789)	garça-da-mata	M			C*	

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	L			C*,M*,A*	C
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura	L			C*,M*,A*	
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	L			M*,A*	
<i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)	garça-real	M			M*,A*	
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	L			C*,M*,A*	
Ciconiidae						
<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	cabeça-seca	L			M*	
CATHARTIFORMES						
Cathartidae						
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	L			C*,M*,A*	
<i>Cathartes melambrotus</i> Wetmore, 1964	urubu-da-mata	M			C*,M*,A*	
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	L			C*,M*,A*	C
<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-rei	M			C*,M*,A*	
FALCONIFORMES						
Pandionidae						
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora	M			A*	
Accipitridae						
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza	M		II	C*	

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura	M		II	C*,M*,A*	
<i>Gampsonyx swainsonii</i> Vigors, 1825	gaviãozinho	L		II	M*	
<i>Harpagus bidentatus</i> (Latham, 1790)	gavião-ripina	M		II	C	C
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi	M		II	C*,M,A*	C
<i>Geranospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	gavião-pernilongo	M			A*	
<i>Leucopternis kuhli</i> Bonaparte, 1850	gavião-vaqueiro	H	x		C*	
<i>Leucopternis albicollis</i> (Latham, 1790)	gavião-branco	H			M*	
<i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	gavião-preto	M		II	M*,A*	
<i>Busarellus nigricollis</i> (Latham, 1790)	gavião-belo	L		II	A*	
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	L		II	M,A*	C,R
<i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790)	gavião-pedrês	M		II	M,A*	C
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta	M		II	C*	
<i>Buteo albonotatus</i> Kaup, 1847	gavião-de-rabo-barrado	M			A*	
Falconidae						
<i>Daptrius ater</i> Vieillot, 1816	gavião-de-anta	L		II	C*,M,A*	C
<i>Ibycter americanus</i> (Boddaert, 1783)	gralhão	H		II	C,M,A*	C
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará	L		II	C*,M*,A*	
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	L		II	C*,M*,A*	

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
					CITES	Área
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã	L		II	C*,M*,A*	
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	M		II	C,M	C
<i>Micrastur gilvicollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-mateiro	H		II	M	C
<i>Micrastur mintoni</i> Whittaker, 2002	falcão-críptico			II	C,M	C
<i>Falco ruficularis</i> Daudin, 1800	cauré	L		II	C*,M*,A*	
GRUIFORMES						
Psophiidae						
<i>Psophia leucoptera</i> Spix, 1825	jacamim-de-costas-brancas	H	x		C*,M*	
<i>Psophia viridis</i> Spix, 1825	jacamim-de-costas-verdes	H	x		M	C
Rallidae						
<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes	H			C,M*	C
<i>Laterallus viridis</i> (Statius Muller, 1776)	sanã-castanha	L			C*	
<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	sanã-do-capim	L			C*,A*	
<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó	M			A*	
Eurypygidae						
<i>Eurypyga helias</i> (Pallas, 1781)	pavãozinho-do-pará	M			A*	
CHARADRIIFORMES						
Charadriidae						

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Vanellus cayanus</i> (Latham, 1790)	batuíra-de-esporão	M			C*,M*,A*	
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	L			M*,A*	
<i>Charadrius collaris</i> Vieillot, 1818	batuíra-de-coleira	H			A*	
Scolopacidae						
<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-grande-de-perna-amarela				M*	
<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-colete				A*	
Jacanidae						
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	L			C*,M*,A*	
Sternidae						
<i>Sternula superciliaris</i> (Vieillot, 1819)	trinta-réis-anão	H			C*,M*,A*	
<i>Phaetusa simplex</i> (Gmelin, 1789)	trinta-réis-grande	H			C*,M*,A*	
Rynchopidae						
<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	talha-mar	H			M*,A*	
COLUMBIFORMES						
Columbidae						
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	L			C*,M,A*	RP
<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	pararu-azul	L			C,A*	C
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	L			A*	

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal	M			C,M,A*	C
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa	H			C,M,A*	C
<i>Patagioenas subvinacea</i> (Lawrence, 1868)	pomba-botafogo	H			C,M	C
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	L			M*	
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemedeira	M			M,A*	C,R
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri	M			C,M,A*	C,R
PSITTACIFORMES						
Psittacidae						
<i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758)	arara-canindé	M		II	C*,M,A*	C
<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)	araracanga	M		I	C,M*,A*	C
<i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859	arara-vermelha-grande	H		II	C,M,A*	C
<i>Ara severus</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-guaçu	M		II	C,M,A*	C
<i>Orthopsittaca manilata</i> (Boddaert, 1783)	maracanã-do-buriti	M		II	M*,A*	
<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	M		II	M*,A*	
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã	L		II	C*,M*,A*	
<i>Aratinga weddellii</i> (Deville, 1851)	periquito-de-cabeça-suja	L		II	C,M,A	C,RB
<i>Aratinga aurea</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rei	M		II	A*	
<i>Pyrrhura perlata</i> (Spix, 1824)	tiriba-de-barriga-vermelha	H	x		C*	

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Pyrrhura snethlageae</i> Joseph & Bates, 2002	tiriba-do-madeira		x	II	C,M*	C,RB
<i>Brotogeris versicolurus</i> (Statius Muller, 1776)	periquito-de-asa-branca	M		II	C*,A*	
<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	periquito-de-encontro-amarelo	M		II	M*,A*	
<i>Brotogeris chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766)	periquito-de-asa-dourada	M		II	C,M,A	C,RB
<i>Brotogeris sanctithomae</i> (Statius Muller, 1776)	periquito-testinha	M		II	M*	
<i>Pionites leucogaster</i> (Kuhl, 1820)	marianinha-de-cabeça-amarela	H	x	II	C,M,A*	C
<i>Pytilia barrabandi</i> (Kuhl, 1820)	curica-de-bochecha-laranja	H		II	C,M*,A*	C,RB
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766)	maitaca-de-cabeça-azul	L		II	C,M,A	C,RP,RB
<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783)	papagaio-moleiro	M		II	C,M,A*	C,RB
<i>Amazona ochrocephala</i> (Gmelin, 1788)	papagaio-campeiro	M		II	C,M,A*	C
CUCULIFORMES						
Cuculidae						
<i>Coccyzua minuta</i> (Vieillot, 1817)	chincão-pequeno	L			C,M	R
<i>Micrococcyx cinereus</i> (Vieillot, 1817)	papa-lagarta-cinzento	M			M	RP
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	L			C*,M,A*	C
<i>Piaya melanogaster</i> (Vieillot, 1817)	chincão-de-bico-vermelho	H			C	C
<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado	L			C*	
<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	anu-coroca	M			M*	

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
					CITES	Área
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	L			C,M,A*	C
STRIGIFORMES						
Strigidae						
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	L		II	A*	
<i>Megascops usta</i> (Sclater, 1858)	corujinha-relógio			II	C,M	C
<i>Lophostrix cristata</i> (Daudin, 1800)	coruja-de-crista	H		II	C*,M	C
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	murucututu	M		II	M*	
<i>Strix huhula</i> Daudin, 1800	coruja-preta	M		II	C*,M	C
<i>Glaucidium hardyi</i> Vielliard, 1990	caburé-da-amazônia	H		II	C,M	C
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	M		II	M*	
<i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	mocho-diabo	M			M*	
CAPRIMULGIFORMES						
Nyctibiidae						
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua	L			M*	
Caprimulgidae						
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju	M			C,M	C
<i>Chordeiles rupestris</i> (Spix, 1825)	bacurau-da-praia	M			M*,A*	
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau	L			C,M*	C

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i> (Tschudi, 1844)	bacurau-ocelado	M			M	C
<i>Caprimulgus parvulus</i> Gould, 1837	bacurau-chintã	L			C,M*,A*	C
<i>Hydropsalis climacocerca</i> (Tschudi, 1844)	acurana	M			M	RP
APODIFORMES						
Apodidae						
<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	andorinhão-de-sobre-cinzento	M			M	C
<i>Chaetura egregia</i> Todd, 1916	taperá-de-garganta-branca	M			M*	
<i>Chaetura viridipennis</i> Cherrie, 1916	andorinhão-da-amazônia				M*	
<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	tesourinha	L			C*,M,A*	C
<i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	andorinhão-estofador	M			C,M	C
Trochilidae						
<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-bico-torto	L			C	C
<i>Threnetes leucurus</i> (Linnaeus, 1766)	balança-rabo-de-garganta-preta	M		II	C	R
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	rabo-branco-rubro	M		II	C,M	C,R
<i>Phaethornis hispidus</i> (Gould, 1846)	rabo-branco-cinza	M		II	C,M	R
<i>Phaethornis philippii</i> (Bourcier, 1847)	rabo-branco-amarelo	H	x	II	C,M	C,R
<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	rabo-branco-de-bigodes	H			C,M	R
<i>Phaethornis malaris</i> (Nordmann, 1835)	besourão-de-bico-grande	H		II	M	R

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Campylopterus largipennis</i> (Boddaert, 1783)	asa-de-sabre-cinza	M		II	M	R
<i>Florisuga mellivora</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-azul-de-rabo-branco	L		II	C*	
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	L			A*	
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura-verde	M		II	C	R
<i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-roxo	L		II	C,M	C
<i>Heliathryx auritus</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-bochecha-azul	M		II	C*	
TROGONIFORMES						
Trogonidae						
<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838	surucuá-de-cauda-preta	M			C,M	C
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	surucuá-grande-de-barriga-amarela	M			C,M	C
<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788	surucuá-violáceo	M			C,M*	C
<i>Trogon curucui</i> Linnaeus, 1766	surucuá-de-barriga-vermelha	M			C,M	C
<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	surucuá-de-barriga-amarela	M			M*	
CORACIIFORMES						
Alcedinidae						
<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	L			C*,M*,A*	
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	L			M*,A*	
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno	L			C*,M*,A*	

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-da-mata	M			C	C
Momotidae						
<i>Electron platyrhynchum</i> (Leadbeater, 1829)	udu-de-bico-largo	M			C,M,A*	C
<i>Baryphthengus martii</i> (Spix, 1824)	juruva-ruiva	M			C,M	C
<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766)	udu-de-coroa-azul	M			C,M	C,R
GALBULIFORMES						
Galbulidae						
<i>Galbula cyanicollis</i> Cassin, 1851	ariramba-da-mata	H	x		M	C
<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816	ariramba-de-cauda-ruiva	L			M*,A*	
<i>Galbula cyanescens</i> Deville, 1849	ariramba-da-capoeira	L	x		C,A*	R
<i>Galbula leucogastra</i> Vieillot, 1817	ariramba-bronzeada	H			C,M	C
<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758)	ariramba-do-paraíso	M			C,M*	C
<i>Jacamerops aureus</i> (Statius Muller, 1776)	jacamaraçu	H			C,M,A*	C
Bucconidae						
<i>Notharchus hyperrhynchus</i> (Sclater, 1856)	macuru-de-testa-branca				C,M*	C
<i>Notharchus tectus</i> (Boddaert, 1783)	macuru-pintado	M			C	C
<i>Nystalus striolatus</i> (Pelzeln, 1856)	rapazinho-estriado	M			C,M	C
<i>Monasa nigrifrons</i> (Spix, 1824)	chora-chuva-preto	M			C,M,A*	C,R

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Monasa morphoeus</i> (Hahn & Küster, 1823)	chora-chuva-de-cara-branca	H			C,M	C,R
<i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782)	urubuzinho	L			C*,M*,A*	
PICIFORMES						
Capitonidae						
<i>Capito auratus</i> (Dumont, 1816)	capitão-de-frente-dourada				C,M	C
Ramphastidae						
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	tucano-grande-de-papo-branco	H		II	C,M,A*	C
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	H		II	C,M,A*	C
<i>Selenidera reinwardtii</i> (Wagler, 1827)	saripoca-de-coleira	H			C,M	C
<i>Pteroglossus bitorquatus</i> Vigors, 1826	araçari-de-pescoço-vermelho	M	x		C*	
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)	araçari-de-bico-branco	M			M*	
<i>Pteroglossus castanotis</i> Gould, 1834	araçari-castanho	H			C,M*	C
Picidae						
<i>Picumnus aurifrons</i> Pelzeln, 1870	pica-pau-anão-dourado	M	x		C,M*	C
<i>Picumnus rufiventris</i> Bonaparte, 1838	pica-pau-anão-vermelho	L			C	C
<i>Melanerpes cruentatus</i> (Boddaert, 1783)	benedito-de-testa-vermelha	L			C,M	C
<i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821)	picapauzinho-avermelhado	M			C,M	C
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-bufador	H			C,M	C

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-dourado-escuro	M			M	C
<i>Colaptes punctigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-peito-pontilhado	L			C	R
<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845)	picapauzinho-chocolate	H			C	C
<i>Celeus elegans</i> (Statius Muller, 1776)	pica-pau-chocolate	M			M	C
<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-coleira	H			C*,M	C
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	L			M	C
<i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-barriga-vermelha	H			C,M	C
<i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-topete-vermelho	M			C,M*	C
PASSERIFORMES						
Thamnophilidae						
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814)	papa-formiga-barrado	M			C,M	C
<i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)	choró-boi	L			C	C
<i>Thamnophilus doliatus</i> (Linnaeus, 1764)	choca-barrada	L			A*	
<i>Thamnophilus schistaceus</i> d'Orbigny, 1835	choca-de-olho-vermelho	H			C	C,R
<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1868	choca-murina	H			C,M	C,R
<i>Thamnophilus stictocephalus</i> Pelzelin, 1868	choca-de-natterer		x		C	C,R
<i>Thamnophilus aethiops</i> Sclater, 1858	choca-lisa	H			C,M	C,R
<i>Thamnophilus amazonicus</i> Sclater, 1858	choca-canela	L			C,A*	C

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Thamnomanes saturninus</i> (Pelzeln, 1878)	uirapuru-selado	H	x		C,M	C,R
<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820)	ipecuá	H			C,M	C,R
<i>Pygoptila stellaris</i> (Spix, 1825)	choca-cantadora	M			C	C
<i>Epinecophylla leucophthalma</i> (Pelzeln, 1868)	choquinha-de-olho-branco	H	x		C,M	C
<i>Epinecophylla haematonota</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-garganta-carijó	H			C,M	C,R
<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783)	choquinha-miúda	L			C*,M	C
<i>Myrmotherula sclateri</i> Sneath, 1912	choquinha-de-garganta-amarela	M	x		C,M*	C
<i>Myrmotherula multostriata</i> Sclater, 1858	choquinha-estriada-da-amazônia				A*	
<i>Myrmotherula hauxwelli</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-garganta-clara	H			C,M	C,R
<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	choquinha-de-flanco-branco	M			C,M	C,R
<i>Myrmotherula longipennis</i> Pelzeln, 1868	choquinha-de-asa-comprida	H			C,M	C
<i>Myrmotherula iheringi</i> Sneath, 1914	choquinha-de-ihering	H	x		C,M*	C
<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837)	choquinha-de-garganta-cinza	H			C,M	C,R
<i>Myrmotherula assimilis</i> Pelzeln, 1868	choquinha-da-várzea	M			A*	
<i>Dichrozona cincta</i> (Pelzeln, 1868)	tovaquinha	H			C	C
<i>Microrhophias quixensis</i> (Cornalia, 1849)	papa-formiga-de-bando	M			C,M	C,R
<i>Formicivora grisea</i> (Boddaert, 1783)	papa-formiga-pardo	H			M	C
<i>Drymophila devillei</i> (Menegaux & Hellmayr, 1906)	trovoada-listrada	H	x		C*	

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Terenura humeralis</i> Sclater & Salvin, 1880	zidedê-de-encontro	H			C	C
<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857)	chororó-pocué	H			C,M,A*	C
<i>Cercomacra tyrannina</i> (Sclater, 1855)	chororó-escuro	L			M	C
<i>Cercomacra nigrescens</i> (Cabanis & Heine, 1859)	chororó-negro	M			C,M*	R
<i>Cercomacra serva</i> (Sclater, 1858)	chororó-preto	M			C,M	C,R
<i>Myrmoborus myotherinus</i> (Spix, 1825)	formigueiro-de-cara-preta	H			C,M	C,R
<i>Hypocnemis peruviana</i> Taczanowski, 1884	cantador-sinaleiro				C,M,A*	C,R
<i>Hypocnemis ochrogyna</i> Zimmer, 1932	cantador-ocráceo				M	C,R
<i>Sclateria naevia</i> (Gmelin, 1788)	papa-formiga-do-igarapé	M			C,A*	R
<i>Schistocichla humaythae</i> (Hellmayr, 1907)	formigueiro-de-cauda-curta				C*,M	R
<i>Schistocichla rufifacies</i> (Hellmayr, 1929)	formigueiro-de-cara-ruiva				C,M	R
<i>Myrmeciza hemimelaena</i> Sclater, 1857	formigueiro-de-cauda-castanha	M			C,M	C,R
<i>Myrmeciza atrothorax</i> (Boddaert, 1783)	formigueiro-de-peito-preto	L			C,M	C
<i>Myrmeciza fortis</i> (Sclater & Salvin, 1868)	formigueiro-de-taoca	H			C	R
<i>Gymnopathys salvini</i> (Berlepsch, 1901)	mãe-de-taoca-de-cauda-barrada	H	x		C,M	C,R
<i>Rhegmatorhina hoffmannsi</i> (Hellmayr, 1907)	mãe-de-taoca-papuda	H	x		C,M*	R
<i>Hylophylax naevius</i> (Gmelin, 1789)	guarda-floresta	H			M	C,R
<i>Hylophylax punctulatus</i> (Des Murs, 1856)	guarda-várzea	M			M	R

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
					CITES	Área
<i>Willisornis poecilinotus</i> (Cabanis, 1847)	rendadinho	M			C,M	C,R
<i>Phlegopsis nigromaculata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	mãe-de-taoca	M			C*	
Conopophagidae						
<i>Conopophaga aurita</i> (Gmelin, 1789)	chupa-dente-de-cinta	H			C*	
Grallariidae						
<i>Myrmothera campanisona</i> (Hermann, 1783)	tovaca-patinho	H			C,M*	C
Formicariidae						
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	galinha-do-mato	H			C,M	C,R
<i>Formicarius analis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pinto-do-mato-de-cara-preta	M			M	C
Scleruridae						
<i>Sclerurus mexicanus</i> Sclater, 1857	vira-folha-de-peito-vermelho	H			M	R
<i>Sclerurus rufularis</i> Pelzeln, 1868	vira-folha-de-bico-curto	H			C	R
Dendrocolaptidae						
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-pardo	H			C,M	C,R
<i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1829)	arapaçu-da-taoca	H			C	R
<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-rabudo	H			C,M*	C,R
<i>Deconychura stictolaema</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-de-garganta-pintada	H			C,M	C,R
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	M			C,M	C

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819)	arapaçu-de-bico-de-cunha	M			C,M	C,R
<i>Dendrexetastes rufigula</i> (Lesson, 1844)	arapaçu-galinha	H			C,M	C
<i>Hylexetastes stresemanni</i> Sneathlaga, 1925	arapaçu-de-barriga-pintada	H			C	C
<i>Hylexetastes uniformis</i> Hellmayr, 1909	arapaçu-uniforme		x		C	C
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> (Lesson, 1840)	arapaçu-vermelho	H			C*	
<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783)	arapaçu-barrado	H			C,M	C,R
<i>Dendrocolaptes hoffmannsi</i> Hellmayr, 1909	arapaçu-marrom	H	x		C,M	C
<i>Dendroplex picus</i> (Gmelin, 1788)	arapaçu-de-bico-branco	L			M,A*	C,R
<i>Dendroplex kienerii</i> (Des Murs, 1855)	arapaçu-ferrugem				M	C
<i>Xiphorhynchus ocellatus</i> (Spix, 1824)	arapaçu-ocelado	H			C	R
<i>Xiphorhynchus elegans</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-elegante	H			C,M	C,R
<i>Xiphorhynchus spixii juruanus</i>	arapaçu				C	R
<i>Xiphorhynchus guttatus</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-de-garganta-amarela	L			C,M,A*	C,R
Furnariidae						
<i>Synallaxis rutilans</i> Temminck, 1823	joão-teneném-castanho	H			C,M	C,R
<i>Hyloctistes subulatus</i> (Spix, 1824)	limpa-folha-riscado	H			C*	
<i>Philydor erythrocercum</i> (Pelzeln, 1859)	limpa-folha-de-sobre-ruivo	H			C*,M*	
<i>Philydor erythropterum</i> (Sclater, 1856)	limpa-folha-de-asa-castanha	H			C	C

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844)	barranqueiro-camurça	M			C,M*	R
<i>Xenops milleri</i> (Chapman, 1914)	bico-virado-da-copa	H			C,M*	C
<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	bico-virado-miúdo	M			C,M,A*	C,R
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó	M			M*	
Tyrannidae						
<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823)	abre-asa	M			C,M	C,R
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	M			C*	
<i>Corythopsis torquatus</i> (Tschudi, 1844)	estalador-do-norte	H			C	C
<i>Hemitriccus minor</i> (Sneathlage, 1907)	maria-sebinha	H			C,M	C,R
<i>Hemitriccus griseipectus</i> (Sneathlage, 1907)	maria-de-barriga-branca				C	C
<i>Hemitriccus minimus</i> (Todd, 1925)	maria-mirim	H	x		C,M	C
<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	caçula	M			C,M	C
<i>Poecilatriccus senex</i> (Pelzeln, 1868)	maria-do-madeira	M	x		M	C
<i>Poecilatriccus latirostris</i> (Pelzeln, 1868)	ferreirinho-de-cara-parda	L			M	C
<i>Todirostrum maculatum</i> (Desmarest, 1806)	ferreirinho-estriado	L			C*,M*,A*	
<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790)	maria-te-viu	L			C,M,A*	C
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839)	maria-pechim	M			C,M,A*	C
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	guaracava-cinzenta	M			C,M	C

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	guaracava-de-crista-alaranjada	M			C*,M	C
<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853	poiaeiro-de-sobrancelha	M			C,M	C
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	L			C,M,A*	C
<i>Zimmerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1868)	poiaeiro-de-pata-fina	M			C,A*	C
<i>Cnipodectes subbrunneus</i> (Sclater, 1860)	flautim-pardo	H			C,M	C,R
<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868)	bico-chato-da-copa	H			C	C
<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884)	bico-chato-de-cabeça-cinza	M			C,M	C,R
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)	bico-chato-amarelo	L			C*,M	C
<i>Platyrinchus platyrhynchos</i> (Gmelin, 1788)	patinho-de-coroa-branca	H			C,M	C
<i>Onychorhynchus coronatus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-leque	H			C	R
<i>Terenotriccus erythrurus</i> (Cabanis, 1847)	papa-moscas-uirapuru	M			C,M	C,R
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	M			C,M	R
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu	L			M	R
<i>Cnemotriccus fuscatus bimaculatus</i>	guaracavuçu				C,M	C
<i>Cnemotriccus fuscatus duidae</i>	guaracavuçu				C,M	C
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	príncipe	L			C*,M	C
<i>Ochthornis littoralis</i> (Pelzeln, 1868)	maria-da-praia	M			C*,M,A*	RP
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno	L			A*	

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Muscisaxicola fluviatilis</i> Sclater & Salvin, 1866	gaúcha-d'água	M			M	RP
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	L			C,M,A*	C
<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	bentevizinho-de-asa-ferrugínea	L			C*,M*,A*	
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	L			C,M,A*	C,RP
<i>Conopias parvus</i> (Pelzeln, 1868)	bem-te-vi-da-copa	M			C,M*	C
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado	L			C*,M	C
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei	L			C,M,A*	C
<i>Tyrannopsis sulphurea</i> (Spix, 1825)	suiriri-de-garganta-rajada	M			M*	
<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	peitica-de-chapéu-preto	L			C	C
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	L			C,M,A*	C,RP
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha	L			M*	
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823)	vissia	H			C,M	C
<i>Rhytipterna immunda</i> (Sclater & Salvin, 1873)	vissia-cantor	M			M	C
<i>Casiornis rufus</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro	M			C*,M	C
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	maria-cavaleira-pequena	L			C	C
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré	L			M	C
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	L			C,M*	C

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	L			C,M,A*	C
<i>Ramphotrigon ruficauda</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-rabo-vermelho	M			C,M	C,R
<i>Attila citriniventris</i> Sclater, 1859	tinguaçu-de-barriga-amarela	H			C,M	C
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789)	capitão-de-saíra-amarelo	M			C,M	C
Cotingidae						
<i>Cotinga cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-azul	H			M	C
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820)	cricrió	H			C,M	C
<i>Xipholena punicea</i> (Pallas, 1764)	anambé-pompadora	M			C	C
<i>Gymnoderus foetidus</i> (Linnaeus, 1758)	anambé-pombo	M			C,M,A*	C
<i>Querula purpurata</i> (Statius Muller, 1776)	anambé-una	M			C,M	C
Pipridae						
<i>Tyranneutes stolzmanni</i> (Hellmayr, 1906)	uirapuruzinho	H			C,M,A*	C,R
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	papinho-amarelo	H			C,M	C
<i>Machaeropterus pyrocephalus</i> (Sclater, 1852)	uirapuru-cigarra	M			C,M	C,R
<i>Lepidothrix coronata</i> (Spix, 1825)	uirapuru-de-chapéu-azul	M			C	C,R
<i>Lepidothrix nattereri</i> (Sclater, 1865)	uirapuru-de-chapéu-branco	H	x		C,M	C,R
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira	L			C,M	C,R
<i>Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766)	tangará-falso	H			C	C

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Xenopipo atronitens</i> Cabanis, 1847	pretinho	M			C,M	C,R
<i>Pipra fasciicauda</i> Hellmayr, 1906	uirapuru-laranja	M			C,M	C,R
<i>Pipra rubrocapilla</i> Temminck, 1821	cabeça-encarnada	H			C,M	C,R
Tityridae						
<i>Schiffornis turdina</i> (Wied, 1831)	flautim-marrom	H			C,M	C,R
<i>Laniocera hypopyrra</i> (Vieillot, 1817)	chorona-cinza	H			M*	
<i>Tityra semifasciata</i> (Spix, 1825)	anambé-branco-de-máscara-negra	M			C,M	C
<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde	M			C	C
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	L			M	C
<i>Pachyramphus marginatus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-bordado	H			C,M	C
<i>Pachyramphus minor</i> (Lesson, 1830)	caneleiro-pequeno	H			C*	
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto	M			C	R
Vireonidae						
<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838)	assobiador-do-castanhal	H			M	C
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruvicara	L			C,M*	C
<i>Hylophilus thoracicus</i> Temminck, 1822	vite-vite				M*,A*	
<i>Hylophilus semicinereus</i> Sclater & Salvin, 1867	verdinho-da-várzea	L			M*	
<i>Hylophilus hypoxanthus</i> Pelzeln, 1868	vite-vite-de-barriga-marela	H			C,M,A*	C

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873	vite-vite-camurça	H			C,M*	C
<i>Hylophilus ochraceiceps</i> Sclater, 1860	vite-vite-uirapuru	M			M*	
Hirundinidae						
<i>Pygochelidon melanoleuca</i> (Wied, 1820)	andoriha-de-coleira	M			C,M,A	RP
<i>Atticora fasciata</i> (Gmelin, 1789)	peitoril	M			C*,M*,A*	
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	L			C*,M,A*	RP
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo	L			C,M,A*	C
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande	L			C*,M,A*	C
<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	andorinha-do-rio	L			C*,M*,A*	
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-do-barranco	L			A*	
Troglodytidae						
<i>Microcerculus marginatus</i> (Sclater, 1855)	uirapuru-veado	H			C	C
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	L			C,M,A*	C,RP
<i>Campylorhynchus turdinus</i> (Wied, 1831)	catatau	L			C,M	C
<i>Pheugopedius genibarbis</i> (Swainson, 1838)	garrinção-pai-avô	L			C,M,A*	C,R
<i>Cantorchilus leucotis</i> (Lafresnaye, 1845)	garrinção-de-barriga-vermelha	L			C,M	C
Poliopitilidae						
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	bico-assovelado	L			C	C

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Polioptila paraensis</i> Todd, 1937	balança-rabo-paraense				C	C
Turdidae						
<i>Turdus hauxwelli</i> Lawrence, 1869	sabiá-bicolor	H			C	R
<i>Turdus ignobilis</i> Sclater, 1858	caraxué-de-bico-preto	L			C	C
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	M			C,M	R
Coerebidae						
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	L			C*,M,A*	C
Thraupidae						
<i>Saltator grossus</i> (Linnaeus, 1766)	bico-encarnado	M			C	R
<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola	L			C,M	C
<i>Saltator coerulescens</i> Vieillot, 1817	sabiá-gongá	L			M*,A*	
<i>Parkerthraustes humeralis</i> (Lawrence, 1867)	furriel-de-encontro	H			M*	
<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	pipira-de-bico-vermelho	H			C,M	C
<i>Eucometis penicillata</i> (Spix, 1825)	pipira-da-taoca	M			M	C
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo	M			C,M	C
<i>Tachyphonus nattereri</i> Pelzeln, 1870	pipira-de-natterer				C*	
<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766)	tem-tem-de-topete-ferrugíneo	M			C	C
<i>Tachyphonus luctuosus</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	tem-tem-de-dragona-branca	M			C*,M*	

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Lanio versicolor</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pipira-de-asa-branca	H	x		C*,M*	
<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	pipira-vermelha	L			C,M,A*	C
<i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-da-amazônia	L			C*,M,A*	RP
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	L			C*,M,A*	C,RP
<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-bando	M			C,M,A*	C
<i>Tangara chilensis</i> (Vigors, 1832)	sete-cores-da-amazônia	M			C,M	C
<i>Tangara varia</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-carijó	M			C	C
<i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758)	saíra				C,M*	C
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	L			C,M*,A*	C
<i>Dacnis flaviventer</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	saí-amarela	M			M*	
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	L			C,M,A*	C
<i>Cyanerpes nitidus</i> (Hartlaub, 1847)	saí-de-bico-curto	H			C*,M*	
<i>Cyanerpes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	saí-de-perna-amarela	M			C,M*	C
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-beija-flor	L			C	C
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde	M			C*,M*	
<i>Hemithraupis flavicollis</i> (Vieillot, 1818)	saíra-galega	M			C*,M*	
Emberizidae						
<i>Ammodramus aurifrons</i> (Spix, 1825)	cigarrinha-do-campo	L			M,A*	RP

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	L			C,M,A*	C,R, RP
<i>Sporophila schistacea</i> (Lawrence, 1862)	cigarrinha-do-norte	M			C	R
<i>Sporophila luctuosa</i> (Lafresnaye, 1843)	papa-capim-preto-e-branco	L			C*	
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	L			C*	
<i>Sporophila castaneiventris</i> Cabanis, 1849	caboclinho-de-peito-castanho	L			M	RP
<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	tico-tico-de-bico-preto	M			C,M	C,R
<i>Paroaria gularis</i> (Linnaeus, 1766)	cardeal-da-amazônia	L			M*,A*	
Cardinalidae						
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso	H			C,M*	C
<i>Cyanoloxia cyanooides</i> (Lafresnaye, 1847)	azulão-da-amazônia	M			C,M	R
Icteridae						
<i>Psarocolius viridis</i> (Statius Muller, 1776)	japu-verde	H			C,M*	C
<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	japu	M			M	C
<i>Psarocolius bifasciatus</i> (Spix, 1824)	japuaçu	M			M*	
<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	xexéu	L			C,M,A*	C
<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	encontro	M			C*,M	C
<i>Sturnella militaris</i> (Linnaeus, 1758)	polícia-inglesa-do-norte	L			M,A*	RP
Fringillidae						

Táxon	Nome popular	Sens.	End.	Categoria de ameaça	Registros	
				CITES	Área	Método
<i>Euphonia chrysopasta</i> Sclater & Salvin, 1869	gaturamo-verde	M			M*	
<i>Euphonia xanthogaster</i> Sundevall, 1834	fim-fim-grande	M			C	C
<i>Euphonia rufiventris</i> (Vieillot, 1819)	gaturamo-do-norte	M			C,M,A*	C
Passeridae						
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	L			C*,M*,A*	

*Sensibilidade (segundo Stotz *et al.*, 1996): Sens.- sensibilidade alta às modificações ambientais (H); sensibilidade média às modificações ambientais (M); sensibilidade baixa às modificações ambientais (L). Endemismo (segundo Parker *et al.*, 1996; De Luca *et al.*, 2009): End. - espécies endêmicas à região ao sul do Rio Amazonas. Categoria de ameaça: Ameaçada (AM). CITES II - Espécies em risco de se tornarem ameaçadas de extinção, caso o comércio internacional não seja controlado. Área: Abunã (A); Caiçara (C); Mutum (M). Método: censo terrestre (C); censo aquático (CA); captura com redes de neblina durante a amostragem terrestre (R); captura com redes de neblina durante a amostragem nos pedrais e praias (RP); captura com rede de neblina durante a amostragem nos barreiros (RB). *: Registro qualitativo, feito fora dos métodos padrão.