

Anexo XX– Lista de espécies registradas de Mastofauna

Mamíferos de pequeno porte registrados na região da UHE Jirau, Porto Velho – RO, e indicação do grau de ameaça.

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
ORDEM DIDELPHIMORPHIA						
Família Didelphidae						
<i>Didelphis marsupialis</i>	Mucura	-	LC	-	C1	Gaiola, terrestre
<i>Micoureus demerarae</i>	Mucura-xixica	-	LC	-	C2, C3, C8	Sherman, terrestre
<i>Marmosops parvidens</i>	Mucura-xixica	-	LC	-	C2	Sherman, balde, terrestre
<i>Caluromys philander</i>	Mucura-xixica	-	LC	-	M	Op.
<i>Glironia venusta</i>	Mucura	-	LC	-	C3	Op. (Rede)
<i>Metachirus nudicaudatus</i>	Mucura-quatro-olhos	-	LC	-	C2, C4	Gaiola, balde, terrestre
ORDEM RODENTIA						
Família Sciruridae						
<i>Sciurus spadiceus</i>	Cuatipuru	-	LC	-	C3 oc.	Op.
Família Cricetidae						

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Hylaeamys cf. megacephalus</i>	Rato	-	LC	-	M8	Sherman, terrestre
<i>Oecomys cf. bicolor</i>	Rato	-	LC	-	M6	Sherman alto, terrestre
Família Echimyidae						
<i>Proechimys sp.</i>	Barriga-branca	-	-	-	C1,C3	Sherman, Gaiola, terrestre

* Critérios de ameaça: pouco preocupante (LC). Pontos: C (Caiçara), M (Mutum), A (Abunã); os números posteriores referem-se aos transectos; Métodos de registro: Op=oportunistico

Mamíferos de médio e grande porte registrados na região da UHE Jirau, Porto Velho – RO, e indicação do grau de ameaça.

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
ORDEM PILOSA						
Família Bradypodidae						
<i>Bradypus variegatus</i>	Preguiça	-	LC	-	BR364 Doca	Op.
Família Myrmecophagidae						
<i>Myrmecophaga tetradactyla</i>	Bandeira	VU	NT	II	Prox. C2	Op.
<i>Tamandua tetradactyla</i>	Tamanduá-mirim; mirim	-	LC	-	BR 364	Op.
ORDEM CINGULATA						
Família Dasypodidae						

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Dasypus novemcinctus</i> (cf. <i>kappleri</i>)	Tatu-galinha	-	-	-	C1, C2, C4; A11	CT (toca), AF
<i>Priodontes maximus</i>	Tatu-canastra	VU	VU	I	C1, C4	CT (rastros)
ORDEM PRIMATES						
Família Cebidae						
<i>Callithrix nigriceps</i>	Soim	-	DD	II	C3	Op.
<i>Saguinus labiatus</i>	Soim	-	LC	II	C1, C3; C, M	Op.; CF
<i>Saguinus weddelli</i>	Soim	-	LC	-	C4; C, M; C2	CT (vis.); CF; CT
<i>Saguinus</i> sp.	Soim	-	-	-	C1, A11	CT (vis.)
<i>Cebus apella</i>	Prego, macaco-prego	-	LC	II	Madeira, C1, C2, C4; C, M, A; A12	Op., CT (voc.), CT (vis.); CF; CT
<i>Cebus albifrons</i>	Cairara, caiarara	-	LC	-	M	CF
<i>Cebus</i> sp.		-	-	-	C, M	CF
<i>Mico</i> cf. <i>emiliae</i>	soim	-	DD	-	C	CF
<i>Saimiri boliviensis</i>	Macaco-de-cheiro, boca-preta	-	LC		C, M, B	CF
<i>Saimiri</i> cf. <i>ustus</i>	Macaco-de-cheiro, boca-preta	-	NT	II	C3, Madeira; C, M, A	Op.; CF
Família Pitheciidae						

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Callicebus cf. dubius</i>	Zogue-zogue	-	LC	II	Prox. M5; C	Op.; CF
<i>Callicebus sp.</i>	Zogue-zogue	-	-	-	C, M; A12	CF; CT
Família Aotidae						
<i>Aotus cf. nigriceps</i>	Macaco-da-noite	-	LC	II	C2/4; A12	Op.; CT
Família Atelidae						
<i>Alouatta puruensis</i>	Guariba	-	LC	-	Madeira, prox C e M; C, M; M	Op., CF (vis.)
<i>Ateles chamek</i>	Macaco-preto, macaco-aranha	-	EN	II	M6, A10, M	Op., CT, CF
<i>Lagothrix cf. cana</i>	Barrigudo	-	EN	II	C1; M, A11	Op.; CF
ORDEM RODENTIA						
Família Hydrochoeridae						
<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Capivara	-	LC	-	Madeira, prox. C3, C2	Op., CT (vis., rastro)
Família Cuniculidae						
<i>Cuniculus paca</i>	Paca	-	LC	III	M5 oc., A10, C1; M7	CT rastro; AF
Família Dasyproctidae						

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Dasyprocta cf. fuliginosa</i>	Cutia	-	LC	-	ProxC4, C1, C2; C3; M7; M6	Op., CT (vis.); AF
ORDEM CARNIVORA						
Família Felidae						
<i>Puma concolor</i>	Onça-parda, suçuarana	-	LC	II	C	Op.
Família Mustelidae						
<i>Eira Barbara</i>	Irara	-	LC	III	Madeira, Doca e Prox. C3	Op.
Família Procyonidae						
<i>Nasua nasua</i>	coati	-	LC	-	C1	CT (vis.)
ORDEM ARTIODACTYLA						
Família Tayassuidae						
<i>Pecari tajacu</i>	Cateto	-	LC	II	C4	CT (rastro)
<i>Tayassu pecari</i>	Porcão, queixada	-	NT	II	C1, C3, M6, M5, M8; C4, A10;M6	Op.; CT (rastro); AF
Família Cervidae						
<i>Mazama sp.</i>	Veado				C2	CT (rastro)
ORDEM PERISSODACTYLA						

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
Família Tapiridae						
<i>Tapirus terrestris</i>	Anta	-	VU	II	M5, M6, M7; C1, C2, C4, A10;	Op.;CT (rastros); AF
ORDEM CETACEA						
Família Iniidae						
<i>Inia sp.</i>	Boto vermelho	DD	DD	II	MA1	TA

* Critérios de ameaça: criticamente em perigo (CR); dados deficientes (DD); em perigo (EN); pouco preocupante (LC); quase ameaçada (NT); presumidamente em perigo (PA); vulnerável (VU). Apêndice I - Lista as espécies mais ameaçadas de extinção. O comércio internacional está proibido; Apêndice II - Lista as espécies em risco de se tornarem ameaçadas de extinção, caso o comércio internacional não seja controlado; e Apêndice III - Lista as espécies com o comércio internacional parcialmente regulado, mas que precisa da cooperação dos países para não haver sobreexploração.

Pontos: C (Caiçara), M (Mutum), A (Abunã); os números posteriores referem-se aos transectos; Métodos de registro: Op=oportunístico; CT=censo terrestre; CF=censo fluvial; vis.=visualização; voc.=vocalização; AF=armadilha fotográfica; TA = transecto aquático

Morcegos registrados na região da UHE Jirau, Porto Velho – RO, e indicação do grau de ameaça.

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
ORDEM CHIROPTERA						
Família Emballonuridae						

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Centronycteris cf. maximiliani</i>	morcego	-	LC	-	C3	Rede
Família Phyllostomidae						
<i>Carollia perspicillata</i>	morcego	-	LC	-	C1,C2, C3,C4, M8,A10, A11	Rede
<i>Carollia brevicauda</i>	morcego	-	LC	-	C2,C4, A11	Rede
<i>Rhinophylla fischeriae</i>	morcego	-	LC	-	M8,A10	Rede
<i>Rhinophylla pumilio</i>	morcego	-	LC	-	C1, C4, M8, A10, A11	Rede
<i>Desmodus rotundus</i>	morcego	-	LC	-	A11	Rede
<i>Glossophaga soricina</i>	morcego	-	LC	-	C2, C3, A11	Rede
<i>Lonchophylla thomasi</i>	morcego	-	LC	-	C2, C3, C4, A11	Rede
<i>Chrotopterus auritus</i>	morcego	-	LC	-	A10, A11	Rede
<i>Lophostoma silviculum</i>	morcego	-	LC	-	C4, M8, A10, A11	Rede
<i>Phylloderma stenops</i>	morcego	-	LC	-	M8, A10	Rede
<i>Phyllostomus elongatus</i>	morcego	-	LC	-	C3, M8, A11	Rede
<i>Phyllostomus hastatus</i>	morcego	-	LC	-	C3, A10	Rede

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
<i>Tonatia saurophila</i>	morcego	-	LC	-	M8	Rede
<i>Trachops cirrhosus</i>	morcego	-	LC	-	C3, A10	Rede
<i>Artibeus planirostris</i>	morcego	-	LC	-	C3, M8, A10, A11	Rede
<i>Aribeus lituratus</i>	morcego	-	LC	-	C2, M8, A10, A11	Rede
<i>Artibeus obscurus</i>	morcego	-	LC	-	C3, C4, M8, A10, A11	Rede
<i>Artibeus cinereus</i>	morcego	-	LC	-	C2	
<i>Artibeus gnomus</i>	morcego	-	LC	-	C4	Rede
<i>Artibeus glaucus</i>	morcego	-	LC	-	C2	Rede
<i>Mesophylla macconellii</i>	morcego	-	LC	-	C1, C2, C3	Rede
<i>Platyrrhinus helleri</i>	morcego	-	LC	-	A11	Rede
<i>Uroderma bilobatum</i>	morcego	-	LC	-	C2, C3, C4, A10, A11	Rede
<i>Vampyressa thuyone</i>	morcego	-	LC	-	C3	Rede
Família Mormoopidae						
<i>Pteronotus parnellii</i>	morcego	-	LC	-	C4, M8, A11	Rede
Família Thyropteridae						
<i>Thyroptera cf. tricolor</i>	morcego	-	LC	-	C2	Rede

Táxon	Nome popular	Categoria de ameaça			Registros	
		IBAMA 2008	IUCN	CITES	Pontos	Métodos
Família Vespertilionidae						
<i>Myotis nigricans</i>	morcego	-	LC	-	A11	Rede

* Critérios de ameaça: pouco preocupante (LC). Pontos: C (Caiçara), M (Mutum), A (Abunã); os números posteriores referem-se aos transectos.