



Mapa Pedológico - Folha 3/11



Legenda

- ▲ SPT
 - ⊕ Piezômetros
 - Rodovias
 - Cota de Inundação
 - Rio Madeira Atual
 - Drenagens e tributários do Rio Madeira
- pedologia**
- CX - Cambissolos Indiferenciados, solos rasos pouco desenvolvidos com horizonte B incipiente.
 - FF - Plintossolos Petroplintíticos solos de expressiva laterização.
 - LV - Latossolos Vermelhos Solos profundos bem evoluídos com expressivo horizonte B e baixa expressão do A, de coloração avermelhado.
 - Gac - Glicossolos Indiferenciados Solos constituídos por material mineral com horizonte glei iniciando-se dentro dos primeiros 150 cm.
 - PV - Argissolos Vermelhos Solos com horizonte B textural e argila de baixo ou alta atividade.
 - RL - Neossolos Litólicos Solos novos, pouco desenvolvidos (~20cm), sem horizonte B, localizados diretamente sobre a rocha e com fragmentos originados da própria rocha.
 - RYq - Neossolos Flúvicos Psamíticos Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico com acúmulo de carbono orgânico e alumínio.
 - RYtb - Neossolo Flúvico Tb Distrófico Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico. Horizonte glei dentro de 150 cm da superfície do solo.

