

Quadro 4. Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas no Fragmento IV – Mata da Sucupira, município de Icém/SP, margem esquerda do reservatório da UHE Marimbondo.

N.ind=Número de indivíduos; N.am=Número de amostragens (frequência absoluta); DeR=Densidade Relativa; DoR=Dominância Relativa; FrR=Frequência Relativa; IVC=Índice do Valor de Cobertura e IVI=Índice de Valor de Importância

Espécie	N.ind	N.am	DeR	DoR	FrR	IVC	IVI
<i>Pterodon emarginatus</i>	9	6	22.5	29.32	16.67	51.82	68.48
<i>Endlicheria paniculata</i>	6	5	15	31.17	13.89	46.17	60.06
<i>Machaerium brasiliensis</i>	4	4	10	5.06	11.11	15.06	26.18
<i>Xylopia aromatica</i>	3	3	7.5	3.71	8.33	11.21	19.54
<i>Copaifera langsdorfii</i>	2	2	5	8.52	5.56	13.52	19.07
<i>Trichilia silvatica</i>	2	2	5	4.22	5.56	9.22	14.77
<i>Plathymenia reticulata</i>	2	2	5	4.15	5.56	9.15	14.71
<i>Hymenaea courbaril</i>	1	1	2.5	6.69	2.78	9.19	11.96
<i>Machaerium acutifolium</i>	1	1	2.5	1.67	2.78	4.17	6.95
<i>Rollinia silvatica</i>	1	1	2.5	1.6	2.78	4.1	6.87
<i>Luehea grandiflora</i>	1	1	2.5	1.31	2.78	3.81	6.59
<i>Myracrodruon urundeuva.</i>	1	1	2.5	0.63	2.78	3.13	5.91
<i>Eugenia florida</i>	1	1	2.5	0.46	2.78	2.96	5.73
<i>Siparuna guianensis</i>	1	1	2.5	0.42	2.78	2.92	5.7
<i>Platypodium elegans</i>	1	1	2.5	0.31	2.78	2.81	5.59
<i>Alibertia sessilis</i>	1	1	2.5	0.31	2.78	2.81	5.59
<i>Brosimum gaudichaudii</i>	1	1	2.5	0.22	2.78	2.72	5.5
<i>Astronium fraxinifolium</i>	1	1	2.5	0.15	2.78	2.65	5.42
<i>Coutarea hexandra</i>	1	1	2.5	0.09	2.78	2.59	5.36