

Lista das espécies de mamíferos registradas na área de influência do AHE Pai Querê através dos esforços de amostragem, respectivas áreas de trabalho, métodos de obtenção dos registros (M): SH = armadilhas não letais do tipo Sherman, AQ = armadilhas de interceptação e queda, EG = exame de egagrópilos de rapinantes, DI = determinação indireta através de vestígios, BA = busca ativa para visualização direta, AF = armadilhas fotográficas, RN = redes de neblina, AB = busca por abrigos, e RO = registros ocasionais. Da mesma forma são informados os habitats de registro (H): R = riachos/rios, C = Campos, CS = Campos sujos (capoeiras), A = Alagados (açudes e suas margens, poças permanentes ou temporárias), B = Banhados/turfeiras, Af = Afloramentos rochosos, F = florestas e FP = Florestas de Pinus. Também são informadas as campanhas de amostragem em que foram diagnosticadas (A): CH = estação chuvosa, SE = estação seca.

Táxon	Nome Popular	AT1	AT2	AT3	AT4	AT5	AT6	AT7	AT8	AT9	AT10	AT11	AT12	AT13	
DIDELPHIMORPHA															
DIDELPHIDAE															
<i>Didelphis albiventris</i>	gambá-de-orelha-branca	BA/DI		DI/BA				BA							M
		F/CS		CS/F				C							H
		CH/SE		SE				SE							A
<i>Monodelphis dimidiata</i>	cuíca-anã	SH/AQ/EG	AQ	SH/AQ	SH/AQ	SH/AQ	AQ	SH/AQ	SH/AQ	AQ					M
		F/CS	F	F	F	F	CS	F	F	F					H
		CH/SE	SE	CH/SE	SE	SE	CH	CH/SE	SE	CH/SE					A
<i>Gracilinanus microtarsus</i>	cuíca	EG	AQ	SH/EG				EG	AQ	AQ	AQ		AQ		M
		F	F	F/CS				F	F	F	F/CS		F		H
		CH	SE	CH/SE				CH	SE	CH	SE		SE		A
CINGULATA															
DASYPODIDAE															
<i>Cabassous tatouay</i>	tatu-do-rabo-mole	AF			DI/AF										M
		CS			F										H
		SE			SE										A
<i>Dasytus sp.</i>	tatu									DI			DI		M
										F			F		H
										SE			SE		A
<i>Dasytus hybridus</i>	tatu-mulita	DI					BA						BA		M
		CS					CS						CS		H
		CH					CH						CH		A
<i>Dasytus novemcinctus</i>	tatu-galinha	DI/BA	DI/AF	BA/AF	DI	DI/AF	BA	DI/BA		DI			DI		M
		F	F	F	F	F	F	F/CS/P		CS			F		H
		CH/SE	CH/SE	CH	SE	CH/SE	CH	CH/SE		CH			CH		A
<i>Euphractus sexcinctus</i>	tatu-peludo	DI		BA		DI							DI		M
		C		C		F							F		H
		CH/SE		CH		SE							CH		A
PILOSA															
MYRMECOPHAGIDAE															
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-mirim	BA							BA	RO					M
		F							F	CS					H
		CH/SE							SE	SE					A
PRIMATES															
ATELIDAE															
<i>Alouatta guariba</i>	bugiu-ruivo	DI	BA	DI		BA	DI	DI	BA			DI			M
		F	F	F		F	F	F	F			F/FP			H
		CH	SE	CH		CH/SE	SE	CH	SE			SE			A
CEBIDAE															
		BA	SH												M

Lista das espécies de mamíferos registradas na área de influência do AHE Pai Querê através dos esforços de amostragem, respectivas áreas de trabalho, métodos de obtenção dos registros (M): SH = armadilhas não letais do tipo Sherman, AQ = armadilhas de interceptação e queda, EG = exame de egagrópilos de rapinantes, DI = determinação indireta através de vestígios, BA = busca ativa para visualização direta, AF = armadilhas fotográficas, RN = redes de neblina, AB = busca por abrigos, e RO = registros ocasionais. Da mesma forma são informados os habitats de registro (H): R = riachos/rios, C = Campos, CS = Campos sujos (capoeiras), A = Alagados (açudes e suas margens, poças permanentes ou temporárias), B = Banhados/turfeiras, Af = Afloramentos rochosos, F = florestas e FP = Florestas de Pinus. Também são informadas as campanhas de amostragem em que foram diagnosticadas (A): CH = estação chuvosa, SE = estação seca.

<i>Cebus nigratus</i>	macaco-prego	F	F												H
		CH	CH												A
RODENTIA															
SCIURIDAE															
<i>Guerlinguetus ingrami</i>	serelepe	BA/RO												RO	M
		F												F	H
		SE												SE	A
CRICETIDAE															
<i>Akodon azarae</i>	rato-do-chão	SH/AQ	SH	SH/EG		SH	SH/AQ	SH/EG		SH	SH			SH	M
		F	F	F/CS		F	F	F		F	F/CS			F	H
		SE	CH	CH/SE		CH	CH/SE	CH		CH	SE			CH	A
<i>Akodon cf. montensis</i>	rato-do-chão	SH		SH/EG			SH	SH/EG							M
		F		F/CS			F	F							H
		SE		CH/SE			CH	CH							A
<i>Akodon paranaensis</i>	rato-do-chão	SH/EG	SH	SH/EG	AQ	SH/AQ	SH/AQ	SH/EG	SH/AQ	AQ/SH		AQ/SH	AQ/SH	AQ/SH	M
		F	F	F/CS	FP	C/F	F	F	CS/F/FP	F		F	F	F	H
		CH/SE	CH/SE	CH	SE	CH/SE	CH/SE	CH/SE	SE	CH/SE		SE	SE	CH	A
<i>Bibimys labiosus</i>	rato-silvestre		SH	EG	AQ		EG						AQ		M
			C	CS	FP		F						F		H
			SE	SE	SE		SE						SE		A
<i>Bucepattersonius iheringi</i>	rato			EG			SH	EG							M
				CS			F	F							H
				CH			CH	CH							A
<i>Calomys laucha</i>	rato			EG				EG							M
				CS				F							H
				SE				CH							A
<i>Delomys dorsalis</i>	rato	SH		SH/EG		SH	AQ/SH	SH							M
		F		F/CS		F	F	F							H
		CH		CH/SE		SE	CH/SE	CH							A
<i>Deltamys sp.</i>	rato	SH									SH				M
		F									CS				H
		CH/SE									SE				A
<i>Deltamys kempii</i>	rato-silvestre		SH												M
			F												H
			SE												A
<i>Euryoryzomys russatus</i>	rato							EG							M
								F							H
								CH							A
<i>Holochilus brasiliensis</i>	rato-do-junco			EG				EG							M
				CS				F							H
				CH/SE				CH							A

Lista das espécies de mamíferos registradas na área de influência do AHE Pai Querê através dos esforços de amostragem, respectivas áreas de trabalho, métodos de obtenção dos registros (M): SH = armadilhas não letais do tipo Sherman, AQ = armadilhas de interceptação e queda, EG = exame de egagrópios de rapinantes, DI = determinação indireta através de vestígios, BA = busca ativa para visualização direta, AF = armadilhas fotográficas, RN = redes de neblina, AB = busca por abrigos, e RO = registros ocasionais. Da mesma forma são informados os habitats de registro (H): R = riachos/rios, C = Campos, CS = Campos sujos (capoeiras), A = Alagados (açudes e suas margens, poças permanentes ou temporárias), B = Banhados/turfeiras, Af = Afloramentos rochosos, F = florestas e FP = Florestas de Pinus. Também são informadas as campanhas de amostragem em que foram diagnosticadas (A): CH = estação chuvosa, SE = estação seca.

<i>Juliomys sp.</i>	rato	AQ		AQ		AQ		EG	AQ					M	
		F		F		F		F	FP					H	
		SE		SE		SE		CH	SE					A	
<i>Necomys lasiurus</i>	rato	EG		EG	SH		SH	SH/EG	AQ					M	
		F		CS	FP		F	F	FP					H	
		CH		CH/SE	SE		SE	CH/SE	SE					A	
<i>Nectomys squamipes</i>	rato-d'água			SH			SH	SH					RO	M	
				F			F	F					R	H	
				CH			CH	CH						SE	A
<i>Oligoryzomys nigripes</i>	camundongo-do-mato	SH/AQ/EG		SH/EG	SH/AQ	SH/AQ	SH/AQ/EG	SH/AQ/EG	SH/AQ	SH/AQ	SH/AQ	AQ	AQ/SH	SH/AQ	M
		F		F/CS	F/FP	C	F	F	F/FP	F/CS	F/C/CS	F/CS	F/CS	F/CS	H
		CH/SE		CH/SE	SE	CH/SE	CH/SE	CH/SE	SE	CH/SE	SE	SE	SE	CH/SE	A
<i>Oligoryzomys flavescens</i>	camundongo-do-campo	SH/AQ/EG	SH	SH/EG			SH/AQ/EG	EG/AQ	SH/AQ		SH/AQ				M
		F	C/F	F/CS			F	F	CS/FP		F/C				H
		CH/SE	SE	CH/SE			CH/SE	CH	SE		SE				A
<i>Oxymycterus quaestor</i>	rato-focinhudo	SH/AQ	SH	SH/EG	SH	AQ	SH	SH/EG	AQ	AQ	SH			SH	M
		F	F	F/CS	F/FP	C	F	F	FP	CS	F			F	H
		CH/SE	SE	CH/SE	SE	CH/SE	CH/SE	CH	SE	SE	SE			CH	A
<i>Oxymycterus nasutus</i>	rato-focinhudo			EG				EG							M
				CS				F							H
				SE				SE							A
<i>Scapteromys sp.</i>	rato-d'água			EG			SH/AQ	SH/EG							M
				CS			F	F							H
				CH/SE			CH	CH							A
<i>Sooretamys angouya</i>	rato-do-mato	EG		SH/EG		SH	SH	SH/AQ/EG		SH			AQ	SH	M
		F		F/CS		F	F	F		F			F	F	H
		CH		CH/SE		CH	CH	CH/SE		CH			SE	CH	A
<i>Thaptomys nigrita</i>	rato	AQ	SH	AQ/EG	AQ	SH	SH/AQ	AQ	AQ	AQ		AQ		AQ/SH	M
		F	C	F/CS	FP	F	F	F	CS/FP	CS		F		CS	H
		SE	SE	CH/SE	SE	SE	CH	CH	SE	SE		SE		SE	A
<i>Wilfredomys oenax</i>	rato-do-mato			EG											M
				CS											H
				SE											A
MURIDAE															
<i>Mus musculus*</i>	camundongo-doméstico	EG						AQ							M
		F						F							H
		CH						SE							A
<i>Rattus rattus*</i>	rato-das-casas			EG/RO											M
				CS/C											H
				CH/SE											A
ECHIMYIDAE															

Lista das espécies de mamíferos registradas na área de influência do AHE Pai Querê através dos esforços de amostragem, respectivas áreas de trabalho, métodos de obtenção dos registros (M): SH = armadilhas não letais do tipo Sherman, AQ = armadilhas de interceptação e queda, EG = exame de egagrópios de rapinantes, DI = determinação indireta através de vestígios, BA = busca ativa para visualização direta, AF = armadilhas fotográficas, RN = redes de neblina, AB = busca por abrigos, e RO = registros ocasionais. Da mesma forma são informados os habitats de registro (H): R = riachos/rios, C = Campos, CS = Campos sujos (capoeiras), A = Alagados (açudes e suas margens, poças permanentes ou temporárias), B = Banhados/turfeiras, Af = Afloramentos rochosos, F = florestas e FP = Florestas de Pinus. Também são informadas as campanhas de amostragem em que foram diagnosticadas (A): CH = estação chuvosa, SE = estação seca.

<i>Euryzgomatomys spinosus</i>	rato-de-espinho							EG	EG					M	
								F	F					H	
								SE	CH					A	
<i>Phyllomys sulinus</i>	rato-de-espinho			EG										M	
				CS										H	
				CH										A	
ERETHIZONTIDAE															
<i>Sphiggurus villosus</i>	ouriço-cacheiro			DI										M	
				F										H	
				SE										A	
CAVIIDAE															
<i>Cavia aperea</i>	preá	EG												M	
		F												H	
		CH												A	
<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	cavivara	DI/BA	DI	DI	DI	BA	DI	DI		DI			DI/RO	M	
		F	C/F	F	F	C	F	F		F			F/R	H	
		CH	CH/SE	CH	SE	CH/SE	CH/SE	CH		CH			CH/SE	A	
CUNICULIDAE															
<i>Cuniculus paca</i>	paca	DI						DI						M	
		F						F						H	
		CH						SE						A	
DASYPROCTIDAE															
<i>Dasyprocta azarae</i>	cutia	AF/DI						DI	BA		DI			BA/DI	M
		F						F	F		F			F	H
		SE						SE	CH		CH			CH/SE	A
MYOCASTORIDAE															
<i>Myocastor coypus</i>	ratão-do-banhado	BA	BA	BA		BA	BA	BA			BA			M	
		C	C	C		C	C	C			C			H	
		CH/SE	CH/SE	CH		CH/SE	CH	CH			SE			A	
LAGOMORPHA															
LEPORIDAE															
<i>Lepus europaeus*</i>	lebre	BA	BA	BA		BA	BA	BA		BA/DI	BA			BA/DI	M
		C	C	C		C	C	C		C	C			C	H
		CH	CH/SE	CH/SE		CH/SE	CH	CH		CH	SE			CH/SE	A
CHIROPTERA															
PHYLLOSTOMIDAE															
<i>Chrotopterus auritus</i>	morcego-bombachudo	AB		RN	RN	RN	RN	AB	RN			RN		RN	M
		F		F	F	F	F	F	F			F		F	H
		SE		CH	SE	SE	CH	CH	SE			SE		SE	A
<i>Desmodus rotundus</i>	morcego-vampiro		RN	RN		RN	AB/RN	RN			RN	RN	RN	RN	M
			F	F		F	F	F			F	F	F	F	H

Lista das espécies de mamíferos registradas na área de influência do AHE Pai Querê através dos esforços de amostragem, respectivas áreas de trabalho, métodos de obtenção dos registros (M): SH = armadilhas não letais do tipo Sherman, AQ = armadilhas de interceptação e queda, EG = exame de egagrópilos de rapinantes, DI = determinação indireta através de vestígios, BA = busca ativa para visualização direta, AF = armadilhas fotográficas, RN = redes de neblina, AB = busca por abrigos, e RO = registros ocasionais. Da mesma forma são informados os habitats de registro (H): R = riachos/rios, C = Campos, CS = Campos sujos (capoeiras), A = Alagados (açudes e suas margens, poças permanentes ou temporárias), B = Banhados/turfeiras, Af = Afloramentos rochosos, F = florestas e FP = Florestas de Pinus. Também são informadas as campanhas de amostragem em que foram diagnosticadas (A): CH = estação chuvosa, SE = estação seca.

			CH/SE	CH/SE		CH/SE	CH/SE	SE			SE	SE	SE	CH	A
<i>Glossophaga soricina</i>	morcego-beija-flor		RN			RN								RN	M
			F			F								F	H
			CH			CH								CH	A
<i>Platyrrhinus lineatus</i>	morcego										RN				M
											F				H
											CH				A
<i>Sturnira lilium</i>	morcego-fruteiro	RN	RN	RN		RN								RN	M
		F	F	F		F								F	H
		SE	CH	SE		SE								SE	A
MOLOSSIDAE															
<i>Molossus molossus</i>	morcego-da-cauda-grossa		RN			RN									M
			F			F									H
			CH/SE			CH									
<i>Tadarida brasiliensis</i>	morcego-das-casas		AB/RN	RN		RN		AB	RN	AB					M
			F	F		F		F	C	F					H
			CH/SE	CH		CH		CH	CH	SE					
VESPERTILIONIDAE															
Vespertilionidae n. ind.	morcego	AB													M
		F													H
		SE													A
<i>Eptesicus brasiliensis</i>	morcego-borboleta-grande							AB						RN	M
								F						F	H
								CH						CH	A
<i>Histiotus velatus</i>	morcego-orelhudo						AB								M
							C								H
							CH								A
<i>Histiotus montanus</i>	morcego-orelhudo						AB								M
							C								H
							SE								A
<i>Lasiurus cinereus</i>	morcego-grisalho		RN			RN									M
			F			F									H
			CH/SE			CH									A
<i>Myotis sp.</i>	morcego													RN	M
														F	H
														SE	A
<i>Myotis nigricans</i>	morcego-borboleta-escuro					RN	RN	AB						RN	M
						F	F	F						F	H
						CH	CH	CH						CH	A
<i>Myotis ruber</i>	morcego-borboleta-vermelho			RN									RN	M	
				F									F	H	

Lista das espécies de mamíferos registradas na área de influência do AHE Pai Querê através dos esforços de amostragem, respectivas áreas de trabalho, métodos de obtenção dos registros (M): SH = armadilhas não letais do tipo Sherman, AQ = armadilhas de interceptação e queda, EG = exame de egagrópilos de rapinantes, DI = determinação indireta através de vestígios, BA = busca ativa para visualização direta, AF = armadilhas fotográficas, RN = redes de neblina, AB = busca por abrigos, e RO = registros ocasionais. Da mesma forma são informados os habitats de registro (H): R = riachos/rios, C = Campos, CS = Campos sujos (capoeiras), A = Alagados (açudes e suas margens, poças permanentes ou temporárias), B = Banhados/turfeiras, Af = Afloramentos rochosos, F = florestas e FP = Florestas de Pinus. Também são informadas as campanhas de amostragem em que foram diagnosticadas (A): CH = estação chuvosa, SE = estação seca.

				CH/SE									SE	A
CARNIVORA														
FELIDAE														
<i>Leopardus pardalis</i>	jaguatirica	BA/DI	DI	DI		DI/BA	DI	AF/DI	DI/BA	AF		AF/DI	DI	M
		F	F	F		F	F	F	F	F		F	F	H
		CH/SE	CH	CH		CH/SE	CH/SE	CH/SE	SE	SE		SE	CH	A
<i>Leopardus tigrinus</i>	gato-do-mato-pequeno	DI		BA/DI	AF	DI	DI	DI	DI	AF/DI			DI	M
		F		F	F	F	F	F/P	F	F			F	H
		SE		CH/SE	SE	CH/SE	SE	CH	SE	CH/SE			CH	A
<i>Leopardus wiedii</i>	gato-maracajá	DI				DI		BA	DI	DI				M
		F				F		F	F	F				H
		CH				CH		CH	SE	CH				A
<i>Puma yagouaroundi</i>	gato-mourisco	BA/DI		DI	DI	DI	DI					AF	DI	M
		F		F	F	F	F					F	F	H
		CH/SE		CH	SE	CH/SE	CH					SE	CH	A
<i>Puma concolor</i>	puma	DI/AF/BA	DI	DI		C/DI	DI						DI	M
		F	F	F		F	F						F	H
		CH/SE	CH	CH/SE		CH/SE	CH						CH	A
CANIDAE														
<i>Cerdocyon thous</i>	graxaim-do-mato	DI/BA	BA	DI/BA/AF	BA	BA	DI/BA	DI/BA	BA	AF/DI		AF	BA/DI	M
		F/CS	C	F/CS	F	C	F/CS	F/CS	F	C		F	F/CS	H
		CH/SE	SE	CH/SE	SE	SE	CH/SE	CH/SE	SE	CH/SE		SE	CH/SE	A
<i>Lycalopex gymnocercus</i>	graxaim-do-campo	DI/BA	DI/BA	DI/BA		DI/BA	BA	DI/BA	BA	DI	DI		BA/DI	M
		CS	C	CS		C/F	CS	CS	F	C/F	CS		C/CS	H
		CH/SE	CH/SE	CH/SE		CH/SE	CH	CH/SE	SE	CH	SE		CH/SE	A
MUSTELIDAE														
<i>Lontra longicaudis</i>	lontra	DI		DI		DI	DI	DI	DI	DI			DI	M
		F		F/CS		F	F	F	F	F			F	H
		CH		CH/SE		SE	CH	CH	SE	CH			CH	A
<i>Eira barbara</i>	irara	DI/BA/AF		DI/BA		DI				DI		BA	AF/DI	M
		F		F		F				F		F	F	H
		CH/SE		CH/SE		CH/SE				CH		SE	CH/SE	A
<i>Galictis cuja</i>	furão					DI								M
						C								H
						CH								A
MEPHITIDAE														
<i>Conepatus chinga</i>	zorriho	BA	DI	DI/BA		BA	BA	BA/DI	BA	DI			DI	M
		CS	C	CS/C		C	CS	CS/C	C/FP	C			C	H
		CH	CH/SE	CH/SE		CH/SE	CH	CH/SE	SE	CH			CH	A
PROCYONIDAE														
		DI/BA	BA/DI	DI		DI	DI	DI				DI	DI	M

Lista das espécies de mamíferos registradas na área de influência do AHE Pai Querê através dos esforços de amostragem, respectivas áreas de trabalho, métodos de obtenção dos registros (M): SH = armadilhas não letais do tipo Sherman, AQ = armadilhas de interceptação e queda, EG = exame de egagrópilos de rapinantes, DI = determinação indireta através de vestígios, BA = busca ativa para visualização direta, AF = armadilhas fotográficas, RN = redes de neblina, AB = busca por abrigos, e RO = registros ocasionais. Da mesma forma são informados os habitats de registro (H): R = riachos/rios, C = Campos, CS = Campos sujos (capoeiras), A = Alagados (açudes e suas margens, poças permanentes ou temporárias), B = Banhados/turfeiras, Af = Afloramentos rochosos, F = florestas e FP = Florestas de Pinus. Também são informadas as campanhas de amostragem em que foram diagnosticadas (A): CH = estação chuvosa, SE = estação seca.

<i>Procyon cancrivorus</i>	mão-pelada	F	C/CS/F	C		F	CS/F	F/P				F		CS/F	H
		CH/SE	CH/SE	CH/SE		SE	CH/SE	CH/SE				SE		CH/SE	A
<i>Nasua nasua</i>	coati	BA		BA/AF		DI/BA	DI/AF/BA	DI		DI				DI	M
		F		F		F	F	F		F				F	H
		CH/SE		CH/SE		CH/SE	CH/SE	CH		CH				CH	A
ARTIODACTYLA															
TAYASSUIDAE															
<i>Pecari tajacu</i>	cateto	DI/AF/BA	AF/DI	DI/AF	DI	DI	DI	DI		DI					M
		F	F	F	FP	F	F	F		F					H
		CH/SE	CH	CH/SE	SE	CH	SE	CH/SE		CH					A
<i>Tayassu pecari</i>	queixada	BA													M
		F													H
		CH													A
SUIDAE															
<i>Sus scrofa*</i>	javali, porco-doméstico	DI/AF	BA/DI/AF	DI/BA	BA	DI	BA/DI		BA					BA/DI	M
		F	C/CS/F	F/CS	C/F/FP	F	F/CS		C/F/FP					F/CS	H
		CH/SE	CH/SE	SE	SE	CH/SE	CH		SE					CH/SE	A
CERVIDAE															
<i>Mazama sp.</i>	veado	DI		DI			DI	DI		DI/AF		DI		DI	M
		F		F			F	BA/F		F		F		F	H
		CH/SE		CH/SE			CH/SE	CH/SE		SE		SE		SE	A
<i>Mazama americana</i>	veado-mateiro	R						R		BA					M
		F						F		F					H
		CH						CH		CH					A
<i>Mazama gouazoubira</i>	veado-virá	BA	DI/BA		BA	DI/BA	BA	RO/BA	BA	AF/DI		AF	AF	AF/DI	M
		F	C/CS/F		C/F/FP	C	CS/F	F/CS	C/F/FP	F		F	F	F	H
		CH	CH/SE		SE	CH/SE	CH/SE	CH/SE	SE	CH/SE		SE	SE	CH/SE	A
<i>Mazama nana</i>	veado-poca									AF					M
										F					H
										SE					A
<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	veado-campeiro					BA				BA				BA/DI	M
						C				CS				C	H
						CH/SE				SE				CH/SE	A
		51	30	50	17	40	45	45	22	31	10	12	9	37	