


- LEGENDA**
- Poligonal da área da Reserva Legal
 - Localização da Área Degradada
 - Sistema Viário**
 - Caminho
 - Rodovia
 - Hidrografia

SOLOS	SOLO DOMINANTE
RLq	NEOSSOLO LÍTICO Psamítico eutrófico A moderado textura arenosa muito cascalhenta/arenosa cascalhenta fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico léptico epleutrófico A fraco textura arenosa/arenosa fase caatinga hiperxerófica relevo plano + AFLORAMENTO DE ROCHA relevo ondulado e suave ondulado.
RQo1	NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico distrófico A fraco textura arenosa/arenosa muito cascalhenta fase endopedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano.
RQo2	NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico distrófico A fraco textura arenosa/arenosa fase caatinga hiperxerófila relevo plano + NEOSSOLO LÍTICO Psamítico distrófico endoálico A moderado textura arenosa/arenosa fase caatinga hiperxerófila relevo plano + AFLORAMENTO DE ROCHA relevo suave ondulado.
RQo3	NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico endoeutrófico A fraco textura arenosa/arenosa muito cascalhenta fase endopedregosa caatinga hiperxerófila degradada relevo plano + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico epleutrófico A fraco textura arenosa/arenosa fase caatinga hiperxerófila degradada relevo plano.
RQo4	NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico distrófico A fraco textura arenosa/arenosa cascalhenta fase caatinga hiperxerófica relevo suave ondulado + NEOSSOLO LÍTICO Distrófico típico A moderado textura arenosa cascalhenta/média muito cascalhenta fase pedregosa caatinga + AFLORAMENTO DE ROCHA relevo suave ondulado.

Fontes:
Sistema Viário, Hidrografia e Curvas de Nível Cartas DSG do Exército - (Escala: 1:100.000), Limite Municipal e Estadual - IBGE 1999; e Classificação realizada por meio de interpretação de fotografias aéreas fornecidas pela CHESF, com checagem em campo.

SOLOS	Área Degradada	SOLO DOMINANTE
RQo1	NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico endoeutrófico A fraco textura arenosa/arenosa muito cascalhenta fase endopedregosa caatinga hiperxerófila degradada relevo plano.	
RQo2	NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico epleutrófico A fraco textura arenosa/arenosa fase caatinga hiperxerófila degradada relevo plano.	



Projeção Universal Transversa de Mercator
Datum vertical: Henrique Lage - SC
Datum horizontal: Córrego Alegre - CNG - MG
Origem da quilometragem UTM: "Equador e Meridiano 33° w. gr."

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

PLANEJAMENTO EM TRANSPORTE
E CONSULTORIA LTDA

MAPA 09 - SOLO DA ÁREA DEGRADADA E ÁREA DE RESERVA LEGAL - PROJETO BARREIRAS

LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL SOLO E ÁREAS DEGRADADAS DA RESERVA LEGAL E MAPEAMENTO DE VEGETAÇÃO

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS E MONITORAMENTO DA FLORA DAS ÁREAS DA RESERVA LEGAL DOS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO DE ITAPARICA NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DA BOA VISTA, OROCÓ, PETROLÂNDIA E BELÉM DE SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Elaboração: PETCON - PLANEJAMENTO EM TRANSPORTE E CONSULTORIA LTDA

Nº do Contrato: 1-92.2003.6930