


Fontes:
Sistema Viário, Hidrografia e Curvas de Nível Cartas DSG do Exército - (Escala: 1:100.000), Limite Municipal e Estadual - IBGE 1999; e Classificação realizada por meio de interpretação de fotografias aéreas fornecidas pela CHESF, com checagem em campo.

Projeção Universal Transversa de Mercator
Datum vertical: Henrique Lage - SC
Datum horizontal: Córrego Alegre - CNG - MG
Origem da quilometragem UTM: "Equador e Meridiano 33° w. gr."



LEGENDA

Poligonal da área da Reserva Legal

Classes de Solo

Localização da Área Degradada

Sistema Viário

Caminho Rodovia

Hidrografia

SÍMBOLOS	COMPONENTES
LAe 1	LATOSSOLO AMARELO Eutrófico típico A fraco textura arenosa/média fase caatinga hiperxerófila relevo plano.
LAe 2	LATOSSOLO AMARELO Eutrófico típico A fraco textura média/médiamuito cascalhenta fase caatinga hiperxerófila relevo plano.
PAe 1	ARGISSOLO AMARELO Eutrófico plínico Tb A fraco textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano + LUVISSOLO CRÔMICO Órtico planossólico sódico A moderado textura média cascalhenta/argilosa fase pedregosa e rechosa caatinga hiperxerófila relevo plano.
PAe 2	ARGISSOLO AMARELO Eutrófico plínico Tb A fraco textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano + PLANOSSOLO HÁPLICO Órtico típico Ta A moderado textura média/argilosa cascalhenta fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano.
PVAe	ARGISSOLO AMARELO Eutrófico plínico Tb A fraco textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta fase caatinga hiperxerófila relevo plano + ARGISSOLO AMARELO Eutrófico plínico Tb A fraco textura média muito cascalhenta/argilosa cascalhenta fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano.
TCo 1	LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico A moderado textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano.
TCo 2	LUVISSOLO CRÔMICO Órtico planossólico sódico A moderado textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano.
TCo 3	LUVISSOLO CRÔMICO Órtico planossólico sódico A moderado textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo plano.
TCo 4	LUVISSOLO CRÔMICO Órtico planossólico sódico A moderado textura média cascalhenta/argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano.
TCo 5	LUVISSOLO Eutrófico abrupto plínico Tb A moderado textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta fase caatinga hiperxerófila relevo plano + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico Tb A fraco textura média cascalhenta fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano.

SÍMBOLOS	COMPONENTES
SXe 1	PLANOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico Ta A moderado textura média/argilosa cascalhenta fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano + LUVISSOLO CRÔMICO Órtico típico A moderado textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano.
SXe 2	PLANOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico Ta A moderado textura média cascalhenta/argilosa fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo plano + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico léptico A fraco textura média cascalhenta fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano.
SXe 3	PLANOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico Ta A moderado textura média cascalhenta/argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano + PLANOSSOLO NÁTRICO Órtico típico Ta A moderado textura média fase caatinga hiperxerófila relevo plano + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Eutrófico solódico A moderado textura média fase caatinga hiperxerófila relevo plano.
SNo	PLANOSSOLO NÁTRICO Órtico típico Ta A moderado textura média fase caatinga hiperxerófila relevo plano + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Eutrófico solódico A moderado textura média fase caatinga hiperxerófila relevo plano.
CXbe 1	CAMBISSOLO HÁPLICO Eutrófico léptico A fraco textura arenosa/média cascalhenta fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo plano.
CXbe 2	CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico léptico A fraco textura média cascalhenta fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Eutrófico solódico A moderado textura média fase caatinga hiperxerófila relevo plano.
RLe	NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico Tb A moderado textura média cascalhenta/arenosa cascalhenta fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo plano + Afloramentos de Rocha relevo plano.
RUve	NEOSSOLO FLÚVICO Tb Eutrófico solódico A moderado textura média fase caatinga hiperxerófila relevo plano + PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico típico Ta A moderado textura média cascalhenta/argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano.

SÍMBOLOS	Área Degradada	COMPONENTES
TCo	LUVISSOLO Eutrófico abrupto plínico Tb A Moderado textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta fase caatinga hiperxerófila relevo plano.	
RLe1	NEOSSOLO Eutrófico típico Tb a fraco textura média cascalhenta fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano.	
RLe2	NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico Tb A fraco textura média cascalhenta fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico léptico A fraco textura média cascalhenta fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo plano.	

Chesf **PETCON**
Planejamento em Transporte e Consultoria Ltda.

MAPA 10 - SOLO DA ÁREA DEGRADADA E ÁREA DE RESERVA LEGAL - PROJETO BRÍGIDA

LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL SOLO E ÁREAS DEGRADADAS DA RESERVA LEGAL E MAPEAMENTO DE VEGETAÇÃO

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS E MONITORAMENTO DA FLORA DAS ÁREAS DA RESERVA LEGAL DOS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO DE ITAPARICA NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DA BOA VISTA, OROCÓ, PETROLÂNDIA E BELÉM DE SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Elaboração: PETCON - PLANEJAMENTO EM TRANSPORTE E CONSULTORIA LTDA

Nº do Contrato: 1-92.2003.6930