



Convenções Cartográficas

- Sede municipal
- Sede distrital
- Nucleações
- ▲ Aldeia Boa Fé
- Limite municipal
- Via principal
- Via secundária
- ... Outras vias
- Hidrografia
- Massa d'água
- ▲ Cachoeiras
- Eixo
- Reservatório
- AID
- ADA
- Perfil de Solo (AE = Amostra Extra)

Unidades de solo

Latossolos Amarelos

- LVA1 - LATOSOLO AMARELO Distófico típico, textura argilosa e muito argilosa. A moderado, relevo plano e suave ondulado, fase floresta tropical subperenifólia
- LVA2 - LATOSOLO AMARELO Distófico típico, textura argilosa e muito argilosa. A moderado, relevo suave ondulado e plano, fase floresta tropical subperenifólia (Inclusão de LATOSOLO VERMELHO-AMARELO Distófico típico, textura muito argilosa. A moderado, relevo ondulado e forte ondulado)
- LVA3 - LATOSOLO AMARELO Distófico típico, textura argilosa. A moderado, relevo plano e suave ondulado, fase floresta tropical subperenifólia (Inclusão de LATOSOLO VERMELHO-AMARELO Distófico típico, textura argilosa. A moderado, relevo suave ondulado e ondulado)
- LVA4 - LATOSOLO AMARELO Distófico típico, textura muito argilosa. A moderado, relevo ondulado e forte ondulado, fase floresta tropical subperenifólia + LATOSOLO VERMELHO-AMARELO Distófico típico, textura argilosa. A moderado, relevo forte ondulado e ondulado, fase floresta tropical subperenifólia
- LVA5 - LATOSOLO AMARELO Distófico típico, textura argilosa e muito argilosa. A moderado, relevo suave ondulado e ondulado, fase floresta tropical subperenifólia + LATOSOLO VERMELHO-AMARELO Distófico típico, textura argilosa. A moderado, relevo suave ondulado e ondulado, fase floresta tropical subperenifólia (Inclusão de CAMBISOOL HÁPLICO Tb Distófico/latossólico. A moderado, textura argilosa)
- LVA6 - LATOSOLO AMARELO Distófico típico, textura média. A moderado, relevo plano e suave ondulado, fase floresta tropical subperenifólia + NEOSOIL FLÚVICO Psamítico típico. A moderado, relevo plano e suave ondulado.

Latossolos Vermelho-Amarelos

- LVA1 - LATOSOLO VERMELHO-AMARELO Distófico típico, textura argilosa. A moderado, relevo suave ondulado e ondulado, fase floresta tropical subperenifólia + LATOSOLO VERMELHO Distófico típico, textura argilosa. A moderado, relevo suave ondulado e ondulado, fase floresta tropical subperenifólia
- LVA2 - LATOSOLO VERMELHO-AMARELO Distófico típico, textura argilosa. A moderado, relevo ondulado e forte ondulado, fase floresta tropical subperenifólia + LATOSOLO AMARELO Distófico típico, textura muito argilosa. A moderado, relevo ondulado e suave ondulado, fase floresta tropical subperenifólia
- LVA3 - LATOSOLO VERMELHO-AMARELO Distófico típico, textura argilosa. A moderado, relevo forte ondulado, fase floresta tropical subperenifólia + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distófico típico, textura média/argilosa. A moderado, relevo forte ondulado, fases rochosas e floresta tropical subperenifólia

Neossolos Flúvicos

- RYq - NEOSOIL FLÚVICO Psamítico típico. A moderado, relevo plano e suave ondulado + GLEISSOOL HÁPLICO Tb Distófico neofluvisílico, textura indiscriminada, relevo plano, fase floresta tropical hidrófila de várzea (Inclusão de Afioramentos de Rocha)

Eletrobras

CNEC WorleyParsons

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

AHE SÃO LUIZ DO TAPAJÓS

Título

Elaboração

Responsável Técnico

Nº CNEC: 7.4.1.11

Data: Abril/2011