



Convenções Cartográficas

(CH) Cachoeira
 --- Limite estadual
 --- Limite municipal
 --- Curso d'água
 --- Corpo d'água

Legenda

● UHE Santo Antônio
 --- Barragem
 [Red dashed line] Área de Influência Indireta (AII) - Meio Físico

Classes de solos

- Gleissolo Háptico Tb Eutrófico e Distrófico A moderado + Neossolo Flúvico Tb Distrófico A moderado
- Latossolo Amarelo Distrófico
- Latossolo Amarelo Distrófico
- Latossolo Amarelo Distrófico
- Latossolo Amarelo Distrófico + Plintossolo Pétrico Concrecionário
- Latossolo Amarelo Distrófico + Plintossolo Pétrico Concrecionário
- Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico + Argissolo Vermelho-Amarelo
- Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico + Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico + Neossolo Litólico Distrófico
- Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico + Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico + Argissolo Vermelho-Amarelo + Neossolo Litólico Distrófico
- Nitossolo Vermelho Distrófico + Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico
- Argissolo Vermelho-Amarelo + Neossolo Litólico Distrófico
- Neossolo Litólico Distrófico + Latossolo Amarelo Distrófico



Escala Gráfica

0 5 10 15 20
Quilômetros

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

Datum Horizontal: SAD/69
 Origem da quilometragem: Equador e Meridiano -51o. de Gr. acrescidas as constantes 10.000km e 500km, respectivamente.

Referência

- Malha Digital dos Municípios - IBGE, 2005;
- CIM - IBGE, 2001;
- Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) - NASA, 2000;
- Projeto RADAMBRASIL, Dc 70 e 80.

Execução

EcologyBrasil

Cliente

Consórcio
Amapá
 Energia
 ECE Participações s.a.

Projeto

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DA UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI

Título

MAPA DE SOLOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA

Escala: 1:350.000 Data: Dezembro/2008

Mapa nº 2324-00-EIA-DE-2013 Revisão 00