

ROCHOSIDADE - Não aparente

RELEVO LOCAL - Ondulado

REGIONAL - Forte ondulado

EROSÃO - Não aparente

DRENAGEM - Bem drenado

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA -

USO ATUAL - Citricultura e Capoeira

CLIMA - Cfa

DESCRITO E COLETADO POR - Hélio O. da Rocha e I. Scopel

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA

A₁ - 0-9 cm. - bruno-oliváceo (2,5YR4/4 úmido amassado); franco arenoso; granular, muito pequena, fraca; friável; ligeiramente plástica e não pegajoso; transição abrupta e plana

C₁ - 9-27 cm. - bruno-oliváceo-claro (2,5YR 5/6 úmido amassado); franco arenoso; não plástica e não pegajoso; transição abrupta e plana.

R 59-200...

RAÍZES - A₁ abundantes, finas e fasciculadas
C₁ e C₂ raízes médias e raras

PERFIL - RIB. Nº 10 - Descrição Geral

DATA - Maio/89

CLASSIFICAÇÃO - Cambissolo Distrófico A moderado textura ondulado substrato granito

LOCALIZAÇÃO - Ver Mapa de Solos

SITUAÇÃO: DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - trincheira localizada no terço superior da rampa de clacário, sob cobertura de capoeira, 8-20% de declive.

ALTITUDE - 480 m

LITOLOGIA - Carbonato - xisto + mica - xisto

FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Grupo Açungui

PERÍODO - Proterozóico Médio a Superior

MATERIAL ORIGINÁRIO - Granito (rica em mica) - Xistosidade

PEDREGOSIDADE -

ROCHOSIDADE -

RELEVO LOCAL - Ondulado