

3.3.4-1 - Métricas da Paisagem

Quadro 1 - Métricas da Ecologia da Paisagem para a Região de Passagem

Classe	Área da Classe	Total de Área da Classe	Número de Fragmentos das Classes	Tamanho de Fragmentos Médio das Classes	Desvio Padrão do Tamanho de Fragmentos das Classes	Índice de Forma Médio das Classes	Perímetro Total das Classes	Perímetro Médio das Classes	Densidade de Bordas das Classes
	(ha)	(ha)	(n)	(ha)	-	-	(m)	(m)	-
Class*	CA*	TLA*	NumP*	MSP*	PSSD*	MSI*	TE*	MPE*	ED*
Campo cerrado***	1.203,0	114.585,1	37,00	32,51	85,29	2,30	163.377,8	4.415,6	1,43
Campo rupestre***	5.384,3	114.585,1	42,00	128,20	411,60	2,92	598.714,4	14.255,1	5,23
Campo**	4.724,4	114.585,1	159,00	29,71	92,04	2,26	674.355,7	4.241,2	5,89
Cerrado***	617,9	114.585,1	26,00	23,77	21,54	2,20	96.815,5	3.723,7	0,84
Contato Floresta Estacional / Savana**	7.727,1	114.585,1	455,00	16,98	51,93	1,96	1.204.739,2	2.647,8	10,51
Contato Savana / Floresta Estacional***	126,8	114.585,1	4,00	31,69	21,03	1,99	15.745,1	3.936,3	0,14
Floresta estacional Semidecidual montana***	28.088,1	114.585,1	2.482,00	11,32	22,99	2,14	5.996.193,0	2.415,9	52,33
Floresta Estacional Semidecidual**	35.986,6	114.585,1	2.726,00	13,20	51,56	1,96	6.106.009,2	2.239,9	53,29
Floresta Ombrófila Densa**	29.229,9	114.585,1	2.583,00	11,32	33,79	1,87	5.343.931,2	2.068,9	46,64
Formação Arbórea / Arbustiva em Região De Várzea**	1.281,3	114.585,1	244,00	5,25	8,83	2,35	431.752,8	1.769,5	3,77
Savana**	215,8	114.585,1	26,00	8,30	9,32	1,39	33.277,1	1.279,9	0,29

** Da origem inglesa, segundo Crews e Peralvo (2007) e Rutledge (1998).

*** Inventário florestal do Estado de São Paulo (Kronka, 2007) e Mapeamento e *** Inventário da Flora e dos Reflorestamentos de Minas Gerais (Scolforo e Carvalho, 2006),

Quadro 2 - Métricas da Ecologia da Paisagem para a Área de Estudo do Meio Biótico

Classe	Área da Classe	Total de Área da Classe	Número de Fragmentos das Classes	Tamanho de Fragmentos Médio das Classes	Desvio Padrão do Tamanho de Fragmentos das Classes	Índice de Forma Médio das Classes	Perímetro Total das Classes	Perímetro Médio das Classes	Densidade de Bordas das Classes
	(ha)	(ha)	(n)	(ha)	-	-	(m)	(m)	-
Class*	CA*	TLA*	NumP*	MSP*	PSSD*	MSI*	TE*	MPE*	ED*
Campo**	574,72	19.332,52	71,00	8,09	15,34	2,11	127.165,74	1.791,07	6,58
Campo cerrado***	30,09	19.332,52	12,00	2,51	2,93	2,03	12.441,56	1.036,80	0,64
Cerrado***	78,58	19.332,52	13,00	6,04	4,57	2,49	23.847,72	1.834,44	1,23
Contato Floresta Estacional / Savana**	1.745,87	19.332,52	205,00	8,52	33,81	2,35	343.401,59	1.675,13	17,76
Contato Savana / Floresta Estacional***	42,66	19.332,52	6,00	7,11	8,95	2,41	10.067,18	1.677,86	0,52
Floresta Estacional Semidecidual***	6.933,45	19.332,52	1.244,00	5,57	19,71	2,56	1.835.504,05	1.475,49	94,94
Floresta estacional semidecidual montana***	4.497,57	19.332,52	931,00	4,83	9,74	2,27	1.397.936,26	1.501,54	72,31
Floresta Ombrófila Densa**	5.307,21	19.332,52	1.247,00	4,26	11,76	2,38	1.631.340,05	1.308,21	84,38
Formação Arbórea / Arbustiva em Região de Várzea **	99,22	19.332,52	60,00	1,65	2,29	2,59	58.041,06	967,35	3,00

**Da origem inglesa, segundo Crews e Peralvo (2007) e Rutledge (1998).

*** Inventário florestal do Estado de São Paulo (Kronka, 2007) e Mapeamento e *** Inventário da Flora e dos Reflorestamentos de Minas Gerais (Scolforo e Carvalho, 2006),