



Foto 1 - Perfil de Plintossolo Pétrico concrecionário distrófico (FFcd) desenvolvido em relevo suave ondulado de colinas amplas (CA) sob vegetação de cerrado. UTM 485755/0012668



Foto 2 - Relevo suave ondulado de colinas amplas (CA) com vegetação de cerrado e Plintossolo Pétrico concrecionário distrófico. UTM 485755/0012668



Foto 3 - Perfil de Argissolo Amarelo distrófico desenvolvido em relevo suave ondulado de colinas amplas (CA) com vegetação de cerrado associado ao Plintossolo Pétrico concrecionário distrófico. UTM 483326/0026162



Foto 4 - Corte de estrada com Argissolo Amarelo distrófico, desenvolvido em relevo suave ondulado de colinas amplas (CA) sob vegetação de cerrado. UTM 483326/0026162



Foto 5 - Perfil de Argissolo Amarelo distrófico pedregoso em subsuperfície, desenvolvido em relevo suave ondulado de colinas amplas (CA) com vegetação de cerrado. UTM 479070/0025590



Foto 6 - Corte de estrada com Argissolo Amarelo distrófico pedregoso em subsuperfície, desenvolvido em relevo suave ondulado e plano de colinas amplas (CA) sob vegetação de cerrado. UTM 479070/0025590





Foto 7 - Relevo ondulado e suave ondulado de colina com Plintossolo Pétrico concrecionário distrófico nas áreas de borda associados a Argissolo Amarelo distrófico, pouco profundo, com vegetação de campo cerrado no topo das colinas. UTM 467758/0026124.



Foto 8 - Voçoroca em relevo suave ondulado de colina de Argissolo Amarelo distrófico, pouco profundo, com vegetação de campo cerrado, associado com Plintossolo Pétrico concrecionário distrófico. UTM 466625/0025231



Foto 9 - Área de borda das colinas com relevo ondulado e Plintossolo Pétrico concrecionário distrófico associado a Argissolo Amarelo distrófico, pouco profundo, com vegetação de campo cerrado no topo das colinas. UTM 467758/0026124.



Foto 10 - Área de baixada, relevo plano, planície fluvial do rio Maruanum, com Neossolo Flúvico distrófico gleissólico associados com Gleissolos Háplicos Tb distróficos ocupados com pastagem. UTM 463289/0025832.



Foto 11 - Gleissolo Háplico Tb distrófico desenvolvido em relevo plano da planície fluvial ocupado com pastagem. UTM 463289/0025832.



Foto 12 - Área de solo exposto desenvolvido em relevo suave ondulado de colinas amplas com Plintossolo Pétrico concrecionário distrófico utilizados como área de empréstimo. UTM 445344/0019574.



Foto 13 - Área de colinas amplas com relevo suave ondulado e plano, com Plintossolo Pétrico concrecionário distrófico associado à Latossolo Amarelo distrófico, com pastagem. UTM 467758/0026124.



Foto 14 - Corte de estrada em relevo de colina, com Latossolo em superfície e camada de plintita em subsuperfície (plintite), em área de floresta. UTM 437503/0016812



Foto 15 - Corte de estrada em relevo de colina, com Latossolo em superfície e camada de plintita em subsuperfície (plintite), em área de floresta. UTM 437503/0016812.



Foto 16 - Plintossolo Pétrico concrecionário distrófico, com vegetação de floresta desenvolvido em relevo suave ondulado em colinas média e amplas, com vegetação de floresta. UTM 429372/0001175.



Foto 17 - Relevo suave ondulado em colinas amplas com Plintossolo Pétrico concrecionário distrófico, com vegetação de floresta. UTM 429372/0001175



Foto 18 - Área de baixada, relevo plano, Neossolo Quartzarênico hidromórfico associado com Gleissolo Háplico Tb distrófico desenvolvido a partir dos arenitos da Formação Jatapu ocupados com campos naturais. UTM 405517/9961971.





Foto 19 - Área de baixada desenvolvida do arenito Formação Jatapu, de cores esbranquiçadas, com Neossolo Quartzarênico hidromórfico, em relevo plano e ocupados com campos naturais. UTM 405517/9961971



Foto 20 - Área de solos rasos e pedregosos, Neossolo Litólico distrófico, desenvolvido em relevo ondulado, com ocorrência de Afloramentos de Rochas e de rochacidade em superfície. UTM 392882/9963029



Foto 21 - Neossolo Litólico distrófico pedregoso e rochoso em superfície, desenvolvido em relevo ondulado e vegetação de campo cerrado. UTM 392882/9963029



Foto 22 - Relevo de colinas médias, com Plintossolo Pétrico concrecionário distrófico, com vegetação de campo cerrado, desenvolvido em relevo ondulado e forte ondulado. UTM 380927/9961453



Foto 23 - Plintossolo Pétrico concrecionário distrófico, pedregoso, com vegetação de campo cerrado em relevo ondulado e forte ondulado. Ocorrem associados a solos mais rasos, Neossolo Litólicos pedregosos e rochosos. UTM 380927/9961453



Foto 24 - Área de solos rasos, Neossolo Litólicos pedregosos e rochosos, desenvolvidos em relevo plano e com vegetação de campo cerrado. UTM 378088/9949726





Foto 25 - Detalhe da pedregosidade e rochacidade em área de solos rasos com Neossolo Litólicos pedregosos e rochosos, associados a Afloramento de Rochas, desenvolvidos em relevo plano e com vegetação de campo cerrado. UTM 378088/9949726.



Foto 26 - Latossolo Amarelo distrófico, textura média, desenvolvido em relevo suave ondulado e plano, relevo de colinas amplas da formação Alter do Chão. UTM 332053/9908052.



Foto 27 - Detalhe do corte com Latossolo Amarelo distrófico, textura média, desenvolvido em relevo suave ondulado e plano, relevo de colinas amplas da formação Alter do Chão. UTM 332053/9908052.



Foto 28 - Área de baixada alagada, relevo plano, com Gleissolo Háplico Tb distrófico e inclusão de Organossolo, com vegetação de aningas. UTM 328559/9898335.



Foto 29 - Grande área de baixada alagada, relevo plano, com Gleissolo Háplico Tb distrófico e Neossolo Flúvico Tb distrófico, com pastagem. UTM 329485/9896790.



Foto 30 - Ponto de reconhecimento rápido de Latossolo Amarelo distrófico, textura média, desenvolvido em relevo suave ondulado, relevo de colinas amplas da formação Alter do Chão, ocupados com floresta. UTM 324609/9873713.





Foto 31 - Relevo de colinas amplas com Latossolo Amarelo distrófico, textura média, desenvolvido em relevo suave ondulado, formação Alter do Chão. UTM 324609/9873713.



Foto 32 - Perfil de Latossolo Amarelo distrófico, textura média, desenvolvido em relevo suave ondulado, relevo de colinas amplas da formação Alter do Chão, ocupados com floresta. UTM 322977/9853264.



Foto 33 - Relevo de colinas amplas com Latossolo Amarelo distrófico, textura média, desenvolvido em relevo suave ondulado, formação Alter do Chão. UTM 322977/9853264.



Foto 34 - - Relevo de colinas amplas com Latossolo Amarelo distrófico, textura média, desenvolvido em relevo suave ondulado, formação Alter do Chão, vegetação de cerrado. UTM 202661/9827072



Foto 35 - Perfil de Latossolo Amarelo distrófico, textura média, desenvolvido em relevo suave ondulado, relevo de colinas amplas da formação Alter do Chão, ocupados com cerrado/cerrado. UTM 198266/9828924



Foto 36 - Pedreira com exploração de calcário. Solo residual sobreposto sobre as rochas calcárias. UTM 831229/9809246





Foto 37 - Cambissolo Háplico pedregoso, desenvolvido em relevo ondulado e forte ondulado a partir de rochas clacárias. Perfil dentro da pedreira. UTM UTM 831229/9809246.



Foto 38 - Área de solos rasos, Neossolo Litólicos pedregosos e rochosos, com blocos de laterita, desenvolvidos em relevo plano e suave ondulado, com pastagem. UTM 776944/9809327.



Foto 39 - Detalhe dos blocos de lateritas, em Neossolo Litólicos pedregosos e rochosos, desenvolvidos em relevo plano e suave ondulado, com pastagem. Ocorrem plintossolo Pétricos associados. UTM 378088/9949726.



Foto 40 - Nitossolo Vermelho, desenvolvido a partir de diques diabásio, em relevo ondulado. UTM 639341/9830708.



Foto 41 - Baranco com solos vermelhos da classe dos Nitossolo Vermelho, desenvolvido a partir de diques diabásio, em relevo ondulado. UTM 639341/9830708.



Foto 42 - Perfil de Latossolo Amarelo distrófico, textura média, desenvolvido em relevo suave ondulado, relevo de colinas amplas da formação Alter do Chão, ocupados com cerrado. UTM 635506/9815203



Foto 43 - Área de Latossolo Amarelo distrófico, textura média, desenvolvido em relevo suave ondulado, relevo de colinas amplas da formação Alter do Chão, ocupados com cerrado. UTM 198266/9828924.



Foto 44 - Perfil de Neossolo Quartzarênico órtico, desenvolvido em relevo suave ondulado, relevo de colinas amplas da formação Alter do Chão. UTM 631978/9811907



Foto 45 - Área de Neossolo Quartzarênico órtico, desenvolvido em relevo suave ondulado, relevo de colinas amplas da formação Alter do Chão. UTM UTM 631978/9811907.