

## LISTAS DOS GRUPOS ORNITOFAUNA, HERPETOFAUNA E QUIROPTEROFAUNA POR PLATO.

Os levantamentos dos grupos em questão consideraram as fitofisionomias terra firme e igapó para a amostragem, sendo a vegetação de encosta inserida como faixa de transição.

### PLATÔ BELA CRUZ

#### Ornitofauna

Terra firme	Igapó
<i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817) <sup>2</sup>	<i>Pipra serena</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Amazona autumnalis</i> cf. (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup> **
<i>Ara chloroptera</i> Gray, 1859 <sup>1,2</sup>	<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Aratinga leucophthalmus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Ara chloroptera</i> Gray, 1859 <sup>1,2</sup>
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Aratinga leucophthalmus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Automolus infuscatus</i> (Sclater, 1856) <sup>1,2</sup>	<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844) <sup>1,2</sup>
<i>Campephilus rubicollis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Automolus infuscatus</i> (Sclater, 1856) <sup>1,2</sup>
<i>Capito niger</i> Müller, 1776 <sup>1,2</sup>	<i>Basileuterus rivularis</i> (Wied, 1821) <sup>1,2</sup>
<i>Caprimulgus nigrescens</i> Cabanis, 1848 <sup>1</sup>	<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Bucco tamatia</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>
<i>Celeus flavus</i> (P. L. S. Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>
<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845) <sup>1,2</sup>	<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Campephilus rubicollis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857) <sup>1,2</sup>	<i>Campylopterus largipennis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Chaetura spinicauda</i> (Temminck, 1839) <sup>1,2</sup>	<i>Capito niger</i> Müller, 1776 <sup>1,2</sup>
<i>Columba plumbea</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>	<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Columba subvinacea</i> (Lawrence, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Catharus fuscescens</i> (Stephens, 1817) <sup>2</sup>
<i>Conopias parva</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Celeus elegans</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Corapipo gutturalis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup> **	<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845) <sup>1,2</sup>
<i>Corapipo gutturalis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup> **	<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764) <sup>1</sup>
<i>Crypturellus erythropus</i> (Pelzeln, 1863) <sup>1,2</sup>	<i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Columba plumbea</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814) <sup>1,2</sup>	<i>Columba subvinacea</i> (Lawrence, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Conopias parva</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Corapipo gutturalis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup> **
<i>Daptrius americanus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Corapipo gutturalis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup> **
<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Corythopsis torquata</i> Tschudi, 1844 <sup>1,2</sup>
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814) <sup>1,2</sup>
<i>Falco ruficularis</i> Daudin, 1800 <sup>1,2</sup>	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783 <sup>1,2</sup>	<i>Daptrius americanus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Galbula albirostris</i> Latham, 1790 <sup>1,2</sup>	<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Dendrexetastes rufigula</i> (Lesson, 1844) <sup>1,2</sup> **

Continuação

Terra firme	Igapó
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Glyphorynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819) <sup>1,2</sup>	<i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1820) <sup>1,2</sup>
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup> **	<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Heliothryx aurita</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>	<i>Dendrocolaptes picumnus</i> Lichtenstein, 1818 <sup>1</sup>
<i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzelin, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Deropterus accipitrinus</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1</sup>
<i>Herpsilochmus stictocephalus</i> Todd, 1927 <sup>1,2</sup> **	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873 <sup>1,2</sup>	<i>Falco ruficularis</i> Daudin, 1800 <sup>1,2</sup>
<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783 <sup>1,2</sup>
<i>Jacamerops aurea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Galbula albirostris</i> Latham, 1790 <sup>1,2</sup>
<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>	<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Lanio fulvus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Galbula leucogastra</i> Vieillot, 1817 <sup>1</sup> **
<i>Lepidocolaptes albolineatus</i> (Lafresnaye, 1846) <sup>1,2</sup>	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Leucopternis albicollis</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	<i>Glyphorynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819) <sup>1,2</sup>
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820) <sup>1,2</sup>	<i>Heliothryx aurita</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>
<i>Lophotriccus galeatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzelin, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Lophotriccus vitiosus</i> (Bangs & Penard, 1921) <sup>1,2</sup>	<i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i> Pelzelin, 1868 <sup>1,2</sup>
<i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919) <sup>1,2</sup>	<i>Hylexetastes perrotii</i> (Lafresnaye, 1844) <sup>1,2</sup>
<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>	<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873 <sup>1,2</sup>
<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Monasa atra</i> (Boddaert, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Jacamerops aurea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1836) <sup>1,2</sup>	<i>Lanio fulvus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Laniocerca hypopyrrha</i> (Vieillot, 1817) <sup>1</sup>
<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Lepidocolaptes albolineatus</i> (Lafresnaye, 1846) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmothera campanisoma</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Lophotriccus vitiosus</i> (Bangs & Penard, 1921) <sup>1,2</sup>
<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853 <sup>1,2</sup>	<i>Melanerpes cruentatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Penelope jacquacu</i> Spix, 1825 <sup>1</sup>	<i>Microcerculus bambla</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Pernostola rufifrons</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919) <sup>1,2</sup>
<i>Phaethornis bourcierii</i> (Lesson, 1832) <sup>1,2</sup>	<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Monasa atra</i> (Boddaert, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Pionites melanocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Pionopsitta caica</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Pionus fuscus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmothera campanisoma</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>
<i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Platyrinchus platyrinchos</i> (Gmelin, 1788) <sup>1</sup>	<i>Myrmotherula gutturalis</i> Sclater & Salvin, 1881 <sup>1,2</sup>
<i>Psarocolius viridis</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmotherula longipennis</i> Pelzelin, 1868 <sup>1,2</sup>
<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>	<i>Notharchus macrorhynchus</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>

Continuação

Terra firme	Igapó
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Onychorhynchus coronatus</i> (Müller, 1776) <sup>1, 2</sup>
<i>Pyrrhura picta</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853 <sup>1,2</sup>
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>	<i>Pachyrampus marginatus</i> Lichtenstein, 1823 <sup>1</sup>
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823 <sup>1,2</sup>	<i>Percnostola leucostigma</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup> **
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>	<i>Percnostola rufifrons</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827) <sup>1,2</sup>	<i>Phaethornis bourcieri</i> (Lesson, 1832) <sup>1,2</sup>
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Piaya melanogaster</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>
<i>Tangara punctata</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Terenotriccus erythurus</i> (Cabanis, 1847) <sup>1</sup>	<i>Pionites melanocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>	<i>Pionus fuscus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Thamnomanes ardesiacus</i> (Sclater & Salvin, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1867 <sup>1,2</sup>	<i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Thryothorus coraya</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Pipra serena</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822) <sup>1,2</sup>
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Pithys albifrons</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Platyrinchus platyrinchos</i> (Gmelin, 1788) <sup>1</sup>
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831) <sup>1,2</sup>	<i>Psarocolius viridis</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884) <sup>1,2</sup>	<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>
<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838 <sup>1,2</sup>	<i>Pteroglossus viridis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>	<i>Pyrrhura picta</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Querula purpurata</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>	<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>
<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823 <sup>1,2</sup>
<i>Veniliornes cassini</i> (Malherbe, 1862) <sup>1,2</sup>	<i>Ramphotrigon ruficauda</i> (Spix, 1825) <sup>1,2</sup>
<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838) <sup>1,2</sup>	<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>
<i>Xipholena puniacea</i> (Pallas, 1764) <sup>1,2</sup>	<i>Sclerurus rufifigularis</i> Pelzeln, 1869 <sup>1,2</sup>
<i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827) <sup>1,2</sup>
<i>Zimerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1867) <sup>1,2</sup>	<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
	<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800) <sup>1,2</sup>
	<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
	<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
	<i>Tangara punctata</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
	<i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
	<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>
	<i>Thamnomanes ardesiacus</i> (Sclater & Salvin, 1868) <sup>1,2</sup>
	<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820) <sup>1,2</sup>
	<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1867 <sup>1,2</sup>
	<i>Thamnophilus punctatus</i> (Shaw, 1809) <sup>1,2</sup>
	<i>Thryothorus coraya</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
	<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
	<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>

Continuação

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
	<i>Tityra semifasciata</i> (Spix, 1825) <sup>1</sup>
	<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
	<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831) <sup>1,2</sup>
	<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884) <sup>1,2</sup>
	<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838 <sup>1,2</sup>
	<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>
	<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>
	<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>
	<i>Veniliornes cassini</i> (Malherbe, 1862) <sup>1,2</sup>
	<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838) <sup>1,2</sup>
	<i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
	<i>Zimerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1867) <sup>1,2</sup>

### Herpetofauna

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
<i>Allobates femoralis</i>	<i>Allobates femoralis</i>
<i>Ameiva ameiva</i>	<i>Anomologlossus stepheni</i>
<i>Amphisbaena fuliginosa</i>	<i>Chaunus marinus</i>
<i>Arthrosaura reticulata</i>	<i>Cochranella oyampiensis</i>
<i>Atractus schach</i>	<i>Coleodactylus amazonicus</i>
<i>Atractus snethlageae</i>	<i>Dendrophryniscus minutus</i>
<i>Chaunus marinus</i>	<i>Eleutherodactylus zeuctotylus</i>
<i>Coleodactylus amazonicus</i>	<i>Hypsiboas cinereasceus</i>
<i>Gonatodes annularis</i>	<i>Leposoma guianense</i>
<i>Gonatodes humeralis</i>	<i>Leptodactylus andreae</i>
<i>Kentropyx calcarata</i>	<i>Osteocephalus oophagus</i>
<i>Leposoma guianense</i>	<i>Thecadactylus rapicauda</i>
<i>Leptodactylus andreae</i>	
<i>Mabuya nigropunctata</i>	
<i>Mastigodryas boddaerti</i>	
<i>Microceilia taylori</i>	
<i>Rhinatrema bivittatum</i>	
<i>Rhinella gr. margaritifer</i>	
<i>Synapturanus mirandaribeiroi</i>	
<i>Taeniophylus occipitalis</i>	
<i>Thecadactylus rapicauda</i>	
<i>Tretioscincus agilis</i>	

## Quiropterofauna

Terra firme	Igapó
<i>Artibeus gnomus</i> Handley, 1987	<i>Ametrida centurio</i> Gray, 1847
<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	<i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821)
<i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821)	<i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)
<i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)	<i>Carollia brevicauda</i> (Schinz, 1821)
<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Cormura brevirostris</i> Wagner, 1843	<i>Glossophaga soricina</i> Pallas, 1766
<i>Glossophaga soricina</i> Pallas, 1766	<i>Phyllostomus discolor</i> Wagner, 1843
<i>Lophostoma silvicolum</i> d'Orbigny, 1836	<i>Phyllostomus elongatus</i> (E. Geoffroy, 1810)
<i>Phyllostomus discolor</i> Wagner, 1843	<i>Phyllostomus hastatus</i> (Pallas, 1767)
<i>Sturnira tildae</i> de la Torre, 1959	<i>Tonatia saurophylla</i> Koopman e Williams, 1951
<i>Uroderma bilobatum</i> Peters, 1866	<i>Uroderma bilobatum</i> Peters, 1866

## PLATO MONTE BRANCO

### Ornitofauna

Terra firme	Igapó
<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Ara chloroptera</i> Gray, 1859 <sup>1,2</sup>	<i>Ara chloroptera</i> Gray, 1859 <sup>1,2</sup>
<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758) <sup>2</sup>	<i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844) <sup>1,2</sup>
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Automolus infuscatus</i> (Sclater, 1856) <sup>1,2</sup>
<i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844) <sup>1,2</sup>	<i>Basileuterus rivularis</i> (Wied, 1821) <sup>1,2</sup>
<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Bucco tamatia</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>	<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Campephilus rubicollis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Capito niger</i> Müller, 1776 <sup>1,2</sup>	<i>Campephilus rubicollis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Campylopterus largipennis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Cathartes melambrotus</i> Wetmore, 1964 <sup>1,2</sup>	<i>Capito niger</i> Müller, 1776 <sup>1,2</sup>
<i>Celeus flavus</i> (P. L. S. Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845) <sup>1,2</sup>	<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845) <sup>1,2</sup>
<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Celeus undatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>2 **</sup>
<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857) <sup>1,2</sup>	<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857) <sup>1,2</sup>
<i>Chaetura spinicauda</i> (Temminck, 1839) <sup>1,2</sup>	<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764) <sup>1</sup>
<i>Columba plumbea</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>	<i>Columba plumbea</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>
<i>Columba subvinacea</i> (Lawrence, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Columba subvinacea</i> (Lawrence, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Conopias parva</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Corapipo gutturalis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2 **</sup>
<i>Corapipo gutturalis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2 **</sup>	<i>Corythopsis torquata</i> Tschudi, 1844 <sup>1,2</sup>
<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814) <sup>1,2</sup>	<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814) <sup>1,2</sup>
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Cyphorhinus arada</i> (Hermann, 1783) <sup>2</sup>
<i>Daptius americanus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>

Continuação

Terra firme	Igapó
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Daptrius americanus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1820) <sup>1,2</sup>	<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Deconychura stictolaema</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Dendrexetastes rufigula</i> (Lesson, 1844) <sup>1,2</sup> **
<i>Euphonia cayennensis</i> (Gmelin, 1789) <sup>1</sup> **	<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783 <sup>1,2</sup>	<i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1820) <sup>1,2</sup>
<i>Galbula albirostris</i> Latham, 1790 <sup>1,2</sup>	<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Formicarius analis</i> (Lafresnaye & D'Orbigny, 1837) <sup>1</sup>
<i>Glaucidium hardyi</i> Vieilliard, 1989 <sup>1,2</sup>	<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783 <sup>1,2</sup>
<i>Glyphorynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819) <sup>1,2</sup>	<i>Galbula albirostris</i> Latham, 1790 <sup>1,2</sup>
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup> **	<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Gymnopithys rufigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Haematoderus militaris</i> (Shaw, 1792) <sup>1,2</sup>	<i>Glaucidium hardyi</i> Vieilliard, 1989 <sup>1,2</sup>
<i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Glyphorynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819) <sup>1,2</sup>
<i>Herpilochmus stictocephalus</i> Todd, 1927 <sup>1,2</sup> **	<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup> **
<i>Hylexetastes perrotii</i> (Lafresnaye, 1844) <sup>1,2</sup>	<i>Gymnopithys rufigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873 <sup>1,2</sup>	<i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Hylophilus semicinerus</i> Sclater & Salvin, 1867 <sup>2</sup>	<i>Herpilochmus dorsimaculatus</i> Pelzeln, 1868 <sup>1,2</sup>
<i>Hylophylax poecilinota</i> (Cabanis, 1847) <sup>1,2</sup>	<i>Herpilochmus stictocephalus</i> Todd, 1927 <sup>1,2</sup> **
<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Hylexetastes perrotii</i> (Lafresnaye, 1844) <sup>1,2</sup>
<i>Jacamerops aurea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873 <sup>1,2</sup>
<i>Lanio fulvus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Hylophilus ochraceiceps</i> Sclater, 1859 <sup>1</sup>
<i>Laniocerca hypopyrrha</i> (Vieillot, 1817) <sup>1</sup>	<i>Hylophylax poecilinota</i> (Cabanis, 1847) <sup>1,2</sup>
<i>Lepidocolaptes albolineatus</i> (Lafresnaye, 1846) <sup>1,2</sup>	<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Leucopternis albicollis</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	<i>Jacamerops aurea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820) <sup>1,2</sup>	<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>
<i>Lophotriccus vitiosus</i> (Bangs & Penard, 1921) <sup>1,2</sup>	<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820) <sup>1,2</sup>
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1</sup> **	<i>Lophotriccus vitiosus</i> (Bangs & Penard, 1921) <sup>1,2</sup>
<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup> **	<i>Malacoptila fusca</i> (Gmelin, 1788) <sup>2</sup>
<i>Microcerculus bamba</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Microcerculus bamba</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919) <sup>1,2</sup>	<i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919) <sup>1,2</sup>
<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>	<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>
<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1836) <sup>1,2</sup>	<i>Monasa atra</i> (Boddaert, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1836) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmotherula gutturalis</i> Sclater & Salvin, 1881 <sup>1,2</sup>	<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmotherula longipennis</i> Pelzeln, 1868 <sup>1,2</sup>	<i>Percnostola leucostigma</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup> **
<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Percnostola rufifrons</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853 <sup>1,2</sup>	<i>Phaethornis bourcierii</i> (Lesson, 1832) <sup>1,2</sup>
<i>Otus watsonii</i> (Cassin, 1848) <sup>1</sup>	<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789) <sup>1</sup>	<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>

Continuação

Terra firme	Igapó
<i>Passerina cyanoides</i> (Lafresnaye, 1847) <sup>1</sup>	<i>Philydor ruficaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838) <sup>2 **</sup>
<i>Percnostola rufifrons</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Phaethornis bourcieri</i> (Lesson, 1832) <sup>1,2</sup>	<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Pionites melanocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Pionus fuscus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Piaya melanogaster</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>	<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Pionites melanocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Pipra pipra</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Pionopsitta caica</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	<i>Pipra serena</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Pionus fuscus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822) <sup>1,2</sup>
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Pithys albifrons</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Platyrinchus coronatus</i> Sclater, 1858 <sup>1,2</sup>
<i>Pipra pipra</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Psarocolius viridis</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Pithys albifrons</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Pyrrhura picta</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Platyrinchus coronatus</i> Sclater, 1858 <sup>1,2</sup>	<i>Querula purpurata</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Polioptila plumbea</i> (Gmelin, 1788) <sup>2</sup>	<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>
<i>Psarocolius viridis</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823 <sup>1,2</sup>
<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>	<i>Rhynchocyclus olivaceus</i> (Temminck, 1820) <sup>1</sup>
<i>Pteroglossus viridis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>
<i>Pyrrhura picta</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Schiffornis turdinus</i> (Wied, 1831) <sup>1,2</sup>
<i>Querula purpurata</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Sclerurus caudacutus</i> Vieillot, 1816 <sup>1,2</sup>
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>	<i>Sclerurus mexicanus</i> Sclater, 1856 <sup>2</sup>
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823 <sup>1,2</sup>	<i>Sclerurus rufigularis</i> Pelzeln, 1869 <sup>1,2</sup>
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>	<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827) <sup>1,2</sup>
<i>Sclerurus rufigularis</i> Pelzeln, 1869 <sup>1,2</sup>	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827) <sup>1,2</sup>	<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800) <sup>1,2</sup>
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800) <sup>1,2</sup>	<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>
<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Thamnomanes ardesiacus</i> (Sclater & Salvin, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Tangara varia</i> (Statius Muller, 1776) <sup>1,2 **</sup>	<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820) <sup>1,2</sup>
<i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1867 <sup>1,2</sup>
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>	<i>Threnetes leucurus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1 **</sup>
<i>Thamnomanes ardesiacus</i> (Sclater & Salvin, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820) <sup>1,2</sup>	<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1867 <sup>1,2</sup>	<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831) <sup>1,2</sup>
<i>Thryothorus coraya</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884) <sup>1,2</sup>
<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838 <sup>1,2</sup>
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>
<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>
<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884) <sup>1,2</sup>	<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Topaza pella</i> (Linnaeus, 1758) <sup>2</sup>	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>
<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813 <sup>2</sup>	<i>Tyranneutes virescens</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838 <sup>1,2</sup>	<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>

Continuação

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>	<i>Veniliornes cassini</i> (Malherbe, 1862) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>	<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>	<i>Zimerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1867) <sup>1,2</sup>
<i>Tyranneutes virescens</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	
<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	
<i>Veniliornes cassini</i> (Malherbe, 1862) <sup>1,2</sup>	
<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838) <sup>1,2</sup>	
<i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	
<i>Zimerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1867) <sup>1,2</sup>	

Herpetofauna

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
<i>Allobates femoralis</i>	<i>Arthrosaura reticulata</i>
<i>Anolis fuscoauratus</i>	<i>Chaunus marinus</i>
<i>Anomologlossus stepheni</i>	<i>Cochranella oyampiensis</i>
<i>Coleodactylus amazonicus</i>	<i>Dipsas catesbyi</i>
<i>Kentropyx calcarata</i>	<i>Eleutherodactylus fenestratus</i>
<i>Leposoma guianense</i>	<i>Gonatodes humeralis</i>
<i>Leptodactylus andreae</i>	<i>Hypsiboas cinereasceus</i>
<i>Leptotyphlops tenellus</i>	<i>Hypsiboas geographica</i>
<i>Mabuya nigropunctata</i>	<i>Leptodactylus andreae</i>
<i>Pseudogonatodes guianense</i>	<i>Leptodactylus pentadactylus</i>
<i>Pseutes poecilonotus</i>	<i>Mabuya nigropunctata</i>
<i>Ptycoglossus brevifrontalis</i>	<i>Neusticurus rudis</i>
<i>Synapturanus mirandaribeiroi</i>	<i>Osteocephalus oophagus</i>
<i>Taeniophylus brevirostris</i>	<i>Osteocephalus taurinus</i>
<i>Tretioscincus agilis</i>	<i>Rhinella gr. margaritifera</i>
<i>Typhlops reticulatus</i>	<i>Trachycephalus resinifictrix</i>



## Quiropterofauna

Terra firme	Igapó
<i>Artibeus gnomus</i> Handley, 1987	<i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821)
<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	<i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)
<i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821)	<i>Carollia brevicauda</i> (Schinz, 1821)
<i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)	<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phyllostomus elongatus</i> (E. Geoffroy, 1810)
<i>Cormura brevirostris</i> Wagner, 1843	<i>Phyllostomus hastatus</i> (Pallas, 1767)
<i>Desmodus rotundus</i> (E. Geoffroy, 1810)	<i>Sturnira lilium</i> (E. Geoffroy, 1810)
<i>Lophostoma carrikeri</i> (J. A. Allen, 1910)	<i>Tonatia saurophylla</i> Koopman e Williams, 1951
<i>Micronycteris</i> sp. 1	<i>Trachops cirrhosus</i> (Spix, 1823)
<i>Saccopteryx bilineata</i> (Temminck, 1838)	<i>Uroderma bilobatum</i> Peters, 1866
<i>Saccopteryx leptura</i> (Schreber, 1774)	
<i>Sturnira tildae</i> de la Torre, 1959	
<i>Uroderma bilobatum</i> Peters, 1866	
<i>Vampyrum spectrum</i> (Linnaeus, 1758)	

## PLATO GREIG

### Ornitofauna

Terra firme	Igapó
<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788) <sup>1</sup>	<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Ara chloroptera</i> Gray, 1859 <sup>1,2</sup>
<i>Ara chloroptera</i> Gray, 1859 <sup>1,2</sup>	<i>Aratinga leucophthalmus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Aratinga leucophthalmus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Automolus infuscatus</i> (Sclater, 1856) <sup>1,2</sup>	<i>Automolus infuscatus</i> (Sclater, 1856) <sup>1,2</sup>
<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Basileuterus rivularis</i> (Wied, 1821) <sup>1,2</sup>
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Campephilus rubicollis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Capito niger</i> Müller, 1776 <sup>1,2</sup>	<i>Campephilus rubicollis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Caprimulgus nigrescens</i> Cabanis, 1848 <sup>1</sup>	<i>Capito niger</i> Müller, 1776 <sup>1,2</sup>
<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Celeus flavus</i> (P. L. S. Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Celeus flavus</i> (P. L. S. Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845) <sup>1,2</sup>	<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845) <sup>1,2</sup>
<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857) <sup>1,2</sup>	<i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1</sup>	<i>Columba plumbea</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>
<i>Ciccaba huhula</i> Daudin, 1800 <sup>1</sup>	<i>Corapipo gutturalis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup> **
<i>Columba plumbea</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>	<i>Corythopsis torquata</i> Tschudi, 1844 <sup>1,2</sup>
<i>Columba subvinacea</i> (Lawrence, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Crypturellus brevirostris</i> (Pelzelin, 1863) <sup>1,2</sup> **	<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814) <sup>1,2</sup>
<i>Crypturellus erythropus</i> (Pelzelin, 1863) <sup>1,2</sup>	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzelin, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814) <sup>1,2</sup>	<i>Deconychura stictolaema</i> (Pelzelin, 1868) <sup>1,2</sup>

Continuação

Terra firme	Igapó
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1820) <sup>1,2</sup>
<i>Daptrius americanus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Euphonia plumbea</i> Du Bus, 1855 <sup>1</sup>
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783 <sup>1,2</sup>
<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Frederickena viridis</i> (Vieillot, 1816) <sup>1</sup>
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Galbula albirostris</i> Latham, 1790 <sup>1,2</sup>
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758) <sup>2</sup>	<i>Galbula albirostris</i> Latham, 1790 <sup>1,2</sup>
<i>Euphonia plumbea</i> Du Bus, 1855 <sup>1</sup>	<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783 <sup>1,2</sup>	<i>Glaucidium hardyi</i> Vieilliard, 1989 <sup>1,2</sup>
<i>Galbula albirostris</i> Latham, 1790 <sup>1,2</sup>	<i>Glyphorynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819) <sup>1,2</sup>
<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup> **
<i>Glaucidium hardyi</i> Vieilliard, 1989 <sup>1,2</sup>	<i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Glyphorynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819) <sup>1,2</sup>	<i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i> Pelzeln, 1868 <sup>1,2</sup>
<i>Gymnopithys rufigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Hylexetastes perrotii</i> (Lafresnaye, 1844) <sup>1,2</sup>
<i>Harpagus bidentatus</i> (Latham, 1790) <sup>2</sup>	<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873 <sup>1,2</sup>
<i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Hylophilus semicinereus</i> Sclater & Salvin, 1867 <sup>2</sup>
<i>Herpsilochmus stictocephalus</i> Todd, 1927 <sup>1,2</sup> **	<i>Hylophylax poecilnota</i> (Cabanis, 1847) <sup>1,2</sup>
<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873 <sup>1,2</sup>	<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Jacamerops aurea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Jacamerops aurea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>
<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>	<i>Leucopternis albigollis</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>
<i>Laniocerca hypopyrrha</i> (Vieillot, 1817) <sup>1</sup>	<i>Leucopternis melanops</i> (Latham, 1790) <sup>2</sup>
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820) <sup>1,2</sup>	<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820) <sup>1,2</sup>
<i>Lophostrix cristata</i> (Daudin, 1800) <sup>1,2</sup>	<i>Lophostrix cristata</i> (Daudin, 1800) <sup>1,2</sup>
<i>Lophotriccus galeatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Lophotriccus vitiosus</i> (Bangs & Penard, 1921) <sup>1,2</sup>
<i>Micrastur mirandollei</i> (Schegel, 1862) <sup>1</sup>	<i>Melanerpes cruentatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>	<i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919) <sup>1,2</sup>
<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>
<i>Monasa atra</i> (Boddaert, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Monasa atra</i> (Boddaert, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1836) <sup>1,2</sup>
<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmeciza atrothorax</i> (Boddaert, 1783) <sup>1</sup>
<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789) <sup>1</sup>	<i>Myrmothera campanisoma</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Otus watsonii</i> (Cassin, 1848) <sup>1</sup>	<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>
<i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789) <sup>1</sup>	<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Passerina cyanoides</i> (Lafresnaye, 1847) <sup>1</sup>	<i>Myrmotherula gutturalis</i> Sclater & Salvin, 1881 <sup>1,2</sup>
<i>Penelope jacquacu</i> Spix, 1825 <sup>1</sup>	<i>Myrmotherula longipennis</i> Pelzeln, 1868 <sup>1,2</sup>
<i>Percnostola rufifrons</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Phaethornis bourcieri</i> (Lesson, 1832) <sup>1,2</sup>	<i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789) <sup>1</sup>
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Onychorhynchus coronatus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853 <sup>1,2</sup>
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Penelope jacquacu</i> Spix, 1825 <sup>1</sup>
<i>Piaya melanogaster</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>	<i>Percnostola leucostigma</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup> **

Continuação

Terra firme	Igapó
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Pernostola rufifrons</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Pionites melanocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Phaethornis bourcierii</i> (Lesson, 1832) <sup>1,2</sup>
<i>Pionopsitta caica</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Pionus fuscus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Philydor erythrocerus</i> (Pelzeln, 1859) <sup>1,2</sup>
<i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Philydor pyrrhodes</i> (Cabanis, 1848) <sup>1,2</sup>
<i>Pipra pipra</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822) <sup>1,2</sup>	<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Pithys albifrons</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Pionites melanocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Psarocolius viridis</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Pionus fuscus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>	<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Pteroglossus viridis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Pyrrhura picta</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Pipra pipra</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Querula purpurata</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822) <sup>1,2</sup>
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>	<i>Pithys albifrons</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823 <sup>1,2</sup>	<i>Platyrinchus saturatus</i> Salvin & Godman, 1882 <sup>1,2</sup>
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>	<i>Psarocolius viridis</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827) <sup>1,2</sup>	<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Pteroglossus viridis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>
<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Pyrrhura picta</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Querula purpurata</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>
<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1867 <sup>1,2</sup>	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823 <sup>1,2</sup>
<i>Thryothorus coraya</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>
<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Schiffornis turdinus</i> (Wied, 1831) <sup>1,2</sup>
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827) <sup>1,2</sup>
<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831) <sup>1,2</sup>	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884) <sup>1,2</sup>	<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838 <sup>1,2</sup>	<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>	<i>Tangara punctata</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>	<i>Thamnomanes ardesiacus</i> (Sclater & Salvin, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Tyranneutes virescens</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820) <sup>1,2</sup>
<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1867 <sup>1,2</sup>
<i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821) <sup>1</sup>	<i>Thryothorus coraya</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838) <sup>1,2</sup>	<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Xipholena puniacea</i> (Pallas, 1764) <sup>1,2</sup>	<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831) <sup>1,2</sup>
<i>Zimerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1867) <sup>1,2</sup>	<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884) <sup>1,2</sup>
	<i>Touit purpurata</i> (Gmelin, 1788) <sup>1</sup>
	<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838 <sup>1,2</sup>
	<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>
	<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>
	<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>

Continuação

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>
	<i>Tyranneutes virescens</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
	<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>
	<i>Veniliornes cassini</i> (Malherbe, 1862) <sup>1,2</sup>
	<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838) <sup>1,2</sup>
	<i>Xipholena puniacea</i> (Pallas, 1764) <sup>1,2</sup>
	<i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
	<i>Zimerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1867) <sup>1,2</sup>

## Herpetofauna

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
<i>Allobates femoralis</i>	<i>Alopoglossus angulatus</i>
<i>Ameiva ameiva</i>	<i>Chaunus marinus</i>
<i>Anolis nitens crysolepis</i>	<i>Cochranella oyampiensis</i>
<i>Anomaloglossus stepheni</i>	<i>Dendrophryniscus minutus</i>
<i>Atractus schach</i>	<i>Eleutherodactylus zeuctotylus</i>
<i>Atractus snethlageae</i>	<i>Hypsiboas cinereasceus</i>
<i>Chaunus marinus</i>	<i>Hypsiboas geographica</i>
<i>Coleodactylus amazonicus</i>	<i>Hypsiboas geographica</i>
<i>Dipsas catesbyi</i>	<i>Leptodactylus andreae</i>
<i>Eleutherodactylus fenestratus</i>	<i>Leptodactylus pentadactylus</i>
<i>Gonatodes annularis</i>	<i>Leptodactylus petersii</i>
<i>Gonatodes humeralis</i>	<i>Osteocephalus leprieuri</i>
<i>Iphisa elegans</i>	<i>Osteocephalus oophagus</i>
<i>Kentropyx calcarata</i>	<i>Rhinella gr. margaritifera</i>
<i>Leposoma guianense</i>	<i>Uranoscodon superciliosus</i>
<i>Leptodactylus andreae</i>	
<i>Leptotyphlops tenellus</i>	
<i>Mabuya nigropunctata</i>	
<i>Plica plica</i>	
<i>Synapturanus mirandaribeiroi</i>	
<i>Thecadactylus rapicauda</i>	
<i>Tretioscincus agilis</i>	
<i>Uracentron azureum</i>	
<i>Xenodon rabdocephalus</i>	

## Quiropterofauna

Terra firme	Igapó
<i>Anoura caudifer</i> (E. Geoffroy, 1818)	<i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821)
<i>Artibeus aff. glaucus</i> Thomas, 1893	<i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)
<i>Artibeus gnomus</i> Handley, 1987	<i>Carollia brevicauda</i> (Schinz, 1821)
<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821)	<i>Glossophaga soricina</i> Pallas, 1766
<i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)	<i>Phyllostomus discolor</i> Wagner, 1843
<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phyllostomus elongatus</i> (E. Geoffroy, 1810)
<i>Glossophaga soricina</i> Pallas, 1766	<i>Phyllostomus hastatus</i> (Pallas, 1767)
<i>Lonchophylla aff. mordax</i> Thomas, 1903	<i>Sturnira lilium</i> (E. Geoffroy, 1810)
<i>Lophostoma silvicolium</i> d'Orbigny, 1836	<i>Tonatia saurophylla</i> Koopman e Williams, 1951
<i>Micronycteris</i> sp. 2	<i>Uroderma bilobatum</i> Peters, 1866
<i>Mimon crenulatum</i> (E. Geoffroy, 1803)	
<i>Phyllostomus discolor</i> Wagner, 1843	
<i>Saccopteryx bilineata</i> (Temminck, 1838)	
<i>Sturnira tildae</i> de la Torre, 1959	
<i>Uroderma bilobatum</i> Peters, 1866	

## PLATO ARAMÃ

### Ornitofauna

Terra firme	Igapó
<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Amazona autumnalis</i> cf. (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup> **	<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Ara chloroptera</i> Gray, 1859 <sup>1,2</sup>
<i>Ara chloroptera</i> Gray, 1859 <sup>1,2</sup>	<i>Aratinga leucophthalmus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Aratinga leucophthalmus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844) <sup>1,2</sup>
<i>Automolus infuscatus</i> (Sclater, 1856) <sup>1,2</sup>	<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>
<i>Buteo platypterus</i> (Vieillot, 1823) <sup>1</sup> **	<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Campephilus rubicollis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Campephilus rubicollis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Campylopterus largipennis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Capito niger</i> Müller, 1776 <sup>1,2</sup>	<i>Capito niger</i> Müller, 1776 <sup>1,2</sup>
<i>Caprimulgus nigrescens</i> Cabanis, 1848 <sup>1</sup>	<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845) <sup>1,2</sup>
<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845) <sup>1,2</sup>	<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857) <sup>1,2</sup>
<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764) <sup>1</sup>
<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857) <sup>1,2</sup>	<i>Columba plumbea</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>
<i>Columba plumbea</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>	<i>Columba subvinacea</i> (Lawrence, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Conopias parva</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Conopias parva</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Corythopsis torquata</i> Tschudi, 1844 <sup>1,2</sup>
<i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1</sup>	<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Crypturellus erythropus</i> (Pelzeln, 1863) <sup>1,2</sup>	<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>

Continuação

Terra firme	Igapó
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Cyanicterus cyanicterus</i> cf. (Vieillot, 1819) <sup>1 **</sup>
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814) <sup>1,2</sup>	<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814) <sup>1,2</sup>
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Daptius americanus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783 <sup>1,2</sup>
<i>Euphonia chrysopasta</i> Sclater & Salvin, 1869 <sup>1,2</sup>	<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Euphonia minuta</i> Cabanis, 1849 <sup>1,2</sup>	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783 <sup>1,2</sup>	<i>Glaucidium hardyi</i> Vieilliard, 1989 <sup>1,2</sup>
<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819) <sup>1,2</sup>
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Gymnopithys rufigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Glaucidium hardyi</i> Vieilliard, 1989 <sup>1,2</sup>	<i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819) <sup>1,2</sup>	<i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i> Pelzeln, 1868 <sup>1,2</sup>
<i>Gymnopithys rufigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Herpsilochmus stictocephalus</i> Todd, 1927 <sup>1,2 **</sup>
<i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873 <sup>1,2</sup>
<i>Herpsilochmus stictocephalus</i> Todd, 1927 <sup>1,2 **</sup>	<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873 <sup>1,2</sup>	<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>
<i>Hylophylax poecilinota</i> (Cabanis, 1847) <sup>1,2</sup>	<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820) <sup>1,2</sup>
<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Lophotrix cristata</i> (Daudin, 1800) <sup>1,2</sup>
<i>Jacamerops aurea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Lophotriccus galeatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>	<i>Lophotriccus vitiosus</i> (Bangs & Penard, 1921) <sup>1,2</sup>
<i>Leucopternis albicollis</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	<i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919) <sup>1,2</sup>
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820) <sup>1,2</sup>	<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>
<i>Lophotrix cristata</i> (Daudin, 1800) <sup>1,2</sup>	<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Lophotriccus galeatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Monasa atra</i> (Boddaert, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Lophotriccus vitiosus</i> (Bangs & Penard, 1921) <sup>1,2</sup>	<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>	<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1836) <sup>1,2</sup>
<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Monasa atra</i> (Boddaert, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1836) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmothera campanisoma</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>
<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Onychorhynchus coronatus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmothera campanisoma</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Percnostola leucostigma</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2 **</sup>
<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Percnostola rufifrons</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Onychorhynchus coronatus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Phaethornis bourcierii</i> (Lesson, 1832) <sup>1,2</sup>
<i>Penelope jacquacu</i> Spix, 1825 <sup>1</sup>	<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Percnostola rufifrons</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Phaethornis bourcierii</i> (Lesson, 1832) <sup>1,2</sup>	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Piaya melanogaster</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>
<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Pionites melanocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Pionus fuscus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>

Continuação

Terra firme	Igapó
<i>Pionites melanocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Pipra pipra</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Pionopsitta caica</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	<i>Psarocolius viridis</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Pionus fuscus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>
<i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Pyrrhura picta</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Pipra pipra</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Querula purpurata</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822) <sup>1,2</sup>	<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>
<i>Platyrinchus platyrinchos</i> (Gmelin, 1788) <sup>1</sup>	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823 <sup>1,2</sup>
<i>Psarocolius viridis</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Ramphotrigon ruficauda</i> (Spix, 1825) <sup>1,2</sup>
<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>	<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>
<i>Pteroglossus viridis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Schiffornis turdinus</i> (Wied, 1831) <sup>1,2</sup>
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	<i>Sclerurus ruficularis</i> Pelzeln, 1869 <sup>1,2</sup>
<i>Pyrrhura picta</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827) <sup>1,2</sup>
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>	<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823 <sup>1,2</sup>	<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>	<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Schiffornis turdinus</i> (Wied, 1831) <sup>1,2</sup>	<i>Tangara chilensis</i> (Vigors, 1832) <sup>1</sup>
<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827) <sup>1,2</sup>	<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Thamnomanes ardesiacus</i> (Sclater & Salvin, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820) <sup>1,2</sup>
<i>Tangara punctata</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1867 <sup>1,2</sup>
<i>Tangara varia</i> (Statius Muller, 1776) <sup>1,2</sup> **	<i>Thryothorus coraya</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>	<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1867 <sup>1,2</sup>	<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831) <sup>1,2</sup>
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1821) <sup>2</sup>	<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884) <sup>1,2</sup>
<i>Thryothorus coraya</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838 <sup>1,2</sup>
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>
<i>Todirostrum pictum</i> Salvin, 1897 <sup>1,2</sup>	<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>
<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831) <sup>1,2</sup>	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>
<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884) <sup>1,2</sup>	<i>Tyranneutes virescens</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838 <sup>1,2</sup>	<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>	<i>Veniliornes cassini</i> (Malherbe, 1862) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838) <sup>1,2</sup>
<i>Tyranneutes virescens</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Xipholena puniacea</i> (Pallas, 1764) <sup>1,2</sup>
<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	<i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Veniliornes cassini</i> (Malherbe, 1862) <sup>1,2</sup>	<i>Zimerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1867) <sup>1,2</sup>
<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838) <sup>1,2</sup>	
<i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	
<i>Zimerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1867) <sup>1,2</sup>	

## Herpetofauna

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
<i>Allobates femoralis</i>	<i>Anomologlossus stepheni</i>
<i>Ameiva ameiva</i>	<i>Anolis fuscoauratus</i>
<i>Anolis nitens crysolepis</i>	<i>Caiman</i> cf. <i>crocodilus</i>
<i>Arthrosaura reticulata</i>	<i>Chaunus marinus</i>
<i>Chaunus marinus</i>	<i>Cochranella oyampiensis</i>
<i>Cochranella oyampiensis</i>	<i>Corallus hortulanus</i>
<i>Coleodactylus amazonicus</i>	<i>Eleutherodactylus fenestratus</i>
<i>Eleutherodactylus zeuctotylus</i>	<i>Eleutherodactylus zeuctotylus</i>
<i>Geochelonia denticulata</i>	<i>Epicrates cenchria</i>
<i>Gonatodes annularis</i>	<i>Geochelonia denticulata</i>
<i>Hypsiboas cinereasceus</i>	<i>Hypsiboas boans</i>
<i>Iphisa elegans</i>	<i>Hypsiboas cinereasceus</i>
<i>Kentropyx calcarata</i>	<i>Hypsiboas geographica</i>
<i>Leposoma guianense</i>	<i>Hypsiboas wavrini</i>
<i>Leptodactylus andreae</i>	<i>Leptodactylus andreae</i>
<i>Leptodactylus petersii</i>	<i>Leptodactylus pentadactylus</i>
<i>Leptotyphlops tenellus</i>	<i>Leptodactylus petersii</i>
<i>Plica plica</i>	<i>Osteocephalus oophagus</i>
<i>Scinax</i> aff. <i>ruber</i>	<i>Osteocephalus taurinus</i>
<i>Synapturanus mirandaribeiroi</i>	<i>Paleosuchus</i> cf. <i>trigonatus</i>
<i>Tretioscincus agilis</i>	<i>Plica plica</i>
	<i>Pseudoboa coronata</i>
	<i>Rhinella</i> gr. <i>margaritifer</i>
	<i>Rhinemys rufipes</i>
	<i>Scinax</i> aff. <i>ruber</i>
	<i>Scinax garbei</i>
	<i>Syphlophis compressus</i>
	<i>Thecadactylus rapicauda</i>
	<i>Trachycephalus resinifictrix</i>
	<i>Uranoscodon superciliosus</i>

## Quiropteroфаuna

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
<i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821)	<i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821)
<i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)	<i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)
<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Carollia brevicauda</i> (Schinz, 1821)
<i>Eptesicus</i> aff. <i>brasiliensis</i> (Desmarest, 1819)	<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Glossophaga soricina</i> Pallas, 1766	<i>Eptesicus</i> aff. <i>brasiliensis</i> (Desmarest, 1819)
<i>Myotis riparius</i> Handley, 1960	<i>Glossophaga soricina</i> Pallas, 1766
<i>Myotis</i> sp.1	<i>Phyllostomus discolor</i> Wagner, 1843
<i>Phyllostomus discolor</i> Wagner, 1843	<i>Phyllostomus elongatus</i> (E. Geoffroy, 1810)
<i>Sturnira tildae</i> de la Torre, 1959	<i>Phyllostomus hastatus</i> (Pallas, 1767)
	<i>Tonatia saurophylla</i> Koopman e Williams, 1951
	<i>Trachops cirrhosus</i> (Spix, 1823)



## PLATO TEÓFILO

### Ornitofauna

<i>Terra firme</i>	<i>Igapó</i>
<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Ara chloroptera</i> Gray, 1859 <sup>1,2</sup>	<i>Ara chloroptera</i> Gray, 1859 <sup>1,2</sup>
<i>Aratinga leucophthalmus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Aratinga leucophthalmus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844) <sup>1,2</sup>	<i>Automolus ochrolaemus</i> (Tschudi, 1844) <sup>1,2</sup>
<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Automolus infuscatus</i> (Sclater, 1856) <sup>1,2</sup>
<i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>	<i>Basileuterus rivularis</i> (Wied, 1821) <sup>1,2</sup>
<i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Basileuterus rivularis</i> (Wied, 1821) <sup>1,2</sup>
<i>Campylopterus largipennis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Capito niger</i> Müller, 1776 <sup>1,2</sup>	<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Celeus flavus</i> (P. L. S. Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Campylopterus largipennis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845) <sup>1,2</sup>	<i>Capito niger</i> Müller, 1776 <sup>1,2</sup>
<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857) <sup>1,2</sup>	<i>Catharus fuscescens</i> (Stephens, 1817) <sup>2</sup>
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1</sup>	<i>Celeus elegans</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Columba plumbea</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>	<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845) <sup>1,2</sup>
<i>Conopias parva</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Corapipo gutturalis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup> **	<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857) <sup>1,2</sup>
<i>Corythopsis torquata</i> Tschudi, 1844 <sup>1,2</sup>	<i>Cercomacra tyrannina</i> (Sclater, 1835) <sup>1,2</sup>
<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1</sup>
<i>Crypturellus erythropus</i> (Pelzeln, 1863) <sup>1,2</sup>	<i>Columba plumbea</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783) <sup>2</sup>	<i>Columba subvinacea</i> (Lawrence, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Conopias parva</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814) <sup>1,2</sup>	<i>Corythopsis torquata</i> Tschudi, 1844 <sup>1,2</sup>
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Crypturellus brevirostris</i> (Pelzeln, 1863) <sup>1,2</sup> **
<i>Daptrius americanus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814) <sup>1,2</sup>
<i>Deconychura stictolaema</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1820) <sup>1,2</sup>	<i>Daptrius americanus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Deconychura stictolaema</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758) <sup>2</sup>	<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Euphonia plumbea</i> Du Bus, 1855 <sup>1</sup>	<i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1820) <sup>1,2</sup>
<i>Falco ruficularis</i> Daudin, 1800 <sup>1,2</sup>	<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783 <sup>1,2</sup>	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Euphonia plumbea</i> Du Bus, 1855 <sup>1</sup>
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783 <sup>1,2</sup>
<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819) <sup>1,2</sup>	<i>Galbula albirostris</i> Latham, 1790 <sup>1,2</sup>

Continuação

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
<i>Gymnopithys rufigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Herpsilochmus stictocephalus</i> Todd, 1927 <sup>1,2</sup> **	<i>Glaucidium hardyi</i> Vieillard, 1989 <sup>1,2</sup>
<i>Hylexetastes perrotii</i> (Lafresnaye, 1844) <sup>1,2</sup>	<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819) <sup>1,2</sup>
<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873 <sup>1,2</sup>	<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup> **
<i>Hylophylax poecilinota</i> (Cabanis, 1847) <sup>1,2</sup>	<i>Gymnopithys rufigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Heliathyrx aurita</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>
<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>	<i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Laniocerca hypopyrrha</i> (Vieillot, 1817) <sup>1</sup>	<i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i> Pelzeln, 1868 <sup>1,2</sup>
<i>Lepidocolaptes albolineatus</i> (Lafresnaye, 1846) <sup>1,2</sup>	<i>Herpsilochmus stictocephalus</i> Todd, 1927 <sup>1,2</sup> **
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820) <sup>1,2</sup>	<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873 <sup>1,2</sup>
<i>Lophotrix cristata</i> (Daudin, 1800) <sup>1,2</sup>	<i>Hylophylax poecilinota</i> (Cabanis, 1847) <sup>1,2</sup>
<i>Lophotriccus galeatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Lophotriccus vitiosus</i> (Bangs & Penard, 1921) <sup>1,2</sup>	<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1</sup> **	<i>Laniocerca hypopyrrha</i> (Vieillot, 1817) <sup>1</sup>
<i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919) <sup>1,2</sup>	<i>Lepidocolaptes albolineatus</i> (Lafresnaye, 1846) <sup>1,2</sup>
<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>	<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820) <sup>1,2</sup>
<i>Monasa atra</i> (Boddaert, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Lophotrix cristata</i> (Daudin, 1800) <sup>1,2</sup>
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Lophotriccus vitiosus</i> (Bangs & Penard, 1921) <sup>1,2</sup>
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1836) <sup>1,2</sup>	<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1</sup> **
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup> **
<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Microcerculus bambla</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>	<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmotherula gutturalis</i> Sclater & Salvin, 1881 <sup>1,2</sup>	<i>Monasa atra</i> (Boddaert, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Otus watsonii</i> (Cassin, 1848) <sup>1</sup>	<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Passerina cyanooides</i> (Lafresnaye, 1847) <sup>1</sup>	<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1836) <sup>1,2</sup>
<i>Penelope jacquacu</i> Spix, 1825 <sup>1</sup>	<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Percnostola rufifrons</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Phaethornis bourcierii</i> (Lesson, 1832) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmothera campanisoma</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmotherula gutturalis</i> Sclater & Salvin, 1881 <sup>1,2</sup>
<i>Piaya melanogaster</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmotherula longipennis</i> Pelzeln, 1868 <sup>1,2</sup>
<i>Piaya melanogaster</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Notharchus macrorhynchus</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Pachyramphus surinamus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>2</sup> **
<i>Pionites melanocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Percnostola rufifrons</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Pionopsitta caica</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	<i>Phaethornis bourcierii</i> (Lesson, 1832) <sup>1,2</sup>
<i>Pionus fuscus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Philydor erythrocerus</i> (Pelzeln, 1859) <sup>1,2</sup>
<i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Philydor pyrrhodes</i> (Cabanis, 1848) <sup>1,2</sup>
<i>Pipra pipra</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Pipra serena</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>

Continuação

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822) <sup>1,2</sup>	<i>Pionites melanocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Pithys albifrons</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Pionopsitta caica</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>
<i>Platyrinchus coronatus</i> Sclater, 1858 <sup>1,2</sup>	<i>Pionus fuscus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Psarocolius viridis</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Pteroglossus viridis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Pipra pipra</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Pyrrhura picta</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822) <sup>1,2</sup>
<i>Querula purpurata</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Pithys albifrons</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>	<i>Psarocolius viridis</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823 <sup>1,2</sup>	<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>	<i>Pyrrhura picta</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Sclerurus caudacutus</i> Vieillot, 1816 <sup>1,2</sup>	<i>Querula purpurata</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827) <sup>1,2</sup>	<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823 <sup>1,2</sup>
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Ramphotrigon ruficauda</i> (Spix, 1825) <sup>1,2</sup>
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Rhynchocyclus olivaceus</i> (Temminck, 1820) <sup>1</sup>
<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>
<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Schiffornis turdinus</i> (Wied, 1831) <sup>1,2</sup>
<i>Tangara punctata</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Sclerurus ruficularis</i> Pelzeln, 1869 <sup>1,2</sup>
<i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827) <sup>1,2</sup>
<i>Terenura spodioptila</i> Sclater & Salvin, 1881 <sup>1,2</sup>	<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Thamnomanes ardesiacus</i> (Sclater & Salvin, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820) <sup>1,2</sup>	<i>Tachyphonus phoenicius</i> Swainson, 1838 <sup>1</sup>
<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1867 <sup>1,2</sup>	<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Thryothorus coraya</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Tangara chilensis</i> (Vigors, 1832) <sup>1</sup>
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Todirostrum pictum</i> Salvin, 1897 <sup>1,2</sup>	<i>Tangara punctata</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884) <sup>1,2</sup>	<i>Terenura spodioptila</i> Sclater & Salvin, 1881 <sup>1,2</sup>
<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838 <sup>1,2</sup>	<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>	<i>Thamnomanes ardesiacus</i> (Sclater & Salvin, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>	<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1867 <sup>1,2</sup>
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>	<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Tyranneutes virescens</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Thryothorus coraya</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Veniliornes cassini</i> (Malherbe, 1862) <sup>1,2</sup>	<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884) <sup>1,2</sup>
<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838) <sup>1,2</sup>	<i>Touit purpurata</i> (Gmelin, 1788) <sup>1</sup>
<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788) <sup>1</sup>	<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838 <sup>1,2</sup>
<i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>
<i>Zimerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1867) <sup>1,2</sup>	<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>
	<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>
	<i>Tyranneutes virescens</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
	<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>
	<i>Veniliornes cassini</i> (Malherbe, 1862) <sup>1,2</sup>

Continuação

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
	<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838) <sup>1,2</sup>
	<i>Xipholena puniacea</i> (Pallas, 1764) <sup>1,2</sup>
	<i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
	<i>Zimerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1867) <sup>1,2</sup>

Herpetofauna

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
<i>Allobates femoralis</i>	<i>Dendrophryniscus minutus</i>
<i>Anolis fuscoauratus</i>	<i>Eleutherodactylus fenestratus</i>
<i>Anolis nitens crysolepis</i>	<i>Geochelonia denticulata</i>
<i>Arthrosaura reticulata</i>	<i>Gonatodes humeralis</i>
<i>Atractus schach</i>	<i>Hypsiboas cinereasceus</i>
<i>Chaunus marinus</i>	<i>Hypsiboas geographica</i>
<i>Chironius multiventris</i>	<i>Leptodactylus andreae</i>
<i>Coleodactylus amazonicus</i>	<i>Osteocephalus leprieuri</i>
<i>Geochelonia denticulata</i>	<i>Osteocephalus oophagus</i>
<i>Gonatodes humeralis</i>	<i>Scinax aff. ruber</i>
<i>Kentropyx calcarata</i>	
<i>Leposoma guianense</i>	
<i>Leptodactylus andreae</i>	
<i>Leptotyphlops tenellus</i>	
<i>Liophis reginae</i>	
<i>Plica plica</i>	
<i>Rhinella gr. margaritifera</i>	
<i>Synapturanus mirandaribeiroi</i>	
<i>Taeniophylus occipitalis</i>	
<i>Taeniophylus occipitalis</i>	
<i>Thecadactylus rapicauda</i>	
<i>Tretioscincus agilis</i>	
<i>Typhlops reticulatus</i>	

Quiropteroфаuna

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
<i>Artibeus gnomus</i> Handley, 1987	<i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821)
<i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821)	<i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)
<i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)	<i>Carollia brevicauda</i> (Schinz, 1821)
<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Eptesicus aff. brasiliensis</i> (Desmarest, 1819)	<i>Eptesicus aff. brasiliensis</i> (Desmarest, 1819)
<i>Eptesicus aff. fuscus</i> (Beauvois, 1796)	<i>Glossophaga soricina</i> Pallas, 1766
<i>Glossophaga soricina</i> Pallas, 1766	<i>Phyllostomus discolor</i> Wagner, 1843
<i>Lophostoma silvicolum</i> d'Orbigny, 1836	<i>Phyllostomus elongatus</i> (E. Geoffroy, 1810)
<i>Phyllostomus discolor</i> Wagner, 1843	<i>Phyllostomus hastatus</i> (Pallas, 1767)
<i>Sturnira</i> sp. 1	<i>Tonatia saurophylla</i> Koopman e Williams, 1951

Continuação

Terra firme	Igapó
<i>Sturnira tildae</i> de la Torre, 1959	
<i>Thyroptera tricolor</i> Spix, 1823	
<i>Vampyressa aff. brocki</i> Peterson, 1968	

## PLATO CIPÓ

### Ornitofauna

Terra firme	Igapó
<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Pipra serena</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Amazona autumnalis</i> cf. (Linnaeus, 1758) <sup>1,2 **</sup>	<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Ara chloroptera</i> Gray, 1859 <sup>1,2</sup>	<i>Ara chloroptera</i> Gray, 1859 <sup>1,2</sup>
<i>Ara chloroptera</i> Gray, 1859 <sup>1,2</sup>	<i>Aratinga leucophthalmus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758) <sup>2</sup>	<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Aratinga leucophthalmus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Automulus infuscatus</i> (Sclater, 1856) <sup>1,2</sup>
<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783) <sup>1</sup>	<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Campephilus rubicollis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>	<i>Capito niger</i> Müller, 1776 <sup>1,2</sup>
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Campephilus rubicollis</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845) <sup>1,2</sup>
<i>Capito niger</i> Müller, 1776 <sup>1,2</sup>	<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857) <sup>1,2</sup>
<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Columba plumbea</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>
<i>Celeus flavus</i> (P. L. S. Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Columba subvinacea</i> (Lawrence, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Celeus grammicus</i> (Natterer & Malherbe, 1845) <sup>1,2</sup>	<i>Conopias parva</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Corapipo gutturalis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2 **</sup>
<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857) <sup>1,2</sup>	<i>Corythopsis torquata</i> Tschudi, 1844 <sup>1,2</sup>
<i>Columba plumbea</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>	<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Columba subvinacea</i> (Lawrence, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783) <sup>2</sup>
<i>Conopias parva</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Corapipo gutturalis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2 **</sup>	<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814) <sup>1,2</sup>
<i>Corythopsis torquata</i> Tschudi, 1844 <sup>1,2</sup>	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Daptrius americanus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1</sup>	<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Cyanerpes nitidus</i> (Hartlaub, 1847) <sup>2</sup>	<i>Deconychura stictolaema</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814) <sup>1,2</sup>	<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1820) <sup>1,2</sup>
<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Daptrius americanus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783 <sup>1,2</sup>
<i>Dendrexetastes rufigula</i> (Lesson, 1844) <sup>1,2 **</sup>	<i>Galbula albirostris</i> Latham, 1790 <sup>1,2</sup>
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Dendrocincla merula</i> (Lichtenstein, 1820) <sup>1,2</sup>	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Glaucidium hardyi</i> Vieillard, 1989 <sup>1,2</sup>

Continuação

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
<i>Deroptus accipitrinus</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1</sup>	<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819) <sup>1,2</sup>
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Gymnopathys rufigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Euphonia minuta</i> Cabanis, 1849 <sup>1,2</sup>	<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1</sup>
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783 <sup>1,2</sup>	<i>Heliiothryx aurita</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>
<i>Galbula albirostris</i> Latham, 1790 <sup>1,2</sup>	<i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i> Pelzeln, 1868 <sup>1,2</sup>
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Herpsilochmus stictocephalus</i> Todd, 1927 <sup>1,2</sup> **
<i>Glaucis hirsuta</i> (Gmelin, 1788) <sup>2</sup>	<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873 <sup>1,2</sup>
<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819) <sup>1,2</sup>	<i>Hylophilus semicinereus</i> Sclater & Salvin, 1867 <sup>2</sup>
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup> **	<i>Hylophylax poecilinota</i> (Cabanis, 1847) <sup>1,2</sup>
<i>Gymnopathys rufigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Hemitriccus zosterops</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Jacamerops aurea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i> Pelzeln, 1868 <sup>1,2</sup>	<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>
<i>Herpsilochmus stictocephalus</i> Todd, 1927 <sup>1,2</sup> **	<i>Lanio fulvus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Hylexetastes perrotii</i> (Lafresnaye, 1844) <sup>1,2</sup>	<i>Laniocerca hypopyrrha</i> (Vieillot, 1817) <sup>1</sup>
<i>Hylophilus muscicapinus</i> Sclater & Salvin, 1873 <sup>1,2</sup>	<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820) <sup>1,2</sup>
<i>Hylophilus ochraceiceps</i> Sclater, 1859 <sup>1</sup>	<i>Lophotriccus galeatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Lophotriccus vitiosus</i> (Bangs & Penard, 1921) <sup>1,2</sup>
<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>	<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup> **
<i>Lanio fulvus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Microcerculus bambla</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Lepidocolaptes albolineatus</i> (Lafresnaye, 1846) <sup>1,2</sup>	<i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919) <sup>1,2</sup>
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820) <sup>1,2</sup>	<i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>
<i>Lophostrix cristata</i> (Daudin, 1800) <sup>1,2</sup>	<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Lophotriccus galeatus</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Lophotriccus vitiosus</i> (Bangs & Penard, 1921) <sup>1,2</sup>	<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919) <sup>1,2</sup>	<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1836) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmothera campanisoma</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmornis torquata</i> (Boddaert, 1783) <sup>1</sup> **	<i>Myrmotherula guttata</i> (Vieillot, 1825) <sup>1</sup>
<i>Myrmothera campanisoma</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmotherula longipennis</i> Pelzeln, 1868 <sup>1,2</sup>
<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>
<i>Myrmotherula gutturalis</i> Sclater & Salvin, 1881 <sup>1,2</sup>	<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853 <sup>1,2</sup>
<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837) <sup>1,2</sup>	<i>Otus watsonii</i> (Cassin, 1848) <sup>1</sup>
<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853 <sup>1,2</sup>	<i>Pachyramphus surinamus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>2</sup> **
<i>Orthopsittaca manilata</i> (Boddaert, 1783) <sup>2</sup>	<i>Percnostola leucostigma</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup> **
<i>Otus watsonii</i> (Cassin, 1848) <sup>1</sup>	<i>Percnostola rufifrons</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Penelope jacquacu</i> Spix, 1825 <sup>1</sup>	<i>Phaethornis bourcierii</i> (Lesson, 1832) <sup>1,2</sup>
<i>Percnostola leucostigma</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup> **	<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Percnostola rufifrons</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Phaethornis bourcierii</i> (Lesson, 1832) <sup>1,2</sup>	<i>Philydor erythrocerus</i> (Pelzeln, 1859) <sup>1,2</sup>
<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Philydor pyrrhodes</i> (Cabanis, 1848) <sup>1,2</sup>
<i>Philydor erythrocerus</i> (Pelzeln, 1859) <sup>1,2</sup>	<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>

Continuação

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783) <sup>1,2</sup>	<i>Pionites melanocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Pionites melanocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Pionus fuscus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Pionopsitta caica</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Pionus fuscus</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Pipra pipra</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>
<i>Pipra erythrocephala</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Pithys albifrons</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Pipra pipra</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Pitylus grossus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Pithys albifrons</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Platyrinchus saturatus</i> Salvin & Godman, 1882 <sup>1,2</sup>
<i>Psarocolius viridis</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Psarocolius viridis</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>	<i>Pteroglossus viridis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Pyrrhura picta</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Pteroglossus viridis</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Querula purpurata</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>
<i>Pyrrhura picta</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823 <sup>1,2</sup>
<i>Querula purpurata</i> (Müller, 1776) <sup>1,2</sup>	<i>Ramphotrigon ruficauda</i> (Spix, 1825) <sup>1,2</sup>
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758 <sup>1,2</sup>	<i>Rhynchocyclus olivaceus</i> (Temminck, 1820) <sup>1</sup>
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823 <sup>1,2</sup>	<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>
<i>Ramphotrigon ruficauda</i> (Spix, 1825) <sup>1,2</sup>	<i>Schiffornis turdinus</i> (Wied, 1831) <sup>1,2</sup>
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823) <sup>1,2</sup>	<i>Sclerurus caudacutus</i> Vieillot, 1816 <sup>1,2</sup>
<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758) <sup>2</sup>	<i>Sclerurus ruficularis</i> Pelzeln, 1869 <sup>1,2</sup>
<i>Schiffornis turdinus</i> (Wied, 1831) <sup>1,2</sup>	<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827) <sup>1,2</sup>
<i>Sclerurus caudacutus</i> Vieillot, 1816 <sup>1,2</sup>	<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Sclerurus ruficularis</i> Pelzeln, 1869 <sup>1,2</sup>	<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800) <sup>1,2</sup>
<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827) <sup>1,2</sup>	<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>
<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Thamnomanes ardesiacus</i> (Sclater & Salvin, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Tangara chilensis</i> (Vigors, 1832) <sup>1</sup>	<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820) <sup>1,2</sup>
<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1867 <sup>1,2</sup>
<i>Tangara punctata</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Tangara varia</i> (Statius Muller, 1776) <sup>1,2</sup> **	<i>Thryothorus coraya</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>
<i>Tangara velia</i> (Linnaeus, 1758) <sup>1,2</sup>	<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>
<i>Terenura spodioptila</i> Sclater & Salvin, 1881 <sup>1,2</sup>	<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884) <sup>1,2</sup>
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788) <sup>1,2</sup>	<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838 <sup>1,2</sup>
<i>Thamnophilus murinus</i> Sclater & Salvin, 1867 <sup>1,2</sup>	<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>
<i>Thryothorus coraya</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766) <sup>1,2</sup>	<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>
<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789) <sup>1,2</sup>	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>
<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	<i>Tyranneutes virescens</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>
<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884) <sup>1,2</sup>	<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>
<i>Touit purpurata</i> (Gmelin, 1788) <sup>1</sup>	<i>Veniliornes cassini</i> (Malherbe, 1862) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838 <sup>1,2</sup>	<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>	<i>Xipholena puniacea</i> (Pallas, 1764) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788 <sup>1,2</sup>	<i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766 <sup>1,2</sup>	<i>Zimerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1867) <sup>1,2</sup>
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818 <sup>1,2</sup>	

Continuação

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
<i>Tyranneutes virescens</i> (Pelzeln, 1868) <sup>1,2</sup>	
<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790) <sup>1,2</sup>	
<i>Veniliornes cassini</i> (Malherbe, 1862) <sup>1,2</sup>	
<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838) <sup>1,2</sup>	
<i>Xipholena puniacea</i> (Pallas, 1764) <sup>1,2</sup>	
<i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818) <sup>1,2</sup>	
<i>Zimerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1867) <sup>1,2</sup>	

Herpetofauna

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
<i>Allobates femoralis</i>	<i>Coleodactylus amazonicus</i>
<i>Ameiva ameiva</i>	<i>Eleutherodactylus fenestratus</i>
<i>Anolis fuscoauratus</i>	<i>Eleutherodactylus zeuctotylus</i>
<i>Atractus schach</i>	<i>Leptodactylus andreae</i>
<i>Bachia flavescens</i>	<i>Leptodeira annulata</i>
<i>Bothrops atrox</i>	<i>Paleosuchus</i> cf. <i>trigonatus</i>
<i>Chaunus marinus</i>	<i>Rhinella</i> gr. <i>margaritifer</i>
<i>Coleodactylus amazonicus</i>	
<i>Dendrophidium dendrophis</i>	
<i>Eleutherodactylus fenestratus</i>	
<i>Gonatodes humeralis</i>	
<i>Kentropyx calcarata</i>	
<i>Leposoma guianense</i>	
<i>Leptodactylus andreae</i>	
<i>Leptotyphlops tenellus</i>	
<i>Liophis reginae</i>	
<i>Plica plica</i>	
<i>Pseudogonatodes guianense</i>	
<i>Rhinatrema bivittatum</i>	
<i>Synapturanus mirandaribeiroi</i>	
<i>Thecadactylus rapicauda</i>	

Quiropteroфаuna

<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
<i>Artibeus gnomus</i> Handley, 1987	<i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821)
<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	<i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)
<i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821)	<i>Carollia brevicauda</i> (Schinz, 1821)
<i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)	<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phyllostomus discolor</i> Wagner, 1843
<i>Chrotopterus auritus</i> (Peters, 1856)	<i>Phyllostomus elongatus</i> (E. Geoffroy, 1810)
<i>Glyphonycteris</i> aff. <i>sylvestris</i> Thomas, 1896	<i>Phyllostomus hastatus</i> (Pallas, 1767)
<i>Lonchophylla</i> aff. <i>mordax</i> Thomas, 1903	<i>Platyrrhinus helleri</i> (Peters, 1866)
<i>Phyllostomus discolor</i> Wagner, 1843	<i>Tonatia saurophylla</i> Koopman e Williams, 1951



<b>Terra firme</b>	<b>Igapó</b>
<i>Rhinophylla aff. pumilio</i> Peters, 1865	<i>Uroderma bilobatum</i> Peters, 1866
<i>Sturnira tildae</i> de la Torre, 1959	
<i>Uroderma bilobatum</i> Peters, 1866	
<i>Vampyressa bidens</i> (Dobson, 1878)	