

ANEXO 10.XV
LISTA DE ESPÉCIES - AVIFAUNA

ANEXO 10.XV_A

ESPÉCIES DE AVES REGISTRADAS NA ÁREA DE ENTORNO E ÁREA
DIRETAMENTE AFETADA DURANTE OS ESTUDOS DA AVIFAUNA DO
PROJETO ALEMÃO

Táxons	Nome popular	Hábito Alimentar	Senst.	Tipologia	Reg.
Tinamiformes Huxley, 1872					
Tinamidae Gray, 1840					
<i>Tinamus tao</i> Temminck, 1815	azulona	ONI	A	FASR	S;GR
<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-de-cabeça-vermelha	ONI	M	FASR	S;GR
<i>Tinamus guttatus</i> Pelzeln, 1863	inhambu-galinha	ONI	A	FDM;FAS;FASR	S;GR
<i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-preto	ONI	B	FASR	S;GR
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	tururim	ONI	B	FDM;FAS;FASR	S;GR
<i>Crypturellus strigulosus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-relógio	ONI	A	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR	S;GR
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-anhangá	ONI	A	FDM;FASR	S;GR
<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	inhambu-chororó	ONI	B	FDS	S
Anseriformes Linnaeus, 1758					
Anatidae Leach, 1820					
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato	ONI	M	ANT	V;FT
Galliformes Linnaeus, 1758					
Cracidae Rafinesque, 1815					
<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	jacupemba	FRU	M	FDM;FDS;FASR;ANT	V
<i>Penelope pileata</i> Wagler, 1830	jacupiranga	FRU	A	FDS	V
<i>Aburria kujubi</i> (Pelzeln, 1858)	cujubi	FRU	A	FDM	V
<i>Pauxi tuberosum</i> (Spix, 1825)	mutum-cavalo	FRU	A	FASR	V;CT
<i>Crax fasciolata</i> Spix, 1825	mutum-de-penacho	FRU	M	FDM;FDS;FAS;FASR	S;V;GR
Odontophoridae Gould, 1844					
<i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	uru-corcovado	FRU	A	FDM;FDS;FASR	S;GR;T
Podicipediformes Fürbringer, 1888					
Podicipedidae Bonaparte, 1831					
<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	mergúhã-pequeno	CAR	M	ANT;AQU	V
Pelecaniformes Sharpe, 1891					
Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849					
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	CAR	M	FASR;ANT;AQU	V
Anhingidae Reichenbach, 1849					
<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga	CAR	M	ANT;AQU	V

Legenda: Tipologia: FDM - Floresta ombrófila densa montana; FDMS - Floresta ombrófila densa montana secundária; FDS - Floresta ombrófila densa montana secundária; FAS - Floresta ombrófila aberta submontana; FASR - Floresta ombrófila aberta submontana ribeirinha; ANT - antrópico; AQU - aquático; Sensibilidade: A - alta sensibilidade; M - média sensibilidade; B - baixa sensibilidade; Hábito Alimentar: ONI: onívora; INS - insetívora; GRA: granívora; NEC: nectarívora; CAR: carnívora; FRU: frugívora; Tipo de Registro: V - visual; S - sonoro; GR - Gravação; FT - fotografia; C - coleta; R - rede de neblina; CT - armadilha fotográfica

Táxons	Nome popular	Hábito Alimentar	Senst.	Tipologia	Reg.
Ciconiiformes Bonaparte, 1854					
Ardeidae Leach, 1820					
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	CAR	B	ANT;AQU	V
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	CAR	B	ANT;AQU	V
Cathartiformes Seebohm, 1890					
Cathartidae Lafresnaye, 1839					
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	CAR	B	FAS	V
<i>Cathartes melambrotus</i> Wetmore, 1964	urubu-da-mata	CAR	M	FAS;FASR;ANT	V;FT
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	CAR	B	FDM;FDS;FAS;FASR;ANT	V
<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-rei	CAR	M	FAS	V
Falconiformes Bonaparte, 1831					
Accipitridae Vigors, 1824					
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura	INS	M	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR	V;FT
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi	INS	M	FDM;FDS;FAS;FASR;ANT	V
<i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817)	gavião-bombachinha-grande	CAR	M	FDM	S
<i>Leucopternis schistaceus</i> (Sundevall, 1851)	gavião-azul	CAR	A	FAS	V
<i>Leucopternis albicollis</i> (Latham, 1790)	gavião-branco	CAR	A	FDM;FAS	V;FT
<i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	gavião-preto	CAR	M	FASR	V
<i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790)	gavião-pedrês	CAR	M	FDM;FDS;FAS;FASR	V;GR
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta	CAR	M	FDM;FAS;FASR	V
<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-real	CAR	A	FDM;FAS;FASR	V;FT
<i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-pato	CAR	A	FAS	V;FT
<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	gavião-de-penacho	CAR	M	FDM;FASR	V;S
Falconidae Leach, 1820					
<i>Ibycter americanus</i> (Boddaert, 1783)	gralhão	CAR	A	FDM	V;S;FT
<i>Herpethotes cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acaúã	CAR	B	FDS;FAS;FASR	V;S
<i>Micrastur mintoni</i> Whittaker, 2002	falcão-críptico	CAR	A	FDM;FAS;FASR	S;GR;R
<i>Micrastur mirandollei</i> (Schlegel, 1862)	tanatau	CAR	M	FDM;FDS;FAS	S;GR
<i>Falco rufigularis</i> Daudin, 1800	cauré	CAR	B	FDM;FASR	V;FT
Gruiformes Bonaparte, 1854					
Rallidae Rafinesque, 1815					
<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes	ONI	A	FASR;ANT	V;S;FT
<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda	ONI	B	FASR	S;GR
<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	sanã-do-capim	ONI	B	ANT	S;GR

Continua...

...continuação

Táxons	Nome popular	Hábito Alimentar	Senst.	Tipologia	Reg.
Heliornithidae Gray, 1840					
<i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)	picaparra	ONI	M	ANT;AQU	V
Charadriiformes Huxley, 1867					
Charadriidae Leach, 1820					
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	ONI	B	FDMS;ANT	V;S
Scolopacidae Rafinesque, 1815					
<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela	ONI	B	ANT	V;FT
Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854					
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	ONI	B	ANT	V;S
Sternidae Vigors, 1825					
<i>Sternula superciliaris</i> (Vieillot, 1819)	trinta-réis-anão	ONI	A	ANT;AQU	V
Columbiformes Latham, 1790					
Columbidae Leach, 1820					
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	GRA	B	FDMS;FAS;FASR	V
<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	pararu-azul	FRU	B	FDM;FAS;FASR	S;GR
<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal	FRU	M	FAS;FASR	V;S;GR
<i>Patagioenas subvinacea</i> (Lawrence, 1868)	pomba-botafogo	FRU	A	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR	V;S;GR
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	FRU	B	FDMS;FDS;FASR	S;GR;R
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemedeira	FRU	M	FDM;FDS;FAS;FASR	S;GR;R
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri	FRU	M	FDM;FDMS;FAS;FASR	S;GR;R
Psittaciformes Wagler, 1830					
Psittacidae Rafinesque, 1815					
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> (Latham, 1790)	arara-azul-grande	FRU	A	FDM;FASR	V;S;GR;FT
<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)	araracanga	FRU	M	FDM;FASR	V;S;GR
<i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859	arara-vermelha-grande	FRU	A	FDM;FAS;FASR	V;S;GR;FT
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã	FRU	B	FDS;FAS;FASR	V;S
<i>Aratinga jandaya</i> (Gmelin, 1788)	jandaia-verdadeira	FRU	M	FDM;FDMS;FDS;FASR	V;S;GR;FT
<i>Pyrrhura amazonum</i> Hellmayr, 1906	tiriba-de-hellmayr	FRU	M	FDM;FDS;FASR;ANT	V;S;GR;C
<i>Brotogeris chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766)	periquito-de-asa-dourada	FRU	M	FDM;FDS;FASR	V;S;GR
<i>Pyrilia vulturina</i> (Kuhl, 1820)	curica-urubu	FRU	A	FDM	S;GR
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766)	maitaca-de-cabeça-azul	FRU	B	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR;ANT	V;S;GR
<i>Amazona ochrocephala</i> (Gmelin, 1788)	papagaio-campeiro	FRU	M	FDM;FDS;FASR	V;S;GR
Opisthocomiformes Sclater, 1880					
Opisthocomidae Swainson, 1837					

Continua...

...continuação

Táxons	Nome popular	Hábito Alimentar	Senst.	Tipologia	Reg.
<i>Opisthocomus hoazin</i> (Statius Muller, 1776)	cigana	ONI	M	FASR	V;FT
Cuculiformes Wagler, 1830					
Cuculidae Leach, 1820					
<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado	INS	B	FASR;ANT	V
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	INS	B	FDM;FAS;FASR;ANT	V;S
<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	anu-coroca	INS	M	FASR;ANT	V
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	INS	B	FDM;FDS;FAS;FASR	V;S
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci	INS	B	FAS	S
Strigiformes Wagler, 1830					
Tytonidae Mathews, 1912					
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja	CAR	B	ANT	V;S
Strigidae Leach, 1820					
<i>Lophostrix cristata</i> (Daudin, 1800)	coruja-de-crista	CAR	A	FASR	S;GR
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	murucututu	CAR	M	FDMS	S
<i>Strix virgata</i> (Cassin, 1849)	coruja-do-mato	CAR	M	FASR	V
<i>Glaucidium hardyi</i> Vieillard, 1990	caburé-da-amazônia	CAR	A	FAS;FASR	S;GR
<i>Rhinoptynx clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CAR	B	ANT	S
Caprimulgiformes Ridgway, 1881					
Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851					
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua	INS	B	FDM	S
Caprimulgidae Vigors, 1825					
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju	INS	M	FASR	S;GR
<i>Chordeiles sp</i>		INS	?	FASR	V
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau	INS	B	FASR	S
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i> (Tschudi, 1844)	bacurau-ocelado	INS	M	FASR	S;GR
<i>Caprimulgus sericocaudatus</i> (Cassin, 1849)	bacurau-rabo-de-seda	INS	M	FAS;FASR	S;GR
<i>Caprimulgus parvulus</i> Gould, 1837	bacurau-chintã	INS	B	ANT	S
<i>Caprimulgus nigrescens</i> Cabanis, 1848	bacurau-de-lajeado	INS	M	FAS;FASR	S;FT;C
Apodiformes Peters, 1940					
Apodidae Olphe-Galliard, 1887					
<i>Chaetura spinicaudus</i> (Temminck, 1839)	andorinhão-de-sobre-branco	INS	B	FDMS	V
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	INS	B	FDS	V;S
<i>Chaetura brachyura</i> (Jardine, 1846)	andorinhão-de-rabo-curto	INS	B	FDM	V
Trochilidae Vigors, 1825					

Continua...

...continuação

Táxons	Nome popular	Hábito Alimentar	Senst.	Tipologia	Reg.
<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-bico-torto	NEC	B	FASR	FT;R;C
<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	rabo-branco-rubro	NEC	M	FDM;FDS;FAS;FASR	V;R;C;FT
<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	rabo-branco-de-bigodes	NEC	A	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR;ANT	V;R;C;FT
<i>Campylopterus largipennis</i> (Boddaert, 1783)	asa-de-sabre-cinza	NEC	M	FASR;ANT	V;R;C;FT
<i>Florisuga mellivora</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-azul-de-rabo-branco	NEC	B	FASR	V
<i>Chlorestes notata</i> (Reich, 1793)	beija-flor-de-garganta-azul	NEC	B	FDM	FT;R;C
<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura-verde	NEC	M	FDM;FAS;FASR	V;R;C;FT
<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde	NEC	B	FDM;	V
<i>Heliodytes auritus</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-bochecha-azul	NEC	M	FDM;FAS;FASR	V
Trogoniformes A. O. U., 1886					
Trogonidae Lesson, 1828					
<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838	surucuá-de-cauda-preta	FRU	M	FDM;FAS;FASR	V
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	surucuá-grande-de-barriga-amarela	FRU	M	FDM;FAS;FASR	V;S;GR
<i>Trogon violaceus</i> Gmelin, 1788	surucuá-pequeno	FRU	M	FAS;FASR	V;S;GR;FT
Coraciiformes Forbes, 1844					
Alcedinidae Rafinesque, 1815					
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno	CAR	B	FASR;ANT;AQU	V
<i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-da-mata	CAR	M	FASR	V;R
Momotidae Gray, 1840					
<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766)	udu-de-coroa-azul	ONI	M	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR	V;S;R
Galbuliformes Fürbringer, 1888					
Galbulidae Vigors, 1825					
<i>Brachygalba lugubris</i> (Swainson, 1838)	ariramba-preta	INS	B	FASR	V;S;C
<i>Galbula cyanicollis</i> Cassin, 1851	ariramba-da-mata	INS	A	FDM;FDS;FASR	V;R;C;FT
<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816	ariramba-de-cauda-ruiva	INS	B	FAS;FASR	V;S;R;FT
<i>Jacamerops aureus</i> (Statius Muller, 1776)	jacamaracu	INS	A	FDM;	S
Bucconidae Horsfield, 1821					
<i>Notharchus tectus</i> (Boddaert, 1783)	macuru-pintado	INS	M	FAS;FASR	V;C
<i>Nystalus striolatus</i> (Pelzeln, 1856)	rapazinho-estriado	INS	M	FASR	S
<i>Malacoptila rufa</i> (Spix, 1824)	barbudo-de-pescoço-ferrugem	INS	A	FDM;FASR	V;S;R;FT
<i>Monasa morphoeus</i> (Hahn & Küster, 1823)	chora-chuva-de-cara-branca	INS	A	FAS;FASR	V;S;GR;C
<i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782)	urubuzinho	INS	B	FDM;FAS;FASR	V
Piciformes Meyer & Wolf, 1810					

Continua...

...continuação

Táxons	Nome popular	Hábito Alimentar	Senst.	Tipologia	Reg.
Ramphastidae Vigors, 1825					
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	tucano-grande-de-papo-branco	ONI	A	FDM;FDS;FAS;FASR;ANT	V;S;GR
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	ONI	A	FDM;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;R
<i>Pteroglossus inscriptus</i> Swainson, 1822	araçari-miudinho-de-bico-riscado	ONI	M	FDM;FASR	V;R;C;FT
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)	araçari-de-bico-branco	ONI	M	FDM;FDS;FAS;FASR	V;S
Picidae Leach, 1820					
<i>Picumnus aurifrons</i> Pelzeln, 1870	pica-pau-anão-dourado	INS	M	FAS;FASR	V
<i>Melanerpes cruentatus</i> (Boddaert, 1783)	benedito-de-testa-vermelha	INS	B	FDM;FASR	V;S;GR
<i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821)	picapauzinho-avermelhado	INS	M	FDS;FASR	V
<i>Piculus leucolaemus</i> (Natterer & Malherbe, 1845)	pica-pau-de-garganta-branca	INS	A	FASR;ANT	V;S;GR
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-bufador	INS	A	FDMS	V;S;GR
<i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-dourado-escuro	INS	M	FAS	V
<i>Celeus undatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-barrado	INS	A	FAS;FASR	V;S;GR
<i>Celeus elegans</i> (Statius Muller, 1776)	pica-pau-chocolate	INS	M	FDM;FAS;FASR	V
<i>Celeus flavus</i> (Statius Muller, 1776)	pica-pau-amarelo	INS	M	FASR	V
<i>Celeus torquatus</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-coleira	INS	A	FDM;	V;S;GR
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	INS	B	FDM;FDS;FAS;FASR;ANT	V;S
<i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-de-barriga-vermelha	INS	M	FDM;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;R
<i>Campephilus melanoleucos</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-topete-vermelho	INS	M	FASR	S
Passeriformes Linné, 1758					
Thamnophilidae Swainson, 1824					
<i>Cymbilaimus lineatus</i> (Leach, 1814)	papa-formiga-barrado	INS	M	FDM;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;C
<i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816)	choró-boi	INS	B	FDM;FDS;FASR	S;GR
<i>Thamnophilus schistaceus</i> d'Orbigny, 1835	choca-de-oho-vermelho	INS	A	FAS;FASR	S;GR;FT;R;C
<i>Thamnophilus stictocephalus</i> Pelzeln, 1868	choca-de-natterer	INS	B	FDM;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Thamnophilus aethiops</i> Sclater, 1858	choca-lisa	INS	A	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR	FT;R;C
<i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820)	ipeçuá	INS	A	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Epinecrophylla leucophthalma</i> Todd, 1927	choquinha-de-olho-branco	INS	A	FDM;FDS	V;S;GR;FT;R;C
<i>Epinecrophylla ornata</i> Sclater, 1853	choquinha-ornada	INS	A	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Myrmotherula brachyura</i> (Hermann, 1783)	choquinha-miúda	INS	B	FDM;FAS;FASR	V;S;GR
<i>Myrmotherula sclateri</i> Sneath, 1912	choquinha-de-garganta-amarela	INS	M	FASR	V;S
<i>Myrmotherula multostriata</i> Sclater, 1858	choquinha-estriada-da-amazônia	INS	?	FAS;FASR	V;S;GR
<i>Myrmotherula hauxwelli</i> (Sclater, 1857)	choquinha-de-garganta-clara	INS	A	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	choquinha-de-flanco-branco	INS	M	FASR	V;S;GR;FT;R;C

Continua...

...continuação

Táxons	Nome popular	Hábito Alimentar	Senst.	Tipologia	Reg.
<i>Myrmotherula longipennis</i> Pelzeln, 1868	choquinha-de-asa-comprida	INS	A	FDM;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Myrmotherula menetriesii</i> (d'Orbigny, 1837)	choquinha-de-garganta-cinza	INS	A	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha	INS	M	FDM	V;S;GR
<i>Cercomacra cinerascens</i> (Sclater, 1857)	chororó-pocua	INS	A	FDM;FDS;FAS;FASR	V;S;GR
<i>Cercomacra nigrescens</i> (Cabanis & Heine, 1859)	chororó-negro	INS	M	FASR	V;S;GR
<i>Cercomacra manu</i> Fitzpatrick & Willard, 1990	chororó-de-manu	INS	M	FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Pyriglena leuconota</i> (Spix, 1824)	papa-taoca	INS	M	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Myrmoborus leucophrys</i> (Tschudi, 1844)	papa-formiga-de-sobrancelha	INS	M	FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Myrmoborus myotherinus</i> (Spix, 1825)	formigueiro-de-cara-preta	INS	A	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Hypocnemis striata</i> (Spix, 1825)	papa-formiga-cantador	INS	M	FDM;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Hypocnemoides maculicauda</i> (Pelzeln, 1868)	solta-asa	INS	M	FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Sclateria naevia</i> (Gmelin, 1788)	papa-formiga-do-igarapé	INS	M	FASR	FT;R;C
<i>Schistocichla rufifacies</i> (Hellmayr, 1929)	formigueiro-de-asa-pintada	INS	A	FASR	V;S;GR
<i>Myrmornis torquata</i> (Boddaert, 1783)	pinto-do-mato-carijó	INS	A	FDM;FASR	S;GR;FT;R;C
<i>Hylophylax naevius</i> (Gmelin, 1789)	guarda-floresta	INS	A	FASR	V;S;FT;R;C
<i>Hylophylax punctulatus</i> (Des Murs, 1856)	guarda-várzea	INS	M	FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Willisornis poecilinotus</i> (Cabanis, 1847)	rendadinho	INS	M	FDM;FDMS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Phlegopsis nigromaculata</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	mãe-de-taoca	INS	M	FDM;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
Conopophagidae Sclater & Salvin, 1873					
<i>Conopophaga aurita</i> (Gmelin, 1789)	chupa-dente-de-cinta	INS	A	FDM;FAS;	FT;R;C
<i>Conopophaga melanogaster</i> Ménétriès, 1835	chupa-dente-grande	INS	A	FDMS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
Grallariidae Sclater & Salvin, 1873					
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu	INS	A	FDM;FDS;FAS;FASR	S;GR
<i>Hylopezus berlepschi</i> (Hellmayr, 1903)	torom-torom	INS	M	FAS;FASR	V;S;GR
Formicariidae Gray, 1840					
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	galinha-do-mato	INS	A	FDM;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Formicarius analis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pinto-do-mato-de-cara-preta	INS	M	FDM;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
Scleruridae Swainson, 1827					
<i>Sclerurus mexicanus</i> Sclater, 1857	vira-folha-de-peito-vermelho	INS	A	FAS;FASR	FT;R;C
<i>Sclerurus caudacutus</i> (Vieillot, 1816)	vira-folha-pardo	INS	A	FASR	S;GR
Dendrocolaptidae Gray, 1840					
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-pardo	INS	A	FDM;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Deconychura longicauda</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-rabudo	INS	A	FDM	FT;R;C

Continua...

...continuação

Táxons	Nome popular	Hábito Alimentar	Senst.	Tipologia	Reg.
<i>Deconychura stictolaema</i> (Pelzeln, 1868)	arapaçu-de-garganta-pintada	INS	A	FASR	FT;R;C
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	INS	M	FDM	V
<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819)	arapaçu-de-bico-de-cunha	INS	M	FDM;FDMS;FDS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Dendrexetastes rufigula</i> (Lesson, 1844)	arapaçu-galinha	INS	A	FASR	S;GR
<i>Hylexetastes brigidai</i> Silva, Novaes & Oren, 1996	arapaçu-deloro-cinza	INS	A	FDM	S;GR
<i>Xiphocolaptes carajaensis</i> Silva, Novaes & Oren, 2002	arapaçu-do-carajás	INS	A	FDM;FASR	V;S;GR
<i>Dendrocolaptes certhia</i> (Boddaert, 1783)	arapaçu-barrado	INS	A	FDM;FDMS;FASR	S;GR;FT;R;C
<i>Dendrocolaptes picumnus</i> Lichtenstein, 1820	arapaçu-meio-barrado	INS	A	FDM;FDS	S;GR;FT;R;C
<i>Xiphorhynchus spixii</i> (Lesson, 1830)	arapaçu-de-spix	INS	A	FDM;FAS;FASR	S;GR;FT;R;C
<i>Xiphorhynchus guttatus</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-de-garganta-amarela	INS	M	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR;ANT	S;GR;FT;R;C
<i>Lepidocolaptes albolineatus</i> (Lafresnaye, 1845)	arapaçu-de-listras-brancas	INS	A	FDMS;FDS;FASR	V;S;GR
Furnariidae Gray, 1840					
<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823	uí-pi	INS	B	FDM	S
<i>Synallaxis rutilans</i> Temminck, 1823	joao-teneném-castanho	INS	A	FDM;FASR	FT;R;C
<i>Synallaxis cherriei</i> Gyldestolpe, 1930	puruchém	INS	M	FDM;FAS;FASR	S;GR;FT;R;C
<i>Philydor ruficaudatum</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	limpa-folha-de-cauda-ruiva	INS	A	FASR	V;S;GR
<i>Philydor erythrocerum</i> (Pelzeln, 1859)	limpa-folha-de-sobre-ruivo	INS	A	FDM;FDMS;FAS;FASR	V;S;GR
<i>Automolus paraensis</i> Hartert, 1902	barraqueiro-do-pará	INS	A	FDM;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Automolus rufipileatus</i> (Pelzeln, 1859)	barraqueiro-de-coroa-castanha	INS	M	FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Xenops tenuirostris</i> Pelzeln, 1859	bico-virado-fino	INS	M	FDM;FASR	V;S;GR
<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	bico-virado-miúdo	INS	M	FDM;FDS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
Tyrannidae Vigors, 1825					
<i>Mionectes macconnelli</i> (Chubb, 1919)	abre-asa-da-mata	INS	A	FDM;FAS;FASR	FT;R;C
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	INS	M	FAS	S
<i>Hemitriccus minor</i> (Sneathlaga, 1907)	maria-sebinha	INS	A	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Hemitriccus griseipectus</i> (Sneathlaga, 1907)	maria-de-barriga-branca	INS	?	FASR	V;S;GR
<i>Myiornis ecaudatus</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	caçula	INS	M	FAS	V;S;GR
<i>Poecilatriccus capitalis</i> (Sclater, 1857)	maria-piçaça	INS	M	FDS;FASR	V;S;GR
<i>Todirostrum maculatum</i> (Desmarest, 1806)	ferreirinho-estriado	INS	B	FDM;ANT	S;GR
<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	INS	B	FDM;FAS;FASR	S
<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i> Strickland, 1850	ferreirinho-pintado	INS	M	FASR	V;S;GR
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho	INS	M	FAS	S;GR
<i>Tyrannulus elatus</i> (Latham, 1790)	maria-te-viu	INS	B	FAS;FASR	V;S;GR

Continua...

...continuação

Táxons	Nome popular	Hábito Alimentar	Senst.	Tipologia	Reg.
<i>Myiopagis gaimardii</i> (d'Orbigny, 1839)	maria-pechim	ONI	M	FDM;FDS;FAS;FASR	S;GR
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	guaracava-cinzenta	ONI	M	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR;ANT	S;GR
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	ONI	B	FDM;FDS;FAS	V;S;GR
<i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853	poiaeiro-de-sobrancelha	INS	M	FDM;FDMS;FAS;FASR	S;GR
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	INS	B	FDS	S;GR
<i>Zimmerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1868)	poiaeiro-de-pata-fina	INS	M	FDM	V;S;GR
<i>Sublegatus obscurior</i> Todd, 1920	sertanejo-escuro	INS	M	FASR	V
<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868)	bico-chato-da-copa	INS	A	FASR	S;GR
<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884)	bico-chato-de-cabeça-cinza	INS	M	FDM;FASR	S;GR
<i>Platyrinchus saturatus</i> Salvin & Godman, 1882	patinho-escuro	INS	A	FDM;FAS;FASR	FT;R;C
<i>Platyrinchus platyrhynchos</i> (Gmelin, 1788)	patinho-de-coroa-branca	INS	A	FASR	FT;R;C
<i>Onychorhynchus coronatus</i> (Statius Muller, 1776)	maria-leque	INS	A	FDM;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	INS	B	FDS;FAS	S
<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	assanhadinho	INS	A	FDM;FAS;FASR	V;FT;R;C
<i>Terenotriccus erythrurus</i> (Cabanis, 1847)	papa-moscas-uirapuru	INS	M	FDM;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Lathrotriccus eulerei</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	INS	M	FASR	FT;R;C
<i>Contopus cooperi</i> (Nuttall, 1831)	piui-boreal	INS	M	FDM;FAS;FASR	FT
<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzento	INS	B	FDM	V
<i>Contopus nigrescens</i> (Sclater & Salvin, 1880)	piui-preto	INS	A	FDM	V
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha	INS	B	FDM;FAS;FASR	V;S;GR
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	INS	B	FAS;FASR;ANT	S;GR
<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	bentevizinho-de-asa-ferrugínea	ONI	B	FDS;FAS;FASR	V;S
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	ONI	B	FDM;FAS;FASRANT	V;S
<i>Myiozetetes luteiventris</i> (Sclater, 1858)	bem-te-vi-barulhento	ONI	B	FASR	V;S;GR;FT
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	ONI	B	FDS;FAS;FASR;ANT	V;S;GR
<i>Philohydor lictor</i> (Lichtenstein, 1823)	bentevizinho-do-brejo	INS	B	FAS;FASR	V;S;GR;C
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado	ONI	B	FDM;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;C
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei	ONI	B	FAS;FASR;ANT	V;S
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peítica	ONI	B	FDM;FAS;FASR	V;S;GR
<i>Tyrannus albogularis</i> Burmeister, 1856	suiriri-de-garganta-branca	ONI	B	ANT	V
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	ONI	B	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR;ANT	V;S;GR
<i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823)	vissia	ONI	A	FAS;FASR	V;S;GR

Continua...

...continuação

Táxons	Nome popular	Hábito Alimentar	Senst.	Tipologia	Reg.
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	maria-cavaleira-pequena	ONI	B	FDM;FDS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	ONI	B	FDM;FDS;FAS;FASR;ANT	V;S;GR;FT;R;
<i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789)	capitão-de-saíra-amarelo	ONI	M	FDS;FAS	V;S;GR
Cotingidae Bonaparte, 1849					
<i>Cotinga cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-azul	FRU	A	FDM;FAS;FASR	V;FT
<i>Procnias albus wallacei</i> (Hermann, 1783)	araponga-da-amazônia	FRU	M	FDM;FASR	S;GR
<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820)	cricrió	FRU	A	FDM;FDMS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Xipholena lamellipennis</i> (Lafresnaye, 1839)	anambé-de-rabo-branco	FRU	A	FDM;FAS;	V
<i>Querula purpurata</i> (Statius Muller, 1776)	anambé-uma	FRU	M	FDM;FAS;FASR	V;S;GR
Pipridae Rafinesque, 1815					
<i>Tyrannetes stolzmanni</i> (Hellmayr, 1906)	uirapuruzinho	FRU	A	FDM;FAS;FASR;ANT	V;S;GR
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	papinho-amarelo	FRU	A	FDM;FAS;FASR	V;S;GR
<i>Lepidothrix iris</i> (Schinz, 1851)	cabeça-de-prata	FRU	M	FDM;FAS;FASR	FT;R;C
<i>Piprideo sp. pv. Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766)	tangará-falso	FRU	A	FDM	FT;R;C
<i>Pipra cf. fasciicauda</i> Hellmayr, 1906	uirapuru-laranja	FRU	M	FDM;FAS;FASR	FT;R;C
<i>Pipra rubrocapilla</i> Temminck, 1821	cabeça-encarnada	FRU	A	FDM;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
Tityridae Gray, 1840					
<i>Oxyruncus cristatus</i> Swainson, 1821	araponga-do-horto	FRU	A	FDM;FAS	V;S;GR
<i>Schiffornis turdina</i> (Wied, 1831)	flautim-marrom	FRU	A	FAS	FT;R;C
<i>Laniocera hypopyrra</i> (Vieillot, 1817)	chorona-cinza	ONI	A	FASR	V;S;GR
<i>Iodopleura isabellae</i> Parzudaki, 1847	anambé-de-coroa	ONI	M	FDM;FDS;FAS;FASR	V
<i>Tityra semifasciata</i> (Spix, 1825)	anambé-branco-de-máscara-negra	ONI	M	FDM;FDS;FAS;FASR	V;FT
<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	caneleiro	ONI	M	FAS;FASR	V;S
<i>Pachyramphus marginatus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-bordado	ONI	A	FASR	S;GR
<i>Pachyramphus minor</i> (Lesson, 1830)	caneleiro-pequeno	ONI	A	FASR	S;GR
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto	ONI	M	FDM;FAS;FASR	V
Vireonidae Swainson, 1837					
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	ONI	B	FDM;FAS;FASR	V;S
<i>Vireolanius leucotis</i> (Swainson, 1838)	assobiador-do-castanhal	ONI	A	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR	V;S;GR
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	ONI	B	FDM;FAS;FASR	V;S;GR
<i>Hylophilus semicinereus</i> Sclater & Salvin, 1867	verdinho-da-várzea	ONI	M	FASR	V;S;GR
<i>Hylophilus hypoxanthus</i> Pelzeln, 1868	vite-vite-de-barriga-marela	ONI	A	FDM;FDS;FAS	V;S;GR
<i>Hylophilus ochraceiceps</i> Sclater, 1859	vite-vite-uirapuru	ONI	M	FDM	FT;R;C

Continua...

...continuação

Táxons	Nome popular	Hábito Alimentar	Senst.	Tipologia	Reg.
Hirundinidae Rafinesque, 1815					
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	INS	B	FASRANT	V
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo	INS	B	ANT	V
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande	INS	B	FAS;FASR;ANT	V
<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	andorinha-do-rio	INS	B	ANT	V
Troglodytidae Swainson, 1831					
<i>Microcerculus marginatus</i> (Sclater, 1855)	uirapuru-veado	INS	A	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR;ANT	V;S;GR;FT;R;C
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	INS	B	FDM;FDS;FAS;FASR;ANT	V;S;R
<i>Campylorhynchus turdinus</i> (Wied, 1831)	catatau	INS	B	FAS;FASR;ANT	V;S;GR
<i>Pheugopedius coraya</i> (Gmelin, 1789)	garrinchão-coraia	INS	B	FDM;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Cantorchilus leucotis</i> (Lafresnaye, 1845)	garrinchão-de-barriga-vermelha	INS	B	FASR	V;S;GR;FT;R;C
Donacobiidae Aleixo & Pacheco, 2006					
<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacanim	INS	M	ANT	V
Poliopitilidae Baird, 1858					
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	bico-assoavelado	INS	B	FDS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
Turdidae Rafinesque, 1815					
<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	sabiá-da-mata	ONI	M	FDS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	ONI	M	FDM;FDMS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838					
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	NEC	B	FDM;FASR	V;S
Thraupidae Cabanis, 1847					
<i>Schistochlamys melanopsis</i> (Latham, 1790)	sanhaçu-de-coleira	ONI	B	FDM;FAS;	V;S;GR
<i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)	tietinga	ONI	B	FDM;FDS;FASR;ANT	V;S;GR
<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	pipira-de-bico-vermelho	ONI	A	FDM;FASR	V;S;GR
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso	ONI	M	FAS;	FT;R;C
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo	ONI	M	FDM;FDS	V
<i>Tachyphonus luctuosus</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	tem-tem-de-dragona-branca	ONI	M	FDM;FAS;FASR	V
<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783)	pipira-preta	ONI	B	FDM;FDS;FAS;FASRANT	V;S;GR;FT;R;C
<i>Lanio versicolor</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pipira-de-asa-branca	ONI	A	FDM;FAS	V;FT;R;C
<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	pipira-vermelha	ONI	B	FDM;FAS;FASR;ANT	V;FT;R
<i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-da-amazônia	ONI	B	FDM;FAS;FASR;ANT	V;S
<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	ONI	B	FDM;FASR;ANT	V;S
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	ONI	B	FDM;FDS;FAS;FASR;ANT	V;S
<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-bando	ONI	M	FAS	V

Continua...

...continuação

Táxons	Nome popular	Hábito Alimentar	Senst.	Tipologia	Reg.
<i>Tangara punctata</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-negaça	ONI	A	FDM;FDS;FAS	V;S;FT;R;C
<i>Tangara nigrocincta</i> (Bonaparte, 1838)	saíra-mascarada	ONI	M	FAS;FASR	V
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	ONI	B	FASR	V;S
<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789)	saí-de-máscara-preta	ONI	M	FAS	V
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	ONI	B	FDS;FAS	V
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde	ONI	M	FASR	V;FT
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-papo-preto	ONI	B	FDM;FDS;FAS;FASR	V;S
Emberizidae Vigors, 1825					
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo	GRA	B	ANT	S
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	GRA	B	FAS;ANT	V
<i>Sporophila sp</i>	papa-capim	GRA	?	FASR	FT;R;C
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho	GRA	B	FDM;FAS	V;S;GR
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	baiano	GRA	B	FAS;ANT	V;S
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió	GRA	B	FDM;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;FT
<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	tico-tico-de-bico-preto	GRA	M	FDM;FDMS;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
Cardinalidae Ridgway, 1901					
<i>Saltator grossus</i> (Linnaeus, 1766)	bico-encarnado	ONI	M	FDM;FDS;FAS;FASR;ANT	V;S;GR;FT;R;C
<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola	ONI	B	FDM;FDS;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R
<i>Cyanoloxia cyanoides</i> (Lafresnaye, 1847)	azulão-da-amazônia	ONI	M	FDM;FAS;FASR	V;S;GR;FT;R;C
Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947					
<i>Phaeothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)	pula-pula-ribeirinho	INS	M	FASR	V;S;GR;FT;R;C
<i>Granatellus pelzelni</i> Sclater, 1865	polícia-do-mato	INS	M	FASR	V;S;GR;FT;R;C
Icteridae Vigors, 1825					
<i>Psarocolius viridis</i> (Statius Muller, 1776)	japu-verde	ONI	A	FDM	V;S;GR
<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	japu	ONI	M	FDM;FAS;FASR	V;FT;R
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	ONI	B	FASR	V;S;GR
<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	xexéu	ONI	B	FAS;FASR	V;S;GR
<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	encontro	ONI	B	FDS;FASR;ANT	V
<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	iraúna-grande	ONI	B	FDM;FDS;FASR;ANT	V;S;GR
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	ONI	B	FDM;FDS;FAS;FASR;ANT	V;S
<i>Sturnella militaris</i> (Linnaeus, 1758)	polícia-inglesa-do-norte	INS	B	ANT	V;S;GR
Fringillidae Leach, 1820					
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim	ONI	B	FDM;FDMS;FAS	V;S;GR

Continua...

...continuação

Táxons	Nome popular	Hábito Alimentar	Senst.	Tipologia	Reg.
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	ONI	B	FDM;FDS;FAS;FASRANT	V;S;GR
<i>Euphonia rufiventris</i> (Vieillot, 1819)	gaturamo-do-norte	ONI	M	FASR	V;S;GR

Legenda:

Tipologia: FDM - Floresta ombrófila densa montana; FDMS - Floresta ombrófila densa montana secundária; FDS - Floresta ombrófila densa montana secundária; FAZ - Floresta ombrófila aberta submontana; FASR - Floresta ombrófila aberta submontana ribeirinha; ANT - antrópico; AQU - aquático

Sensibilidade: A - alta sensibilidade; M - média sensibilidade; B - baixa sensibilidade

Hábito Alimentar: ONI: onívora; INS - insetívora; GRA: granívora; NEC: nectarívora; CAR: carnívora; FRU: frugívora

Tipo de Registro: V - visual; S - sonoro; GR - Gravação; FT - fotografia; C - coleta; R - rede de neblina; CT - armadilha fotográfica

ANEXO 10.XV_B

ESPÉCIES DE AVES CLASSIFICADAS COMO CINEGÉTICAS E
XERIMBABOS REGISTRADAS NA ÁREA DE ENTORNO E ÁREA
DIRETAMENTE AFETADA DO PROJETO ALEMÃO

Nome do Táxon	Nome em Português	STATUS
<i>Tinamus tao</i> Temminck, 1815	azulona	CIN
<i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-de-cabeça-vermelha	CIN
<i>Tinamus guttatus</i> Pelzeln, 1863	inhambu-galinha	CIN
<i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-preto	CIN
<i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)	tururim	CIN
<i>Crypturellus strigulosus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-relógio	CIN
<i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789)	inhambu-anhangá	CIN
<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	inhambu-chororó	CIN
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato	CIN
<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	jacupemba	CIN
<i>Penelope pileata</i> Wagler, 1830	jacupiranga	CIN
<i>Aburria kujubi</i> (Pelzeln, 1858)	cujubi	CIN
<i>Crax fasciolata</i> Spix, 1825	mutum-de-penacho	CIN
<i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	uru-corcovado	CIN
<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-rei	CIN
<i>Leucopternis albicollis</i> (Latham, 1790)	gavião-branco	CIN
<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-real	CIN
<i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-pato	CIN
<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	gavião-de-penacho	CIN
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	CIN
<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	pararu-azul	CIN
<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal	CIN
<i>Patagioenas subvinacea</i> (Lawrence, 1868)	pomba-botafogo	CIN
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	CIN
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira	CIN

Legenda: CIN: cinegética; XER: xerimbabo

Nome do Táxon	Nome em Português	STATUS
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri	CIN
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> (Latham, 1790)	arara-azul-grande	XER
<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)	araracanga	XER
<i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859	arara-vermelha-grande	XER
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã	XER
<i>Aratinga jandaya</i> (Gmelin, 1788)	jandaia-verdadeira	XER
<i>Pyrrhura amazonum</i> Hellmayr, 1906	tiriba-de-hellmayr	XER
<i>Brotogeris chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766)	periquito-de-asa-dourada	XER
<i>Pyralia vulturina</i> (Kuhl, 1820)	curica-urubu	XER
<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766)	maitaca-de-cabeça-azul	XER
<i>Amazona ochrocephala</i> (Gmelin, 1788)	papagaio-campeiro	XER
<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	tucano-grande-de-papo-branco	XER
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	XER
<i>Pteroglossus inscriptus</i> Swainson, 1822	araçari-miudinho-de-bico-riscado	XER
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)	araçari-de-bico-branco	XER
<i>Procnias albus wallacei</i> (Hermann, 1783)	araponga-da-amazônia	XER
<i>Querula purpurata</i> (Statius Muller, 1776)	anambé-uma	XER
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	papinho-amarelo	XER
<i>Lepidothrix iris</i> (Schinz, 1851)	cabeça-de-prata	XER
<i>Piprideo sp. pv. Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766)	tangará-falso	XER
<i>Pipra cf. fasciicauda</i> Hellmayr, 1906	uirapuru-laranja	XER
<i>Pipra rubrocapilla</i> Temminck, 1821	cabeça-encarnada	XER
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	XER
<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	sabiá-da-mata	XER
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	XER

Continua...

...continuação

Nome do Táxon	Nome em Português	STATUS
<i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790)	sanhaçu-de-coleira	XER
<i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)	tietinga	XER
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso	XER
<i>Lanio versicolor</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	pipira-de-asa-branca	XER
<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	pipira-vermelha	XER
<i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-da-amazônia	XER
<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	XER
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	XER
<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-bando	XER
<i>Tangara punctata</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-negaça	XER
<i>Tangara nigrocincta</i> (Bonaparte, 1838)	saíra-mascarada	XER
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	XER
<i>Dacnis lineata</i> (Gmelin, 1789)	saí-de-máscara-preta	XER
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	XER
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde	XER
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-papo-preto	XER
<i>Sporophila sp</i>	papa-capim	XER
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho	XER
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	baiano	XER
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió	XER
<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	tico-tico-de-bico-preto	XER
<i>Saltator grossus</i> (Linnaeus, 1766)	bico-encarnado	XER
<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola	XER
<i>Cyanoloxia cyanoides</i> (Lafresnaye, 1847)	azulão-da-amazônia	XER
<i>Psarocolius viridis</i> (Statius Muller, 1776)	japu-verde	XER

Continua...

...continuação

Nome do Táxon	Nome em Português	STATUS
<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	japu	XER
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	XER
<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	xexéu	XER
<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	encontro	XER
<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	iraúna-grande	XER
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	XER
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim	XER
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	XER
<i>Euphonia rufiventris</i> (Vieillot, 1819)	gaturamo-do-norte	XER