

TABELA 1

**Espécies de Aves Registradas na Região do Projeto Salobo
Campanha de setembro/outubro de 2003**

| Ordem | Família (n° spp.) Sub-Família | Espécie | Nome Popular | Dieta | Categoria | Área | Tipo de Registro |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------|---|----------------|------------------|
| Tinamiformes | Tinamidae (7) Tinaminae | <i>Tinamus tao</i> | Azulona | oni | Cin | T2, T4, T7 | z |
| | | <i>Tinamus major</i> | Inhambu-de-cabeça-vermelha | oni | Cin | T4 | z |
| | | <i>Tinamus guttatus</i> | Inhambu-galinha | oni | Cin | T4, T6 | z |
| | | <i>Crypturellus cinereus</i> | Inambu-preto | oni | Cin | T2, T3, T4, T6 | z |
| | | <i>Crypturellus soui</i> | Sururina, tururim | oni | Cin | T7 | z |
| | | <i>Crypturellus variegatus</i> | Chororão | oni | Cin | T2, T4 | z |
| | | <i>Crypturellus strigulosus</i> | Inhambu-listrado | oni | Cin | T4, T5, T6 | z |
| Ciconiiformes | Cathartidae (3) | <i>Sarcoramphus papa</i> | Urubu-rei | car | Cin | T4 | v |
| | | <i>Cathartes burrovianus</i> | Urubu-de-cabeça-amarela | car | | T3 | v |
| | | <i>Cathartes melambrotus</i> | Urubu-da-mata | car | | T4, T5 | v |
| Falconiformes | Accipitridae (3) | <i>Ictinia plumbea</i> | Sovi | ins | Mig | T1, T7 | vz |
| | | <i>Buteogallus urubitinga</i> | Gavião-preto | car | | T4 | vz |
| | | <i>Spizaetus ornatus</i> | Gavião-de-penacho | car | Cin | T4 | z |
| | Falconidae (4) | <i>Micrastur ruficollis</i> | Gavião-caburé | oni | | T7 | z |
| | Falconidae (4) | <i>Micrastur mirandollei</i> | Tanatau | oni | | T1 | z |
| | Falconidae (4) | <i>Daptrius ater</i> | Canção-de-anta | car | | T3 | vz |
| | Falconidae (4) | <i>Daptrius americanus</i> | Canção-grande | oni | | T2, T4, T6 | vz |
| Galliformes | Cracidae (3) | <i>Penelope pileata</i> | Jacupiranga | fru | Qa, en (restrita aos centros Rondônia, Pará e Belém), cin | T4, T7 | vz |
| | | <i>Crax fasciolata</i> | Mutum-pinima | fru | Am, ep, cin | T3, T6 | vz |
| | | <i>Mitu tuberosa</i> | Mutum-cavalo | fru | Cin | T5, T6 | z |
| | Phasianidae (1) | <i>Odontophorus gujanensis</i> | Uru-corcovado | fru | Cin | T2, T5, T7 | z |
| Gruiformes | Psophiidae (1) | <i>Psophia viridis</i> | Jacamim-de-costas-verdes | oni | Am, ep, en (restrita aos centros Pará e Belém), cin | T4 | z |

Continuação...

| Ordem | Família (n° spp.) Sub-Família | Espécie | Nome Popular | Dieta | Categoria | Área | Tipo de Registro |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|--|--------------------|------------------|
| Gruiformes | Rallidae (1) | <i>Aramides cajanea</i> | Saracura-três-potes | oni | Cin | T1, T3, T4, T5 | vz |
| Columbiformes | Columbidae (7) | <i>Columba speciosa</i> | Pomba-trocal | fru | Cin | T6 | vz |
| | | <i>Columba subvinacea</i> | Pomba-amargosa-da-Amazônia | fru | Cin | T4, T6, T7 | z |
| | | <i>Columba plumbea</i> | Pomba-amargosa | fru | Cin | T7 | vz |
| | | <i>Columbina talpacoti</i> | Rolinha-caldo-de-feijão | gra | Cin | T1 | vz |
| | | <i>Leptotila verreauxi</i> | Juriti-pupu | fru | Cin | T7 | vz |
| | | <i>Leptotila rufaxilla</i> | Juriti-gemeadeira | fru | Cin | T1, T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Geotrygon montana</i> | Juriti-piranga | fru | Cin, mig | T4, T5, T6, T7 | z |
| Psittaciformes | Psittacidae (11) | <i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> | Arara-azul-grande | fru | Am, vul, ra, cin | T4, T6 | vz |
| | | <i>Ara chloroptera</i> | Arara-vermelha | fru | Cin | T1, T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Aratinga leucophthalmus</i> | Maritaca | fru | Cin | T1, T4, T5, T6 | vz |
| | | <i>Pyrrhura amazonum</i> | Tiriba | fru | End (restrita aos centros Pará e Belém), cin | T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Forpus xanthopterygius</i> | Tuim-de-asa-azul | fru | Cin, mig | T1 | vz |
| | | <i>Brotogeris chrysopterus</i> | Periquito-de-asa-laranja | fru | Cin | T4, T6 | vz |
| | | <i>Pionites leucogaster</i> | Marianinha-de-cabeça-amarela | fru | Cin | T5 | vz |
| | | <i>Pionus menstruus</i> | Maitaca-de-cabeça-azul | fru | Cin | T1, T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Amazona amazonica</i> | Papagaio-do-mangue | fru | Cin | T5 | vz |
| | | <i>Amazona farinosa</i> | Papagaio-moleiro | fru | Cin | T5 | vz |
| Cuculiformes | Cuculidae (4) Phaenicophaeinae | <i>Deroptyx accipitrinus</i> | Anacã | fru | Cin | T4, T5 | vz |
| | | <i>Piaya cayana</i> | Alma-de-gato | li | | T4, T6 | vz |
| | | <i>Crotophaga ani</i> | Anu-preto | li | | T1 | vz |
| | | <i>Tapera naevia</i> | Saci | li | | T1 | z |
| Strigiformes | Strigidae (2) | <i>Dromococcyx pavoninus</i> | Peixe-frito-pavonino | li | | T4 | z |
| | | <i>Otus choliba</i> | Corujinha-do-mato | ins | | T1 | z |
| | | <i>Ciccaba virgata</i> | Coruja-de-bigodes | car | | T1 | z |

Continuação...

| Ordem | Família (n° spp.) Sub-Família | Espécie | Nome Popular | Dieta | Cate- goria | Área | Tipo de Regis- tro |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| Capri- mulgi- formes | Nyctibiidae (1) | <i>Nyctibius grandis</i> | Urutau-grande | ins | Ra | T1 | z |
| | | <i>Lurocalis semitorquatus</i> | Tuju | ins | | T4 | vz |
| | Caprimulgi- dae (3) | <i>Nyctidromus albicollis</i> | Curiango | ins | | T6 | vz |
| | | <i>Caprimulgus nigrescens</i> | Bacurau-negro | ins | | T3 | vz |
| Apodi- formes | Apodidae (3) | <i>Chaetura cinereiventris</i> | Andorinhão-de-barriga-cinza | ins | | T1, T7 | vz |
| | | <i>Chaetura spinicauda</i> | Andorinhão-de-sobre-branco | ins | | T5, T7 | vz |
| | | <i>Chaetura andrei</i> | Andorinhão-dp-temporal | ins | Mig | T1 | vz |
| | Trochilidae (5) | <i>Phaethornis superciliosus</i> | Besourão-de-rabo-branco | nec | | T2, T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Phaethornis ruber</i> | Rabo-branco-rubro | nec | | T5, T7 | vz |
| | | <i>Thalurania furcata</i> | Beija-flor-de-barriga-violeta | nec | | T4, T5, T7 | vz |
| | | <i>Heliothryx aurita</i> | Beija-flor-de-bochecha-azul | nec | | T7 | vz |
| | | <i>Heliomaster longirostris</i> | Bico-reto-cinzento | nec | | T1 | v |
| Trogo- niformes | Trogonidae (4) | <i>Trogon melanurus</i> | Surucuá-de-cauda-preta | oni | Cin | T4, T6, T7 | vz |
| | | <i>Trogon viridis</i> | Surucuá-de-barriga-dourada | oni | Cin | T4, T5 | vz |
| | | <i>Trogon curucui</i> | Surucuá-de-cora-azul | oni | Cin | T6 | vz |
| | | <i>Trogon violaceus</i> | Surucuá-pequeno | oni | Cin | T4 | vz |
| Coracii- formes | Momotidae (1) | <i>Momotus momota</i> | Udu-de-coroa-azul | ins | Cin | T4, T5, T7 | vz |
| Picifor- mes | Galbulidae (4) | <i>Galbula cyanicollis</i> | Ariramba-de-bico-amarelo | ins | | T4 | vz |
| | | <i>Galbula ruficauda</i> | Ariramba-de-cauda-ruiva | ins | | T1 | vz |
| | | <i>Galbula dea</i> | Ariramba-do-paráiso | ins | | T6 | vz |
| | | <i>Jacamerops aurea</i> | Jacamarazu | ins | | T2, T6 | z |
| | Bucconidae (6) | <i>Notharchus macrorhynchus</i> | Capitão-do-mato | ins | | T4 | z |
| | | <i>Notharchus tectus</i> | Macuru-pintado | ins | | T4 | v |
| | | <i>Bucco tamatia</i> | Rapazinho-carijó | ins | | T4, T5, T7 | z |
| | | <i>Nystalus striolatus</i> | Rapazinho-estriado | ins | | T4, T5 | vz |
| | | <i>Monasa morphoeus</i> | Bico-de-brasa-de-testa-branca | ins | | T1, T5, T5, T6 | vz |
| | | <i>Chelidoptera tenebrosa</i> | Urubuzinho | ins | Cin | T3 | vz |
| | Ramphasti- dae (5) | <i>Pteroglossus aracari</i> | Araçari-de-bico-branco | oni | Cin | T1, T5, T6 | vz |
| | | <i>Pteroglossus inscriptus</i> | Araçari-miúdo-de-bico-riscado | oni | Cin | T6 | vz |
| | | <i>Selenidera gouldii</i> | Araçari-de-gould | oni | Cin | T4, T6, T7 | z |
| | | <i>Ramphastos vitellinus</i> | Tucano-de-bico-preto | oni | Cin | T5, T6, T7 | z |
| | | <i>Ramphastos tucanus</i> | Tucano-grande-de-papo-brando | oni | Cin | T1, T2, 4, T5, T6, T7 | vz |
| | Picidae (9) | <i>Picumnus aurifrons</i> | Pic-pau-anão-amarelo | ins | | T7 | z |
| | | <i>Piculus flavigula</i> | Pica-pau-bufador | ins | | T4, T6, T7 | vz |
| | | <i>Celeus grammicus</i> | Pica-pau-escamoso | ins | | T4, T5 | z |
| | | <i>Celeus flavus</i> | Pica-pau-amarelo | ins | | T5 | z |
| | | <i>Dryocopus lineatus</i> | Pica-pau-de-banda-branca | ins | | T1, T4, T6 | vz |
| | | <i>Melanerpes cruentatus</i> | Pica-pau-de-barriga-vermelha | oni | | T5, T6 | vz |
| | | <i>Veniliornis affinis</i> | Pica-pau-de-asa-vermelha | ins | | T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Campephilus melanoleucos</i> | Pica-pau-de-topete-vermelho | ins | | T4 | z |
| <i>Campephilus rubricollis</i> | | Pica-pau-de-barriga-vermelha | ins | | T4, T5, T7 | z | |

Continuação...

| Ordem | Família (n° spp.) Sub-Família | Espécie | Nome Popular | Dieta | Cate- goria | Área | Tipo de Regis- tro |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| Passeri- formes | Formicariii- dae (33) | <i>Cymbilaimus lineatus</i> | Choró | ins | | T4, T6, T7 | z |
| | | <i>Taraba major</i> | Choró-boi | li | | T7 | z |
| | | <i>Sakesphorus luctuosus</i> | Choca-d'água | ins | End | T4 | z |
| | | <i>Pygiptila stellaris</i> | Choca-cantadora | ins | | T4, T5, T6 | z |
| | | <i>Thamnomanes caesius</i> | Uirapuru-de-bando | ins | | T2, T4, T5, T6, T7 | z |
| | | <i>Myrmotherula multostriata</i> | Choquinha | ins | | T3, T4 | z |
| | | <i>Myrmotherula axillaris</i> | Choquinha-de-flancos-brancos | ins | | T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Myrmotherula hauxwelli</i> | Choquinha-de-garganta-clara | ins | | T5, T6, T7 | z |
| | | <i>Myrmotherula ornata</i> | Choquinha-ornada | ins | | T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Myrmotherula brachyura</i> | Choquinha-miúda | ins | | T4, T5, T6 | vz |
| | | <i>Myrmotherula longipennis</i> | Choquinha-de-asa-lisa | ins | | T4, T5, T6 | vz |
| | | <i>Myrmotherula leucophthalma</i> | Choquinha-de-olho-branco | ins | | T6 | z |
| | | <i>Myrmotherula menetriesii</i> | Choquinha-de-garganta-cinza | ins | | T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> | Chorozinho-de-asa-ruiva | ins | | T5, T7 | vz |
| | | <i>Herpsilochmus stictocephalus</i> | Chorozinho-de-cabeça-pintada | ins | | T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Thamnophilus schistaceus</i> | Choca-de-olho-vermelho | ins | | T2, T4, T5, T6, T7 | z |
| | | <i>Cercomacra cinerascens</i> | Chororó-pocua | ins | | T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Cercomacra nigrescens</i> | Chororó-preto | ins | | T4, T7 | z |
| | | <i>Pyriglena leuconota</i> | Papa-taoca | ins | | T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Myrmoborus leucophrys</i> | Papa-formigas-de-sobrancelha | ins | | T4, T6 | z |
| | | <i>Myrmoborus myiotherinus</i> | Formigueiro-de-cara-preta | ins | | T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Hypocnemis cantator</i> | Papa-formigas-cantador | ins | | T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Hypocnemoides maculicauda</i> | Solta-asa-do-sul | ins | | T4, T6 | z |
| | | <i>Scelateria naevia</i> | Papa-formigas-do-igarepé | ins | | T4 | z |
| | | <i>Hylophylax naevia</i> | Guarda-floresta | ins | | T4, T5 | z |
| | | <i>Hylophylax poecilnota</i> | Rendadinho | ins | | T4, T7 | z |
| | | <i>Phlegopsis nigromaculata</i> | Mãe-de-taoca-pintada | ins | Am, ep | T4, T5, T6 | vz |
| | | <i>Formicarius colma</i> | Pinto-da-mata-coroado | ins | | T5, T6 | z |
| | | <i>Formicarius analis</i> | Pinto-da-mata-de-cara-preta | ins | | T2, T4, T5, T6 | z |
| | | <i>Grallaria varia</i> | Tovacuçu-malhado | ins | | T5, T6, T7 | z |
| | | <i>Hylopezus macularius</i> | Torom-carijó | ins | | T5, T6 | z |
| | | <i>Hylopezus berlepschi</i> | Torom-torom | ins | | T4, T5 | z |
| | | <i>Conopophaga aurita</i> | Chupa-dente-cinta | ins | | T5, T6 | z |

Continuação...

| Ordem | Família (n° spp.) Sub-Família | Espécie | Nome Popular | Dieta | Cate- goria | Área | Tipo de Regis- tro |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|--|---------------------------|-----------------------------|
| Passeri- formes | Furnariidae (8) Synallaxinae | <i>Synallaxis rutilans</i> | João-teneném-castanho | ins | | T2, T6 | z |
| | | <i>Synallaxis cherriei</i> | Puruchém | ins | Qa, ra (popu- lação isolad a) | T4, T5 | z |
| | Philydorinae | <i>Berlepschia rikeri</i> | Limpa-folha-do-buriti | ins | | T4 | vz |
| | | <i>Philydor erythrocerus</i> | Limpa-folha-de-sobre-ruivo | ins | | T4, T6, T7 | v |
| | | <i>Automolus infuscatus</i> | Barranqueiro-pardo | ins | | T4, T5, T6 | z |
| | | <i>Automolus rufipileatus</i> | Barranqueiro-de-coroa-castanha | ins | | T4, T5 | vz |
| | | <i>Xenops minutus</i> | Bico-virado-miúdo | ins | | T4, T5, T7 | vz |
| | | <i>Sclerurus rufigularis</i> | Vira-folha-de-bico-curto | ins | | T4, T5, T6 | z |
| | | <i>Dendrocincla fuliginosa</i> | Arapaçu-pardo | ins | | T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Deconychura longicauda</i> | Arapaçu-rabudo | ins | | T6 | z |
| | Dendroc- laptidae (10) | <i>Sittasomus griseicapillus</i> | Arapaçu-verde | ins | | T4, T5, T6 | vz |
| | | <i>Glyphorhynchus spirurus</i> | Arapaçu-de-bico-de-cunha | ins | | T7 | vz |
| | Dendrocolap- tidae (10) | <i>Xiphocolaptes carajensis</i> | Arapaçu | ins | End (restri- ta ao centro Pará) | T4, T6 | z |
| | | <i>Dendrocolaptes certhia</i> | Arapaçu-barrado | ins | Am, ep | T6 | z |
| | | <i>Dendrocolaptes picumnus</i> | Arapaçu-meio-barrado | ins | | T6 | z |
| | | <i>Xiphorhynchus guttatus</i> | Arapaçu-de-garganta-amarela | ins | | T1, T2, T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Xiphorhynchus spixii</i> | Arapaçu-de-spix | ins | End (restri- ta aos centro s Pará e Belé m) | T4, T5, T6 | z |
| | | <i>Lepidocolaptes albolineatus</i> | Arapaçu-de-listras-brancas | ins | | T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Zimmerius gracilipes</i> | Poaieiro-de-pé-fino | ins | | T5, T6, T7 | z |
| | Tyrannidae (41) Elaeniinae | <i>Tyrannulus elatus</i> | Maria-te-viu | ins | | T1 | z |
| | | <i>Myiopagis viridicata</i> | Guaracava-de-olheiras | ins | Mig | T4, T6 | z |
| | | <i>Myiopagis gaimardii</i> | Maria-pechim | ins | | T4, T5, T6 | z |
| | | <i>Myiopagis caniceps</i> | Guaracava-cinzenta | ins | | T4, T5, T6 | z |
| | | <i>Mionectes oleagineus</i> | Abre-asa-da-capoeira | oni | | T4, T5 | z |
| | | <i>Myiornis eucaudatus</i> | Maria-caçula | ins | | T4, T5, T7 | vz |
| | | <i>Lophotriccus galeatus</i> | Maria-de-penacho | ins | | T4, T5, T7 | z |
| | | <i>Hemitriccus minima</i> | Maria-sebinha | ins | | T4, T7 | z |

Continuação...

| Ordem | Família (n° spp.) Sub-Família | Espécie | Nome Popular | Dieta | Cate- goria | Área | Tipo de Regis- tro |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|---|----------------|-----------------------------|
| Passeri- formes | Tyrannidae (41) Elaeniinae | <i>Hemitriccus zosterops</i> | Maria-de-olho-branco | ins | | T6, T7 | vz |
| | | <i>Hemitriccus minor</i> | Maria-sebinha | ins | End | T4, T7 | vz |
| | | <i>Poecilotriccus capitalis</i> | Mariazinha | ins | Rara (popu- lação isolad a) | T4, T6 | vz |
| | | <i>Todirostrum chrysocrotaphum</i> | Ferreirinho-pintado | ins | | T4, T5, T6, T7 | z |
| | | <i>Rhynchocyclus olivaceus</i> | Bico-chato-oliváceo | ins | | T4 | v |
| | | <i>Tolmomyias sulphurescens</i> | Bico-chato-de-orelha-preta | ins | | T4 | vz |
| | | <i>Tolmomyias assimilis</i> | Bico-chato-da-copa | ins | | T4, T5, T6 | vz |
| | | <i>Tolmonyas flaviventris</i> | Bico-chato-amarelo | ins | | T4, T5 | vz |
| | | <i>Tolmonyas poliocephalus</i> | Bico-chato-de-cabeça-cinza | ins | | T1, T5, T6 | vz |
| | | <i>Platyrinchus platyrhynchos</i> | Patinh-de-coroa-branca | ins | | T7 | vz |
| | Fluvicolinae | <i>Terenotriccus erythrurus</i> | Maria-rabirruiva | ins | | T4 | z |
| | | <i>Myiobius barbatus</i> | Assanhadinho-de-peito- dourado | ins | | T5 | vz |
| | | <i>Contopus nigrescens</i> | Papa-moscas-preto | ins | Mig | T4, T7 | vz |
| | | <i>Lathrotriccus euleri</i> | Enferrujado | ins | Mig | T5, T6 | vz |
| | Tyraniinae | <i>Attila spadiceus</i> | Capitão-de-saíra-amarelo | ins | | T4, T6, T7 | z |
| | | <i>Rhytipterna simplex</i> | Wissia | ins | | T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Myiarchus ferox</i> | Maria-cavaleira | oni | | T1 | z |
| | | <i>Myiarchus swainsoni</i> | Irrê | oni | Mig | T4, T5, T6, T7 | z |
| | | <i>Myiarchus tuberculifer</i> | Maria-cavaleira-pequena | oni | | T1, T4, T5, T7 | z |
| | | <i>Pitangus sulphuratus</i> | Bem-te-vi | oni | | T1 | vz |
| | | <i>Megarynchus pitangua</i> | Bem-te-vi-de-bico-chato | oni | Mig | T1 | vz |
| | | <i>Myiozetetes cayenensis</i> | Bem-te-vizinho-de-asa- ferrugínea | ins | Mig | T1, T7 | vz |
| | | <i>Myiozetetes luteiventris</i> | Bem-te-vi-barulhento | ins | | T5 | z |
| | | <i>Myiodynates maculatus</i> | Bem-te-vi-rajado | oni | Mig | T1, T7 | vz |
| | | <i>Legatus leucophaeus</i> | Bem-te-vi-pirata | ins | Mig | T1, T4, T5 | z |
| | | <i>Empidonomus varius</i> | Peitica | oni | Mig | T1 | vz |
| | <i>Tyrannus melancholicus</i> | Suiriri | ins | Mig | T1, T7 | vz | |
| | Tityrinae | <i>Pachyramphus viridis</i> | Caneleiro-verde | oni | Cin | T6, T7 | z |
| | | <i>Pachyramphus castaneus</i> | Caneleiro-castanho | oni | Mig | T1, T4, T5, T6 | vz |
| | | <i>Pachyramphus marginatus</i> | Caneleiro-bordado | oni | | T4 | vz |
| | | <i>Pachyramphus validus</i> | Caneleiro-de-chapeu-negro | oni | Mig | T4 | vz |
| | | <i>Tityra semifasciata</i> | Anambé-branco-de-máscara- negra | oni | Cin | T2, T5, T7 | vz |

Continuação...

| Ordem | Família (n° spp.) Sub-Família | Espécie | Nome Popular | Dieta | Cate- goria | Área | Tipo de Regis- tro |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|--|----------------|-----------------------------|
| Passeri- formes | Pipridae (4) | <i>Pipra rubrocapilla</i> | Dançador-de-cabeça-encarnada | oni | Cin | T4, T7 | vz |
| | | <i>Machaeropterus pyrocephalus</i> | Uirapuru-cigarra | oni | Cin | T5, T6 | z |
| | | <i>Tyrannetes stolzmanni</i> | Supi | oni | | T4, T5, T7 | z |
| | | <i>Schiffornis turdinus</i> | Flautim-marrom | oni | | T4, T5 | vz |
| | Cotingidae (5) | <i>Lipaugus vociferans</i> | Cricrió ou Tropeiro | oni | Cin | T4, T5, T6, T7 | z |
| | | <i>Querula purpurata</i> | Anambé-uma | fru | Cin | T4, T5, T6 | vz |
| | | <i>Procnias alba</i> | Gainambé | fru | Ra (popu- lação isolada e difere- n- ciada) , cin | T7 | z |
| | | <i>Piprites chloris</i> | Papinho-amarelo | oni | Cin | T4, T5, T6 | z |
| | Cotingidae (5) | <i>Oxyruncus cristatus</i> | Araponga-do-horto | oni | Ra, cin | T7 | vz |
| | Hirundinidae (5) | <i>Tachycineta albiventer</i> | Andorinha-do-rio | ins | | T3 | v |
| | | <i>Phaeoprogne tapera</i> | Andorinha-do-campo | ins | Mig | T1 | vz |
| | | <i>Progne chalybea</i> | Andorinha-doméstica-grande | ins | Mig | T1 | vz |
| | | <i>Atticora fasciata</i> | Andorinha-de-faixa-branca | ins | | T3 | v |
| | | <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> | Andorinha-serradora | ins | Mig | T1 | vz |
| | Troglodytidae (4) | <i>Campylorhynchus turdinus</i> | Garrinchão | ins | | T4, T5, T6 | vz |
| | | <i>Thryothorus coraya</i> | Grrinchão-coraia | ins | | T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Troglodytes aedon</i> | Corruíra, Cambaxirra | ins | | T1 | vz |
| | | <i>Microcerculus marginatus</i> | Flautista-da-mata | ins | | T2, T4, T5, T6 | z |
| | Muscicapidae (4) Sylviinae | <i>Ramphocaenus melanurus</i> | Balança-rabo-de-bico-longo | ins | | T4, T6, T7 | vz |
| | Turdinae | <i>Turdus leucomelas</i> | Sabiá-barranqueiro | oni | Cin | T4, T6 | vz |
| | | <i>Turdus fumigatus</i> | Sabiá-da-mata | oni | Cin | T2, T4, T5 | vz |
| | | <i>Turdus albicollis</i> | Sabiá-coleira | oni | Cin | T2, T4, T5 | vz |
| | Vireonidae (5) | <i>Cyclarhis gujanensis</i> | Pitiguari | ins | Cin | T1, T7 | vz |
| | | <i>Smaragdolanus leucotis</i> | Assobiador-do-castanhal | ins | | T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Vireo olivaceus</i> | Juruviara-oliva | ins | Mig | T1 | z |
| | | <i>Hylophilus hypoxanthus</i> | Vite-vite-de-barriga-amarela | ins | | T4, T5, T6, T7 | z |
| | | <i>Hylophilus ochraceiceps</i> | Vite-vite-uirapuru | ins | | T4, T5, T6 | z |

Continuação...

| Ordem | Família (n° spp.) Sub-Família | Espécie | Nome Popular | Dieta | Cate- goria | Área | Tipo de Regis- tro |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| Passeri- formes | Emberizidae (32) Parulinae | <i>Granatellus pelzeni</i> | Polícia-do-mato | ins | | T4, T6, T7 | z |
| | | <i>Basileuterus culicivorus</i> | Pula-pula-coroado | ins | | T7 | vz |
| | | <i>Phaeothlypis rivularis</i> | Pula-pula-ribeirinho | ins | | T6 | z |
| | Coerebinae | <i>Coereba flaveola</i> | Cambacica | nec | Cin | T1, T2, T4, T5, T7 | vz |
| | | <i>Lamprospiza melanoleuca</i> | Pipira-de-bico-vermelho | oni | | T4, T5, T6 | vz |
| | Thraupinae | <i>Cissopis leveriana</i> | Tietinga | oni | Cin | T6 | v |
| | | <i>Hemithraupis guira</i> | Saíra-de-papo-preto | oni | Cin | T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Lanio versicolor</i> | Pipira-de-asa-branca | oni | Cin | T7 | v |
| | | <i>Tachyphonus cristatus</i> | Tiê-galo | oni | Cin | T4, T7 | v |
| | | <i>Tachyphonus luctuosus</i> | Pipira-de-encontro-branco | oni | Cin | T4 | v |
| | | <i>Tachyphonus rufus</i> | Pipira-preta | oni | Cin | T1 | v |
| | | <i>Ramphocelus carbo</i> | Pipira-vermelha | oni | Cin | T4 | vz |
| | | <i>Thraupis episcopus</i> | Sanhaço-da-Amazônia | oni | Cin | T1, T7 | vz |
| | | <i>Thraupis sayaca</i> | Sanhaço-cinza | oni | Cin | T1 | vz |
| | | <i>Thraupis palmarum</i> | Sanhaço-do-coqueiro | oni | Cin | T1, T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Euphonia violacea</i> | Gaturamo-verdadeiro | oni | Cin | T4 | z |
| | | <i>Euphonia chrysopasta</i> | Gaturamo-verde | oni | Cin | T4 | z |
| | | <i>Euphonia rufiventris</i> | Gaturamo-serrador | oni | Cin | T4 | vz |
| | | <i>Tangara mexicana</i> | Saíra-de-bando | oni | Cin | T1 | v |
| | | <i>Tangara punctata</i> | Saíra-negaça | oni | Cin | T7 | v |
| | <i>Dacnis cayana</i> | Saí-azul | oni | Cin | T7 | vz | |
| | <i>Chlorophanes spiza</i> | Saí-verde | oni | Cin | T7 | z | |
| | <i>Tersina viridis</i> | Saí-andorinha | oni | Cin, mig | T1, T7 | vz | |
| | Emberizinae | <i>Zonotrichia capensis</i> | Tico-tico | oni | Cin | T1 | vz |
| | | <i>Volatinia jacarina</i> | Tiziu | oni | Cin, mig | T1 | vz |
| | | <i>Arremon taciturnus</i> | Tico-tico-da-mata-de-bico-preto | oni | Cin | T4, T5, T6 | z |
| | Cardinalinae | <i>Pitylus grossus</i> | Bico-encarnado | oni | Cin | T4, T5, T6, T7 | vz |
| | | <i>Saltator maximus</i> | Tenpera-viola | oni | Cin | T6, T7 | vz |
| | | <i>Passerina cyanoides</i> | Azulão-da-mata | oni | Cin | T4 | vz |
| | Icterinae | <i>Psarocolius bifasciatus</i> | Japuaçu | oni | Cin | T4 | z |
| | | <i>Cacicus cela</i> | Xexéu | oni | Cin | T1, T4, T5, T6, T7 | vz |
| | Emberizidae (32) Icterinae | <i>Icterus cayanensis</i> | Encontro | oni | Cin | T1 | z |
| Passeridae (1) | <i>Passer domesticus</i> | Pardal | oni | | T1 | vz | |

Ordem filogenética segundo Sick (1997); número total de espécies de aves = 240.

Legenda:

Dieta (Cintra et al., 1990; Kar et al., 1990; Isler e Isler, 1987; Motta Jr., 1990; Sick, 1985, 1997):

Ins = insetívora (predomínio de insetos e outros artrópodes na dieta);
Li = inseto-carnívora (insetos e pequenos vertebrados, em proporções similares);
Oni = onívora (predomínio de insetos e/ou outros artrópodes e/ou frutos e/ou sementes);
Fru = frugívora (frutos e sementes, com predomínio de frutos);
Gra = granívora (predomínio de sementes);
Nec = nectarívora (predomínio de néctar, pequenos insetos e outros artrópodes);
Car = carnívora (predomínio de vertebrados vivos e/ou mortos na dieta).

Categorias:

En = espécie endêmica, isto é, com distribuição restrita ao território nacional (Sick, 1985) ou à Floresta Amazônica (Cracraft, 1985; Haffer, 1985);
Mig = espécie que apresenta comportamento migratório (Negret e Negret, 1981; Negret *et al.*, 1984; Sick, 1985; Cavalcanti, 1990);
Cin = cinegética (espécie com valor alimentar, comercial, criação e/ou domesticação);
Am = espécie considerada como ameaçada de extinção (Collar *et al.*, 1994; Ibama, 2003);
Ce = espécie criticamente em perigo de extinção (Ibama, 2003);
Vul = espécie ameaçada e vulnerável (Ibama, 2003);
Qa = espécie quase ameaçada de extinção (Collar *et al.*, 1994);
Ra = espécie regionalmente rara.

Áreas de registro:

T1 = Transecto 1 (jardim) – associação de Floresta Ombrófila Aberta Submontana/Aluvial com Palmeiras com floresta ombrófila densa submontana; gramado com árvores plantadas;
T2 = Transecto 2 (área da captação de água) – floresta ombrófila aberta submontana com palmeiras;
T3 = Transecto 3 (rio Itacaiúnas) – floresta ombrófila aberta submontana com palmeiras;
T4 = Transecto 4 (área da futura barragem de rejeito) – Floresta Ombrófila Aberta Submontana/Aluvial com Palmeiras e floresta ombrófila densa submontana
T5 = Transecto 5 (área do futuro alojamento) – Floresta Ombrófila Aberta Submontana/Aluvial com Palmeiras e associação de Floresta Ombrófila Aberta Submontana/Aluvial com Palmeiras com floresta ombrófila densa submontana;
T6 = Transecto 6 (área da futura cava) – floresta ombrófila aberta submontana com cipós;
T7 = Transecto 7 (área da futura pilha de estéril) – associação de Floresta Ombrófila Aberta Submontana/Aluvial com Palmeiras com floresta ombrófila densa submontana.

TABELA 2

Espécies de Aves Registradas na Região do Projeto Salobo nos Anos de 1998 e 2003

| Espécie | Nome Popular | Registros 2003 | Registros 1998 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| <i>Tinamus tao</i> | Azulona | x | x |
| <i>Tinamus major</i> | Inhambu-de-cabeça-vermelha | x | |
| <i>Tinamus guttatus</i> | Inhambu-galinha | x | x |
| <i>Crypturellus cinereus</i> | Inambu-preto | x | x |
| <i>Crypturellus soui</i> | Sururina, tururim | x | x |
| <i>Crypturellus variegatus</i> | Chororão | x | x |
| <i>Crypturellus strigulosus</i> | Inhambu-listrado | x | x |
| <i>Phalacrocorax brasilianus</i> | Biguá | | x |
| <i>Butorides striatus</i> | Socozinho | | x |
| <i>Tigrisoma lineatum</i> | Socó-boi-ferrugen | | x |
| <i>Mesembrinibis cayennensis</i> | Corocoró | | x |
| <i>Sarcoramphus papa</i> | Urubu-rei | x | x |
| <i>Coragyps atratus</i> | Urubu-de-cabeça-preta | | x |
| <i>Cathartes aura</i> | Urubu-de-cabeça-vermelha | | x |
| <i>Cathartes burrovianus</i> | Urubu-de-cabeça-amarela | x | |
| <i>Cathartes melambrotus</i> | Urubu-da-mata | x | x |
| <i>Elanoides forficatus</i> | Gavião-tesoura | | x |
| <i>Ictinia plumbea</i> | Sovi | x | x |
| <i>Accipter superciliosus</i> | Gavião-miudinho | | x |
| <i>Leucopternis albicollis</i> | Gavião-pomba-da-amazônia | | x |
| <i>Buteogallus urubitinga</i> | Gavião-preto | x | x |
| <i>Spizaetus ornatus</i> | Gavião-de-penacho | x | |
| <i>Spizaetus tyrannus</i> | Gavião-pega-macaco | | x |
| <i>Herpetotheres cachinnans</i> | Acauã | | x |
| <i>Micrastur semitorquatus</i> | Gavião-relógio | | x |
| <i>Micrastur ruficollis</i> | Gavião-caburé | x | x |
| <i>Micrastur gilvicolis</i> | Gavião-caburé | | x |
| <i>Micrastur mirandollei</i> | Tanatau | x | x |
| <i>Micrastur sp.</i> | Gavião | | x |
| <i>Daptrius ater</i> | Canção-de-anta | x | x |
| <i>Daptrius americanus</i> | Canção-grande | x | x |
| <i>Falco ruficularis</i> | Cauré | | x |
| <i>Ortalis motmot</i> | Araucuã-pequeno | | x |
| <i>Penelope pileata</i> | Jacupiranga | x | x |
| <i>Crax fasciolata</i> | Mutum-pinima | x | x |
| <i>Crax sp.</i> | Mutum | | x |
| <i>Mitu tuberosa</i> | Mutum-cavalo | x | |
| <i>Odontophorus gujanensis</i> | Uru-corcovado | x | x |
| <i>Psophia viridis</i> | Jacamim-de-costas-verdes | x | x |
| <i>Aramides cajanea</i> | Saracura-três-potes | x | x |
| <i>Aramides sp.</i> | Saracura | | x |

Continua..

| Espécie | Nome Popular | Registros 2003 | Registros 1998 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| <i>Laterallus viridis</i> | Sanã-castanha | | x |
| <i>Heliornis fulica</i> | Picaparra-do-Pará | | x |
| <i>Columba speciosa</i> | Pomba-trocal | x | |
| <i>Columba cayennensis</i> | Pomba-galega | | x |
| <i>Columba subvinacea</i> | Pomba-amargosa-da-Amazônia | x | x |
| <i>Columba plumbea</i> | Pomba-amargosa | x | |
| <i>Columbina talpacoti</i> | Rolinha-caldo-de-feijão | x | x |
| <i>Claravis pretiosa</i> | Pomba-de-espelho | | x |
| <i>Leptotila verreauxi</i> | Juriti-pupu | x | x |
| <i>Leptotila rufaxilla</i> | Juriti-gemeadeira | x | x |
| <i>Geotrygon montana</i> | Juriti-piranga | x | x |
| <i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> | Arara-azul-grande | x | x |
| <i>Ara ararauna</i> | Arara-canindé | | x |
| <i>Ara macao</i> | Arara-canga | | x |
| <i>Ara chloroptera</i> | Arara-vermelha | x | x |
| <i>Ara severa</i> | Maracanã-guaçu | | x |
| <i>Aratinga leucophthalmus</i> | Maritaca | x | x |
| <i>Pyrrhura perlata</i> | Tiriba-pérola | | x |
| <i>Pyrrhura picta</i> | Tiriba-de-testa-azul | | x |
| <i>Pyrrhura amazonum</i> | Tiriba | x | |
| <i>Forpus xanthopterygius</i> | Tuim-de-asa-azul | x | |
| <i>Brotogeris chrysopterus</i> | Periquito-de-asa-laranja | x | x |
| <i>Brotogeris sp.</i> | Periquito-de-asa-laranja | | x |
| <i>Pionites leucogaster</i> | Marianinha-de-cabeça-amarela | x | x |
| <i>Pionus menstruus</i> | Maitaca-de-cabeça-azul | x | x |
| <i>Amazona ochrocephala</i> | Papagaio-campeiro | | x |
| <i>Amazona amazonica</i> | Papagaio-do-mangue | x | x |
| <i>Amazona farinosa</i> | Papagaio-moleiro | x | x |
| <i>Deroptyus accipitrinus</i> | Anacã | x | x |
| <i>Piaya cayana</i> | Alma-de-gato | x | x |
| <i>Piaya minuta</i> | Chincoã-pequeno | | x |
| <i>Crotophaga ani</i> | Anu-preto | x | x |
| <i>Crotophaga major</i> | Anu-coroca | x | |
| <i>Tapera naevia</i> | Saci | x | |
| <i>Dromococcyx pavoninus</i> | Peixe-frito-pavonino | x | x |
| <i>Dromococcyx phasianellus</i> | Peixe-frito-verdadeiro | | x |
| <i>Otus choliba</i> | Corujinha-do-mato | x | |
| <i>Otus watsonii</i> | Corujinha-amazônica | | x |
| <i>Pulsatrix perspicillata</i> | Murucututu | | x |
| <i>Glaucidium hardyi</i> | Caburé-da-amazônia | | x |
| <i>Ciccaba virgata</i> | Coruja-de-bigodes | x | |
| <i>Nyctibius grandis</i> | Urutau-grande | x | |
| <i>Nyctibius griseus</i> | Mãe-da-lua | | x |
| <i>Lurocalis semitorquatus</i> | Tuju | x | x |
| <i>Chordeilis sp.1 Cf.</i> | Bacurau | | x |
| <i>Chordeilis sp.2 Cf.</i> | Bacurau | | x |
| <i>Nyctidromus albicollis</i> | curiango | x | x |
| <i>Nyctiphrynus ocellatus</i> | Bacurau-ocelado | | x |
| <i>Caprimulgus nigrescens</i> | Bacurau-negro | x | x |
| <i>Chaetura chapmani</i> | Tapera-escuro | | x |
| <i>Chaetura cinereiventris</i> | Andorinhão-de-barriga-cinza | x | x |
| <i>Chaetura egregia</i> | Tapera-de-garganta-branca | | x |
| <i>Chaetura spinicauda</i> | Andorinhão-de-sobre-branco | x | |

Continua...

| Espécie | Nome Popular | Registros 2003 | Registros 1998 |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| <i>Chaetura andrei</i> | Andorinhão-dp-temporal | x | |
| <i>Phaethornis superciliosus</i> | Besourão-de-rabo-branco | x | x |
| <i>Phaethornis ruber</i> | Rabo-branco-rubro | x | |
| <i>Campylopterus largipennis</i> | Asa-de-sabre-cinza | | x |
| <i>Thalurania furcata</i> | Beija-flor-de-barriga-violeta | x | x |
| <i>Amazilia fimbriata</i> | Beija-flor-de-garganta-verde | | x |
| <i>Polyplancta aurescens</i> | Beija-flor-estrela | | x |
| <i>Heliothryx aurita</i> | Beija-flor-de-bochecha-azul | x | x |
| <i>Helimaster longirostris</i> | Bico-reto-cinzento | x | |
| <i>Trogon melanurus</i> | Surucuá-de-cauda-preta | x | x |
| <i>Trogon viridis</i> | Surucuá-de-barriga-dourada | x | x |
| <i>Trogon collaris</i> | Surucuá-de-coleira | | x |
| <i>Trogon rufus</i> | Surucuá-de-barriga-amarela | | x |
| <i>Trogon curucui</i> | Surucuá-de-cora-azul | x | |
| <i>Trogon violaceus</i> | Surucuá-pequeno | x | x |
| <i>Chloroceryle amazona</i> | Martim-pescador-verde | | x |
| <i>Chloroceryle aenea</i> | Martim-pescador-anão | | x |
| <i>Momotus momota</i> | Udu-de-coroa-azul | x | x |
| <i>Brachygalba lugubris</i> | Ariramba-parda | | x |
| <i>Galbula albirostris</i> | Ariramba-de-bico-amarelo | | x |
| <i>Galbula cyanicollis</i> | Ariramba-de-bico-amarelo | x | x |
| <i>Galbula ruficauda</i> | Ariramba-de-cauda-ruiva | x | x |
| <i>Galbula dea</i> | Ariramba-do-paraíso | x | |
| <i>Jacamerops aurea</i> | Jacamaraçu | x | x |
| <i>Notharchus macrorhynchus</i> | Capitão-do-mato | x | x |
| <i>Notharchus tectus</i> | Macuru-pintado | x | x |
| <i>Bucco tamatia</i> | Rapazinho-carijó | x | |
| <i>Bucco capensis</i> | Rapazinho-de-colar | | x |
| <i>Nystalus striolatus</i> | Rapazinho-estriado | x | x |
| <i>Malacoptila rufa</i> | Barbudo-de-pescoço-ferrugen | | x |
| <i>Monasa nigrifrons</i> | Bico-de-brasa | | x |
| <i>Monasa morphoeus</i> | Bico-de-brasa-de-testa-branca | x | x |
| <i>Chelidoptera tenebrosa</i> | Urubuzinho | x | x |
| <i>Pteroglossus aracari</i> | Araçari-de-bico-branco | x | x |
| <i>Pteroglossus inscriptus</i> | Araçari-miúdo-de-bico-riscado | x | x |
| <i>Selenidera gouldii</i> | Araçari-de-gould | x | x |
| <i>Ramphastos vitellinus</i> | Tucano-de-bico-preto | x | x |
| <i>Ramphastos tucanus</i> | Tucano-grande-de-papo-brando | x | x |
| <i>Picumnus aurifrons</i> | Pic-pau-anão-amarelo | x | |
| <i>Piculus flavigula</i> | Pica-pau-bufador | x | x |
| <i>Piculus leucolaenus</i> | Pica-pau-de-garganta-branca | | x |
| <i>Celeus elegans</i> | Pica-pau-chocolate | | x |
| <i>Celeus grammicus</i> | Pica-pau-escamoso | x | x |
| <i>Celeus flavus</i> | Pica-pau-amarelo | x | x |
| <i>Celeus torquatus</i> | Pica-pau-de-coleira | | x |

Continua...

| Espécie | Nome Popular | Registros 2003 | Registros 1998 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| <i>Dryocopus lineatus</i> | Pica-pau-de-banda-branca | x | |
| <i>Dryocopus lineatus</i> | Pica-pau-de-banda-branca | | x |
| <i>Melanerpes cruentatus</i> | Pica-pau-de-barriga-vermelha | x | x |
| <i>Veniliornis affinis</i> | Pica-pau-de-asa-vermelha | x | x |
| <i>Campephilus melanoleucos</i> | Pica-pau-de-topete-vermelho | x | x |
| <i>Campephilus rubricollis</i> | Pica-pau-de-barriga-vermelha | x | x |
| <i>Cymbilaimus lineatus</i> | Choró | x | x |
| <i>Taraba major</i> | Choró-boi | x | x |
| <i>Sakesphorus luctuosus</i> | Choca-d'água | x | x |
| <i>Thamnophilus punctatus</i> | Choca-bate-cabo | | x |
| <i>Thamnophilus aethiops</i> | Choca-lisa | | x |
| <i>Thamnophilus schistaceus</i> | Choca-de-olho-vermelho | x | |
| <i>Thamnophilus schistaceus</i> | Choca-de-olho-vermelho | | x |
| <i>Thamnophilus sp.</i> | Choca-de-olho-vermelho | | x |
| <i>Thamnophilus amazonicus</i> | Choca-canela | | x |
| <i>Pygiptila stellaris</i> | Choca-cantadora | x | x |
| <i>Thamnomanes caesioides</i> | Uirapuru-de-bando | x | x |
| <i>Myrmotherula surinamensis</i> | Choquinha-estriada | | x |
| <i>Myrmotherula multistriata</i> | Choquinha | x | |
| <i>Myrmotherula axillaris</i> | Choquinha-de-flancos-brancos | x | x |
| <i>Myrmotherula huxwelli</i> | Choquinha-de-garganta-clara | x | x |
| <i>Myrmotherula leucophthalma</i> | Choquinha-de-olho-branco | x | x |
| <i>Myrmotherula ornata</i> | Choquinha-ornada | x | x |
| <i>Myrmotherula brachyura</i> | Choquinha-miúda | x | x |
| <i>Myrmotherula longipennis</i> | Choquinha-de-asa-lisa | x | x |
| <i>Myrmotherula menetriesii</i> | Choquinha-de-garganta-cinza | x | x |
| <i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> | Chorozinho-de-asa-ruiva | x | x |
| <i>Herpsilochmus stictocephalus</i> | Chorozinho-de-cabeça-pintada | x | |
| <i>Formicivora grisea</i> | Formigueiro-pardo | | x |
| <i>Cercomacra cinerascens</i> | Chororó-pocua | x | x |
| <i>Cercomacra nigrescens</i> | Chororó-preto | x | x |
| <i>Pyriglena leuconota</i> | Papa-taoca | x | x |
| <i>Myrmoborus leucophrys</i> | Papa-formigas-de-sobrancelha | x | x |
| <i>Myrmoborus myiotherinus</i> | Formigueiro-de-cara-preta | x | x |
| <i>Hypocnemis cantator</i> | Papa-formigas-cantador | x | x |
| <i>Hypocnemoides maculicauda</i> | Solta-asa-do-sul | x | x |
| <i>Sclateria naevia</i> | Papa-formigas-do-igapê | x | |
| <i>Myrmeciza atrothorax</i> | Formigueiro-de-peito-branco | | x |
| <i>Hylophylax naevia</i> | Guarda-floresta | x | x |
| <i>Hylophylax poecilinota</i> | Rendadinho | x | x |
| <i>Hylophylax punctulata</i> | Guarda-varzea | | x |
| <i>Phlegopsis nigromaculata</i> | Mãe-de-taoca-pintada | x | x |
| <i>Formicarius colma</i> | Pinto-da-mata-coroado | x | x |
| <i>Formicarius analis</i> | Pinto-da-mata-de-cara-preta | x | x |
| <i>Grallaria varia</i> | Tovacuçu-malhado | x | x |

Continuação...

| Espécie | Nome Popular | Registros 2003 | Registros 1998 |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Hylopezus macularius</i> | Torom-carijó | x | x |
| <i>Hylopezus berlepschi</i> | Torom-torom | x | |
| <i>Conopophaga melanogaster</i> | Chupa-dente-grande | | x |
| <i>Conopophaga aurita</i> | Chupa-dente-cinta | x | x |
| <i>Synallaxis rutilans</i> | João-teneném-castanho | x | x |
| <i>Synallaxis cherriei</i> | Puruchém | x | x |
| <i>Berlepschia rikeri</i> | Limpa-folha-do-buriti | x | |
| <i>Philydor pyrrhodes</i> | Limpa-folha-vermelho | | x |
| <i>Philydor erythrocerus</i> | Limpa-folha-de-sobre-ruiivo | x | x |
| <i>Automolus infuscatus</i> | Barranqueiro-pardo | x | x |
| <i>Automolus rufipileatus</i> | Barranqueiro-de-coroa-castanha | x | x |
| <i>Xenops minutus</i> | Bico-virado-miúdo | x | x |
| <i>Sclerurus mexicanus</i> | Vira-folha-de-peito-vermelho | | x |
| <i>Sclerurus rufigularis</i> | Vira-folha-de-bico-curto | x | x |
| <i>Dendrocincla fuliginosa</i> | Arapaçu-pardo | x | x |
| <i>Dendrocincla merula</i> | Arapaçu-da-taoca | | x |
| <i>Deconychura longicauda</i> | Arapaçu-rabudo | x | x |
| <i>Sittasomus griseicapillus</i> | Arapaçu-verde | x | x |
| <i>Glyphorhynchus spirurus</i> | Arapaçu-de-bico-de-cunha | x | x |
| <i>Nasica longirostris</i> | Arapaçu-de-bico-comprido | | x |
| <i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> | Arapaçu-vermelho | | x |
| <i>Xiphocolaptes carajensis</i> | Arapaçu | x | |
| <i>Dendrexetastes rufigula</i> | Arapaçu-canela | | x |
| <i>Hylexetastes brigidai</i> | Arapaçu-de-louro-cinza | | x |
| <i>Dendrocolaptes certhia</i> | Arapaçu-barrado | x | x |
| <i>Dendrocolaptes picumnus</i> | Arapaçu-meio-barrado | x | x |
| <i>Xiphorhynchus picus</i> | arapaçu-de-bico-branco | | x |
| <i>Xiphorhynchus guttatus</i> | Arapaçu-de-garganta-amarela | x | x |
| <i>Xiphorhynchus obsoletus</i> | Arapaçu-riscado | | x |
| <i>Xiphorhynchus ocellatus</i> | Arapaçu-ocelado | | x |
| <i>Xiphorhynchus spixii</i> | Arapaçu-de-spix | x | x |
| <i>Lepidocolaptes albolineatus</i> | Arapaçu-de-listras-brancas | x | x |
| <i>Zimmerius gracilipes</i> | Poaieiro-de-pé-fino | x | x |
| <i>Ornithion inerme</i> | Poaieiro-de-sobrancelha | | x |
| <i>Camptostoma obsoletum</i> | Risadinha | | x |
| <i>Tyrannulus elatus</i> | Maria-te-viu | x | x |
| <i>Myiopagis viridicata</i> | Guaracava-de-olheiras | x | x |
| <i>Myiopagis gaimardii</i> | Maria-pechim | x | x |
| <i>Myiopagis caniceps</i> | Guaracava-cinzenta | x | x |
| <i>Mionectes oleagineus</i> | Abre-asa-da-capoeira | x | x |
| <i>Leptopogon amaurocephalus</i> | Cabeçudo | | x |
| <i>Myiornis ecaudatus</i> | Maria-caçula | x | x |
| <i>Lophotriccus galeatus</i> | Maria-de-penacho | x | |
| <i>Poecilotriscus (=Taeniotriccus) andrei</i> | Maria-bonita | | x |
| <i>Hemitriccus minor</i> | Maria-sebinha | x | x |

Continua...

| Espécie | Nome Popular | Registros 2003 | Registros 1998 |
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
| <i>Hemitriccus zosterops</i> | Maria-de-olho-branco | x | x |
| <i>Hemitriccus minima</i> | Maria-sebinha | x | x |
| <i>Poecilotriccus capitalis</i> | Mariazinha | x | x |
| <i>Todirostrum cinereum</i> | Ferreirinho-relógio | | x |
| <i>Todirostrum maculatum</i> | Ferreirinho-estriado | | x |
| <i>Todirostrum sylvia</i> | Ferreirinho-da-capoeira | | x |
| <i>Todirostrum chrysocrotaphum</i> | Ferreirinho-pintado | x | |
| <i>Ramphotrigon ruficauda</i> | Bico-chato-de-rabo-vermelho | | x |
| <i>Rhynchocyclus olivaceus</i> | Bico-chato-oliváceo | x | x |
| <i>Tolmomyias sulphurescens</i> | Bico-chato-de-orelha-preta | x | x |
| <i>Tolmomyias assimilis</i> | Bico-chato-da-copa | x | |
| <i>Tolmomyas poliocephalus</i> | Bico-chato-de-cabeça-cinza | x | x |
| <i>Tolmomyas flaviventris</i> | Bico-chato-amarelo | x | x |
| <i>Platyrinchus saturatus</i> | Patinho-escuro | | x |
| <i>Platyrinchus platyrhynchos</i> | Patinh-de-coroa-branca | x | x |
| <i>Terentotriccus erythrurus</i> | Maria-rabirruiva | x | x |
| <i>Myiobius barbatus</i> | Assanhadinho-de-peito-dourado | x | x |
| <i>Myiobius atricaudus</i> | Assanhadinho-de-cauda-preta | | x |
| <i>Contopus nigrescens</i> | Papa-moscas-preto | x | x |
| <i>Lathrotriccus euleri</i> | Enferrujado | x | x |
| <i>Colonia colonus</i> | Maria-viuvinha | | x |
| <i>Attila spadiceus</i> | Capitão-de-saíra-amarelo | x | x |
| <i>Attila cinnamomeus</i> | Capitão-de-saíra-ferrugen | | x |
| <i>Rhytipterna simplex</i> | Wissíá | x | x |
| <i>Laniocera hypopyrrha</i> | Maria-pintada | | x |
| <i>Myiarchus ferox</i> | Maria-cavaleira | x | x |
| <i>Myiarchus swainsoni</i> | Irrê | x | x |
| <i>Myiarchus tuberculifer</i> | Maria-cavaleira-pequena | x | x |
| <i>Pitangus sulphuratus</i> | Bem-te-vi | x | x |
| <i>Philohydor (=Pitangus) lictor</i> | Bem-te-vi-no-brejo | | x |
| <i>Megarynchus pitangua</i> | Bem-te-vi-de-bico-chato | x | x |
| <i>Myiozetetes cayenensis</i> | Bem-te-vizinho-de-asa-ferrugínea | x | x |
| <i>Myiozetetes similis</i> | Bem-te-vizinho-de-coroa-vermelha | | x |
| <i>Myiozetetes luteiventris</i> | Bem-te-vi-barulhento | x | x |
| <i>Myiodynates maculatus</i> | Bem-te-vi-rajado | x | x |
| <i>Legatus leucophaeus</i> | Bem-te-vi-pirata | x | x |
| <i>Empidonomus varius</i> | Peitica | x | x |
| <i>Tyrannopsis sulphurea</i> | Suiriri-de-garganta-rajada | | x |
| <i>Tyrannus melancholicus</i> | Suiriri | x | x |
| <i>Pachyramphus viridis</i> | Caneleiro-verde | x | |
| <i>Pachyramphus castaneus</i> | Caneleiro-castanho | x | x |
| <i>Pachyramphus marginatus</i> | Caneleiro-bordado | x | x |
| <i>Pachyramphus validus</i> | Caneleiro-de-chapeu-negro | x | x |
| <i>Pachyramphus (=Platysaris) minor</i> | Caneleiro-pequeno | | x |
| <i>Tityra semifasciata</i> | Anambé-branco-de-máscara-negra | x | x |
| <i>Pipra rubrocapilla</i> | Dançador-de-cabeça-encarnada | x | x |

Continua...

| Espécie | Nome Popular | Registros 2003 | Registros 1998 |
|---------|--------------|----------------|----------------|
|---------|--------------|----------------|----------------|

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---|---|
| <i>Pipra iris</i> | Dançador-de-coroa-prateada | | x |
| <i>Pipra fasciicauda</i> | Dançador-laranja | | x |
| <i>Chiroxiphia pareola</i> | Tangará-de-casta-azul | | x |
| <i>Machaeropterus pyrocephalus</i> | Uirapuru-cigarra | x | |
| <i>Tyranneutes stolzmanni</i> | Supi | x | x |
| <i>Schiffornis turdinus</i> | Flautim-marrom | x | x |
| <i>Cotinga cayana</i> | Anambé-pintado | | x |
| <i>Cotinga cotinga</i> | Anambé-de-peito-roxo | | x |
| <i>Xipholena lamellipennis</i> | Anambé-de-cauda-branca | | x |
| <i>Lipaugus vociferans</i> | Cricrió ou Tropeiro | x | x |
| <i>Querula purpurata</i> | Anambé-uma | x | x |
| <i>Gymnoderus foetidus</i> | Anambé-pombo | | x |
| <i>Procnias alba</i> | Gainambé | x | x |
| <i>Piprites chloris</i> | Papinho-amarelo | x | x |
| <i>Oxyruncus cristatus</i> | Araponga-do-horto | x | |
| <i>Tachycineta albiventer</i> | Andorinha-do-rio | x | x |
| <i>Phaeoprogne tapera</i> | Andorinha-do-campo | x | |
| <i>Progne chalybea</i> | Andorinha-doméstica-grande | x | x |
| <i>Atticora fasciata</i> | Andorinha-de-faixa-branca | x | x |
| <i>Neochelidon tibialis</i> | Andorinha-de-coxa-branca | | x |
| <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> | Andorinha-serradora | x | x |
| <i>Riparia riparia</i> | Andorinha-do-barranco | | x |
| <i>Hirundo rustica</i> | Andorinha-de-bando | | x |
| <i>Campylorhynchus turdinus</i> | Garrinchão | x | x |
| <i>Donacobius atricapillus</i> | Japacamim | | x |
| <i>Thryothorus coraya</i> | Grrinchão-coraia | x | x |
| <i>Troglodytes aedon</i> | Corruíra, Cambaxirra | x | x |
| <i>Microcerculus marginatus</i> | Flautista-da-mata | x | x |
| <i>Cyphorhinus aradus</i> | Músico-da-mata | | x |
| <i>Ramphocaenus melanurus</i> | Balança-rabo-de-bico-longo | x | x |
| <i>Poliophtila plumbea</i> | Balança-rabo-de-chapéu-preto | | x |
| <i>Turdus leucomelas</i> | Sabiá-barranqueiro | x | |
| <i>Turdus fumigatus</i> | Sabiá-da-mata | x | x |
| <i>Turdus albicollis</i> | Sabiá-coleira | x | x |
| <i>Cyclarhis gujanensis</i> | Pitiguari | x | x |
| <i>Smaragdolanus leucotis</i> | Assobiador-do-castanhal | x | x |
| <i>Vireo olivaceus</i> | Juruviara-oliva | x | |
| <i>Hylophilus semicinereus</i> | Vite-vite-de-cabeça-verde | | x |
| <i>Hylophilus muscicapinus</i> | Vite-vite-camurça | | x |
| <i>Hylophilus sp.</i> | Vite-vite | | x |
| <i>Hylophilus hypoxanthus</i> | Vite-vite-de-barriga-amarela | x | x |
| <i>Hylophilus ochraceiceps</i> | Vite-vite-uirapuru | x | x |
| <i>Granatellus pelzeni</i> | Polícia-do-mato | x | x |
| <i>Basileuterus culicivorus</i> | Pula-pula-coroado | x | x |
| <i>Phaeothlypis rivularis</i> | Pula-pula-ribeirinho | x | x |
| <i>Coereba flaveola</i> | Cambacica, Cega-cebo | x | x |

Continua...

| Espécie | Nome Popular | Registros 2003 | Registros 1998 |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Lamprospiza melanoleuca</i> | Pipira-de-bico-vermelho | x | x |
| <i>Cissopis leveriana</i> | Tietinga | x | |
| <i>Hemithraupis guira</i> | Saíra-de-papo-preto | x | x |
| <i>Lanio versicolor</i> | Pipira-de-asa-branca | x | x |
| <i>Tachyphonus cristatus</i> | Tiê-galo | x | x |
| <i>Tachyphonus luctuosus</i> | Pipira-de-encontro-branco | x | x |
| <i>Tachyphonus rufus</i> | Pipira-preta | x | x |
| <i>Ramphocelus carbo</i> | Pipira-vermelha | x | x |
| <i>Thraupis episcopus</i> | Sanhaço-da-Amazônia | x | x |
| <i>Thraupis sayaca</i> | Sanhaço-cinza | x | |
| <i>Thraupis palmarum</i> | Sanhaço-do-coqueiro | x | x |
| <i>Euphonia violacea</i> | Gaturamo-verdadeiro | x | x |
| <i>Euphonia chrysopasta</i> | Gaturamo-verde | x | x |
| <i>Euphonia rufiventris</i> | Gaturamo-serrador | x | x |
| <i>Tangara mexicana</i> | Saíra-de-bando | x | x |
| <i>Tangara punctata</i> | Saíra-negaça | x | x |
| <i>Tangara gyrola</i> | Saíra-de-cabeça-castanha | | x |
| <i>Dacnis cayana</i> | Saí-azul | x | |
| <i>Chlorophanes spiza</i> | Saí-verde | x | x |
| <i>Cyanerpes cyaneus</i> | Saí-beija-flor | | x |
| <i>Tersina viridis</i> | Saí-andorinha | x | x |
| <i>Zonotrichia capensis</i> | Tico-tico | x | |
| <i>Volatinia jacarina</i> | Tiziu | x | x |
| <i>Sporophila ardesiaca</i> | Baiano | | x |
| <i>Oryzoborus maximiliani</i> | Bicudo | | x |
| <i>Arremon taciturnus</i> | Tico-tico-da-mata-de-bico-preto | x | x |
| <i>Caryothraustes humeralis</i> | Furriel-de-encontro | | x |
| <i>Pitylus grossus</i> | Bico-encarnado | x | x |
| <i>Saltator maximus</i> | Tenpera-viola | x | x |
| <i>Saltador caeruleus</i> | Trinca-ferro-cinza | | x |
| <i>Passerina cyanooides</i> | Azulão-da-mata | x | x |
| <i>Psarocolius decumanus</i> | Japu-preto ou Rei-congo | | x |
| <i>Psarocolius viridis</i> | Japu-verde | | x |
| <i>Psarocolius bifasciatus</i> | Japuçu | x | |
| <i>Cacicus cela</i> | Xexéu | x | x |
| <i>Cacicus haemorrhous</i> | Guaxe | | x |
| <i>Icterus cayanensis</i> | Encontro | x | x |
| <i>Scaphidura orzivora</i> | Graúna | | x |
| <i>Passer domesticus</i> | Pardal | x | |

Ordem filogenética segundo Sick (1997); número total de espécies de aves = 360.

TABELA 3

Espécies de Aves Registradas pelo Museu Paraense Emílio Goeldi entre os Anos de 1983 a 1986 na Floresta Nacional de Carajás

| Ordem | Família | Espécie | Nome Popular |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Tinamiformes | Tinamidae | <i>Crypturellus cinereus</i> | Inambu-preto |
| | | <i>Crypturellus soui</i> | Sururina, tururim |
| | | <i>Crypturellus strigulosus</i> | Inhambú-listrado |
| | | <i>Crypturellus parvirostris</i> | Inhambú-chororó |
| Podicipediformes | Podicipedidae | <i>Tachybaptus dominicus</i> | Mergulhão-pequeno |
| Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | <i>Phalacrocorax brasilianus</i> | Biguá |
| | Anhingidae | <i>Anhinga anhinga</i> | Biguatinga |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Ardea cocoi</i> | Garça-moura |
| | | <i>Butorides striatus</i> | Socozinho |
| | | <i>Pilherodius pileatus</i> | Garça-real |
| | Cathartidae | <i>Sarcoramphus papa</i> | Urubu-rei |
| | | <i>Coragyps atratus</i> | Urubu-de-cabeça-preta |
| | | <i>Cathartes aura</i> | Urubu-de-cabeça-vermelha |
| Falconiformes | Accipitridae | <i>Gampsonyx swainsonii</i> | Gaviãozinho |
| | | <i>Elanoides forficatus</i> | Gavião-tesoura |
| | | <i>Harpagus diodon</i> | Gavião-bombachinha |
| | | <i>Harpagus bidentatus</i> | Gavião-ripina |
| | | <i>Ictinia plumbea</i> | Sovi |
| | | <i>Buteo nitidus</i> | Gavião-pedrez |
| | | <i>Buteo brachyurus</i> | Gavião-de-cauda-curta |
| | | <i>Rupornis magnirostris</i> | Gavião-carijó |
| | | <i>Leucopternis albicollis</i> | Gavião-pomba-da-amazônia |
| | | <i>Buteogallus urubitinga</i> | Gavião-preto |
| | | <i>Spizaetus ornatus</i> | Gavião-de-penacho |
| | Falconidae | <i>Herpetotheres cachinnans</i> | Acauã |
| | | <i>Micrastur gilvicollis</i> | Gavião-caburé |
| | | <i>Daptrius ater</i> | Canção-de-anta |
| | | <i>Daptrius americanus</i> | Canção-grande |
| | | <i>Falco rufigularis</i> | Cauré |
| | Galliformes | Cracidae | <i>Ortalis motmot</i> |
| <i>Penelope superciliaris</i> | | | Jacupenba |
| <i>Pipile cujubi</i> | | | Jacu |
| <i>Penelope pileata</i> | | | Jacupiranga |
| <i>Crax fasciolata</i> | | | Mutum-pinima |
| <i>Mitu mitu</i> | | | Mutum-do-nordeste |
| Phasianidae | | <i>Odontophorus gujanensis</i> | Uru-corcovado |
| Opisthocomiformes | Opisthocomidae | <i>Opisthocomus hoazin</i> | Cigana |
| Gruiformes | Psophiidae | <i>Psophia viridis</i> | Jacamim-de-costas-verdes |
| | | <i>Amaurolimmus concolor</i> | Saracurinha-da-mata |
| | | <i>Laterallus viridis</i> | Sanã-castanha |
| Charadriiformes | Jacanidae | <i>Jacana jacana</i> | jacana ou cafezinho |
| | | <i>Vanellus chilensis</i> | Quero-quero |
| | | <i>Hoploxypterus cayanus</i> | Mexeriqueira |

Continuação...

| Ordem | Família | Espécie | Nome Popular |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius collaris</i> | Batuíra-de-coleira |
| | | <i>Tringa solitaria</i> | Maçarico-solitário |
| | | <i>Tringa flavipes</i> | Maçarico-de-perna-amarela |
| | | <i>Tringa melanoleuca</i> | Maçarico-grande-perna-amarela |
| | | <i>Actitis macularia</i> | Maçarico-pintado |
| | | <i>Calidris fuscicollis</i> | Maçarico-de-sobre-branco |
| | | <i>Calidris himantopus</i> | Maçarico-pernilongo |
| | | <i>Gallinago paraguayae</i> | Narceja |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columba speciosa</i> | Pomba-trocal |
| | | <i>Columba subvinacea</i> | Pomba-amargosa-da-Amazônia |
| | | <i>Columbina talpacoti</i> | Rolinha-caldo-de-feijão |
| | | <i>Claravis pretiosa</i> | Pomba-de-espelho |
| | | <i>Leptotila verreauxi</i> | Juriti-pupu |
| | | <i>Leptotila rufaxilla</i> | Juriti-genedeira |
| | | <i>Geotrygon montana</i> | Juriti-piranga |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> | Arara-azul-grande |
| | | <i>Ara chloroptera</i> | Arara-vermelha |
| | | <i>Ara severa</i> | Maracanã-guaçu |
| | | <i>Aratinga leucophthalmus</i> | Maritaca |
| | | <i>Aratinga solstitialis</i> | Jandaia |
| | | <i>Pyrrhura perlata</i> | Tiriba-peróla |
| | | <i>Pyrrhura picta</i> | Tiriba-de-testa-azul |
| | | <i>Brotogeris chrysopterus</i> | Periquito-de-asa-laranja |
| | | <i>Pionites leucogaster</i> | Marianinha-de-cabeça-amarela |
| <i>Pionus menstruus</i> | Maitaca-de-cabeça-azul | | |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Coccyzus melacoryphus</i> | Papa-lagarta—acanelado |
| | | <i>Piaya cayana</i> | Alma-de-gato |
| | | <i>Crotophaga ani</i> | Anu-preto |
| | | <i>Crotophaga major</i> | Anu-coroca |
| | | <i>Tapera naevia</i> | Saci-sem-fim |
| Strigiformes | Tytonidae | <i>Tyto alba</i> | Suindara |
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | <i>Lurocalis senitoquartus</i> | Tuju |
| | | <i>Nyctidromus albicollis</i> | curiango |
| | | <i>Caprimulgus parvulus</i> | Bacurau-chintã |
| | | <i>Caprimulgus nigrescens</i> | Bacurau-negro |
| | | <i>Hydropsalis brasiliiana</i> | Curiango-tesoura |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Chaetura spinicauda</i> | Andorinhão-de-sobre-branco |
| | | <i>Chaetura brachyura</i> | Andorinhão-de-rabo-curto |
| | | <i>Panyptila cayennensis</i> | Taperá-tesoura |
| | | <i>Reinarda squamata</i> | Taperá-do-buriti |
| | Trochilidae | <i>Phaethornis spencilius</i> | Besourão-de-rabo-branco |
| | | <i>Phaethornis ruber</i> | Rabo-branco-rubro |
| | | <i>Campylopterus largipennis</i> | Asa-de-sabre-cinza |
| | | <i>Anthracothorax nigricollis</i> | Beija-flor-de-veste-preta |
| | | <i>Chrysolampis mosquitus</i> | Beija-flor-vermelho |
| | | <i>Thalurania furcata</i> | Beija-flor-de-barriga-violeta |
| <i>Hylocharis cyanus</i> | Beija-flor-roxo | | |
| <i>Amazilia fimbriata</i> | Beija-flor-de-garganta-verde | | |

Continuação...

| Ordem | Família | Espécie | Nome Popular |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Apodiformes | Trochilidae | <i>Heliothryx aurita</i> | Beija-flor-de-bochecha-azul |
| | | <i>Heliomaster longirostris</i> | Bico-reto-cinzento |
| Trogoniformes | Trogonidae | <i>Trogon viridis</i> | Surucuá-de-barriga-dourada |
| Coraciiformes | Alcedinidae | <i>Ceryle torquata</i> | Martim-pescador-grande |
| | | <i>Chloroceryle amazona</i> | Martim-pescador-verde |
| | | <i>Chloroceryle americana</i> | Martim-pescador-pequeno |
| | | <i>Chloroceryle inda</i> | Martim-pescador-da-mata |
| | Momotidae | <i>Momotus momota</i> | Udu-de-coroa-azul |
| Piciformes | Galbulidae | <i>Brachygalba lugubris</i> | Ariramba-parda |
| | | <i>Galbula cyanicollis</i> | Ariramba-da-mata |
| | | <i>Galbula ruficauda</i> | Ariramba-de-cauda-ruiva |
| | | <i>Jacamerops aurea</i> | Jacamaraçu |
| | Bucconidae | <i>Notharchus tectus</i> | Macuru-pintado |
| | | <i>Bucco macrodactylus</i> | Rapazinho-de-boné-vermelho |
| | | <i>Bucco capensis</i> | Rapazinho-de-colar |
| | | <i>Nystalus striolatus</i> | Rapazinho-estriado |
| | | <i>Malacoptila rufa</i> | Barbudo-de-pescoço-ferrugen |
| | | <i>Monasa nigrifrons</i> | Bico-de-brasa |
| | | <i>Monasa morphoeus</i> | Bico-de-brasa-de-testa-branca |
| | Ramphastidae | <i>Chelidoptera tenebrosa</i> | Urubuzinho |
| | | <i>Pteroglossus aracari</i> | Araçari-de-bico-branco |
| | | <i>Pteroglossus inscriptus</i> | Araçari-miúdo-de-bico-riscado |
| | | <i>Pteroglossus bitorquatus</i> | Araçari-de-nuca-vermelha |
| | | <i>Selenidera gouldii</i> | Araçari-de-gould |
| | | <i>Ramphastos vitellinus</i> | Tucano-de-bico-preto |
| | | <i>Ramphastos cuvieri</i> | Tucano |
| | Picidae | <i>Ramphastos tucanus</i> | Tucano-grande-de-papo-brando |
| | | <i>Piculus flavigula</i> | Pica-pau-bufador |
| | | <i>Piculus leucolaenus</i> | Pica-pau-de-garganta-branca |
| | | <i>Celeus flavus</i> | Pica-pau-amarelo |
| | | <i>Celeus jumanas</i> | Pica-pau-amarelo |
| | | <i>Celeus torquatus</i> | Pica-pau-de-coleira |
| | | <i>Melanerpes cruentatus</i> | Pica-pau-de-barriga-vermelha |
| | <i>Veniliornis affinis</i> | Pica-pau-de-asa-vermelha | |
| | Passeriformes | Formicariidae | <i>Cymbilaimus lineatus</i> |
| <i>Sakesphorus luctuosus</i> | | | Choca-d'água |
| <i>Thamnophilus punctatus</i> | | | Choca-bate-cabo |
| <i>Thamnophilus torquatus</i> | | | Choca-de-asa-ruiva |
| <i>Thamnophilus aethiops</i> | | | Choca-lisa |
| <i>Thamnophilus nigrocinereus</i> | | | Choca-preta-e-cinza |
| <i>Thamnophilus schistaceus</i> | | | Choca-de-olho-vermelho |
| <i>Thamnomanes caesius</i> | | | Uirapuru-de-bando |
| <i>Myrmotherula surinamensis</i> | | | Choquinha-estriada |
| <i>Myrmotherula axillaris</i> | | | Choquinha-de-flancos-brancos |
| <i>Myrmotherula hauxwelli</i> | | | Choquinha-de-garganta-clara |
| <i>Myrmotherula leucophthalma</i> | | | Choquinha-de-olho-branco |
| <i>Myrmotherula ornata</i> | | | Choquinha-ornada |
| <i>Myrmotherula brachyura</i> | | | Choquinha-miúda |

Continuação...

| Ordem | Família | Espécie | Nome Popular |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Passeriformes | Formicariidae | <i>Myrmotherula longipennis</i> | Choquinha-de-asa-lisa |
| | | <i>Myrmotherula menetriesii</i> | Choquinha-de-garganta-cinza |
| | | <i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> | Chorozinho-de-asa-ruiva |
| | | <i>Formicivora grisea</i> | Formigueiro-pardo |
| | | <i>Cercomacra cinerascens</i> | Chororó-pocua |
| | | <i>Cercomacra nigrescens</i> | Chororó-preto |
| | | <i>Pyriglena leuconota</i> | Papa-taoca |
| | | <i>Myrmoborus leucophrys</i> | Papa-formigas-de-sobrancelha |
| | | <i>Myrmoborus myotherinus</i> | Formigueiro-de-cara-preta |
| | | <i>Hypocnenis cantador</i> | Papa-formigas-cantador |
| | | <i>Percnostoloa rufifrons</i> | Formigueiro |
| | | <i>Hylophylax naevia</i> | Guarda-floresta |
| | | <i>Hylophylax poecilinota</i> | Rendadinho |
| | | <i>Hylophylax punctulata</i> | Guarda-varzea |
| | | <i>Formicarius colma</i> | Pinto-da-mata-coroado |
| | | <i>Formicarius analis</i> | Pinto-da-mata-de-cara-preta |
| | | <i>Myrmornis torquata</i> | Pinto-do-mato-carijó |
| | | <i>Grallaria varia</i> | Tovacuçu-malhado |
| | | <i>Conopophaga melanogaster</i> | Chupa-dente-grande |
| | | <i>Conopophaga aurita</i> | Chupa-dente-cinta |
| | Furnariidae | <i>Synallaxis frontalis</i> | Petrim ou Tifli |
| | | <i>Synallaxis rutilans</i> | João-teneném-castanho |
| | | <i>Synallaxis cherriei</i> | Puruchém |
| | | <i>Synallaxis scutata</i> | Estrelinha-preta |
| | | <i>Simoxenops ucayalae</i> | Limpa-folha-de-bico-virado |
| | | <i>Philydor erythrocerus</i> | Limpa-folha-de-sobre-ruivo |
| | | <i>Philydor ruficaudatus</i> | Limpa-folha-de-cauda-ruiva |
| | | <i>Automolus infuscatus</i> | Barranqueiro-pardo |
| | | <i>Automolus rufipileatus</i> | Barranqueiro-de-coroa-castanha |
| | | <i>Xenops minutus</i> | Bico-virado-miúdo |
| | | <i>Sclerurus rufigularis</i> | Vira-folha-de-bico-curto |
| | <i>Sclerurus caudacutus</i> | Vira-folha-pardo | |
| | Dendrocolaptidae | <i>Dendrocincla fuliginosa</i> | Arapaçu-pardo |
| | | <i>Dendrocincla merula</i> | Arapaçu-da-taoca |
| | | <i>Deconychura stictolaena</i> | Arapaçu-de-garganta-pintada |
| | | <i>Sittasomus griseicapillus</i> | Arapaçu-verde |
| | | <i>Glyphorhynchus spirurus</i> | Arapaçu-de-bico-de-cunha |
| | | <i>Xiphocolaptes albicollis</i> | Arapaçu-de-garganta-branca |
| | | <i>Hylexetastes perrotii</i> | Arapaçu-de-bico-velho |
| | | <i>Dendrocolaptes platyrostris</i> | Arapaçu-de-bico-preto |
| | | <i>Dendrocolaptes certhia</i> | Arapaçu-barrado |
| | | <i>Dendrocolaptes concolor</i> | Arapaçu |
| | | <i>Niphorhynchus picus</i> | arapaçu |
| <i>Xiphorhynchus picus</i> | | arapaçu-de-bico-branco | |
| <i>Xiphorhynchus guttatus</i> | | Arapaçu-de-garganta-amarela | |
| <i>Xiphorhynchus spixii</i> | | Arapaçu-de-spix | |
| <i>Lepidocolaptes albolineatus</i> | | Arapaçu-de-listras-brancas | |
| <i>Campylorhamphus procurvoides</i> | | Arapaçu-de-bico-curvo | |

Continuação...

| Ordem | Família | Espécie | Nome Popular |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Zimmerius gracilipes</i> | Poaieiro-de-pé-fino |
| | | <i>Ornithion inermis</i> | Poaieiro-de-sobrancelha |
| | | <i>Camptostoma obsoletum</i> | Risadinha |
| | | <i>Phaeomyias murina</i> | Bagageiro |
| | | <i>Tyrannulus elatus</i> | Maria-te-viu |
| | | <i>Myiopagis viridicata</i> | Guaracava-de-olheiras |
| | | <i>Elaenia parvirostris</i> | Guaracava-de-bico-pequeno |
| | | <i>Elaenia cristata</i> | Guaracava-de-topete |
| | | <i>Elaenia chiriquensis</i> | Chibum |
| | | <i>Mionectes oleagineus</i> | Abre-asa-da-capoeira |
| | | <i>Mionectes olegineus</i> | Abre-asa-da-mata |
| | | <i>Myiornis eucadatus</i> | Maria-caçula |
| | | <i>Lophotriccus galeatus</i> | Maria-de-penacho |
| | | <i>Poecilatriccus capilate</i> | Maria-bonita |
| | | <i>Hemitriccus andrei</i> | Maria-sebinha |
| | | <i>Hemitriccus minor</i> | Maria-sebinha |
| | | <i>Hemitriccus zosterops</i> | Maria-de-olho-branco |
| | | <i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> | Sebinho-de-olho-de-ouro |
| | | <i>Todirostrum cinereum</i> | Ferreirinho-relógio |
| | | <i>Rhynchocylus olivaceus</i> | Bico-chato-oliváceo |
| | | <i>Tolmomyias flaviventris</i> | Bico-chato-amarelo |
| | | <i>Platyrinchus saturatus</i> | Patinho-escuro |
| | | <i>Platyrinchus platyrhynchus</i> | Patinh-de-coroa-branca |
| | | <i>Onychorhynchus coronatus</i> | Lecre ou Maria-leque |
| | | <i>Terentotriccus erythrurus</i> | Maria-rabirruiva |
| | | <i>Myiobius barbatus</i> | Assanhadinho-de-peito-dourado |
| | | <i>Myiobius fasciatus</i> | Felipe-de-peito-riscado |
| | | <i>Contopus cinereus</i> | Papa-moscas-cinzento |
| | | <i>Lathrotriccus eulerei</i> | Enferrujado |
| | | <i>Fluvicola pica</i> | Lavadeira-de-cara-branca |
| | | <i>Colonia colonus</i> | Maria-viuvinha |
| | | <i>Hirundinea ferruginea</i> | Birro |
| | | <i>Attila spadiceus</i> | Capitão-de-saíra-amarelo |
| | | <i>Attila cinnamomeus</i> | Capitão-de-saíra-ferrugen |
| | | <i>Rhytipterna immunda</i> | Wissíá-cantor |
| | | <i>Laniocera hypopyrrha</i> | Maria-pintada |
| | | <i>Myiarchus ferox</i> | Maria-cavaleira |
| | | <i>Myiarchus swainsoni</i> | Irrê |
| | | <i>Myiarchus tuberculifer</i> | Maria-cavaleira-pequena |
| | | <i>Pitangus sulphuratus</i> | Bem-te-vi |
| | | <i>Philohydor lictor</i> | Bem-te-vi-no-brejo |
| | | <i>Megarynchus pitangua</i> | Bem-te-vi-de-bico-chato |
| | | <i>Myiozetetes cayanensis</i> | Bem-te-vizinho-de-asa-ferrugínea |
| | | <i>Myiodynastes maculatus</i> | Bem-te-vi-rajado |
| | | <i>Legatus leucophaeus</i> | Bem-te-vi-pirata |
| | | <i>Empidonomus varius</i> | Peitica |
| | | <i>Tyrannopsis sulphurea</i> | Suiriri-de-garganta-rajada |
| <i>Tyrannus melancholicus</i> | Suiriri | | |

Continuação...

| Ordem | Família | Espécie | Nome Popular |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Pachyramphus polychopterus</i> | Caneleiro-preto |
| | | <i>Tityra semifasciata</i> | Anambé-branco-de-máscara-negra |
| | Pipridae | <i>Pipra rubrocapilla</i> | Dançador-de-cabeça-encarnada |
| | | <i>Pipra iris</i> | Dançador-de-coroa-prateada |
| | | <i>Pipra fasciicauda</i> | Dançador-laranja |
| | | <i>Chiroxiphia pareola</i> | Tangará-de-casta-azul |
| | | <i>Neopelma pallescens</i> | Fruxu-do-cerradão |
| | | <i>Tyrannetes stolzmanni</i> | Supi |
| | | <i>Schiffornis turdinus</i> | Flautim-marrom |
| | Cotingidae | <i>Xipholena lamellipenis</i> | Anambé-de-cauda-branca |
| | | <i>Iodopleura isabellae</i> | Anambé-de-coroa |
| | | <i>Lipaugus vociferans</i> | Cricrió ou Tropeiro |
| | | <i>Querula purpurata</i> | Anambé-uma |
| | | <i>Gymnoderus foetidus</i> | Anambé-pombo |
| | | <i>Procnias alba</i> | Gainambé |
| | | <i>Piprites chloris</i> | Papinho-amarelo |
| | Hirundinidae | <i>Oxyruncus cristatus</i> | Araponga-do-horto |
| | | <i>Tachycineta albiventer</i> | Andorinha-do-rio |
| | | <i>Progne chalybea</i> | Andorinha-doméstica-grande |
| | | <i>Atticora melanoleuca</i> | Andorinha-de-coleira |
| | | <i>Neochelidon tibialis</i> | Andorinha-de-coxa-branca |
| | Troglodytidae | <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> | Andorinha-serradora |
| | | <i>Campylorhynchus turdinus</i> | Garrinchão |
| | | <i>Thryothorus coraya</i> | Grrinchão-coraia |
| | | <i>Troglodytes aedon</i> | Corruíra ou Cambaxirra |
| | Muscicapidae | <i>Microcerculus marginatus</i> | Flautista-da-mata |
| | | <i>Ramphocaenus melanurus</i> | Balança-rabo-de-bico-longo |
| | | <i>Polioptila guianensis</i> | Balança-rabo-da-copa |
| | | <i>Catharus fuscescens</i> | Sabiá-ferrugen |
| | | <i>Turdus leucomelas</i> | Sabiá-barranqueiro |
| | | <i>Turdus amaurochalinus</i> | Sabiá-poca |
| | | <i>Turdus fumigatus</i> | Sabiá-da-mata |
| | Vireonidae | <i>Turdus albicollis</i> | Sabiá-coleira |
| | | <i>Cyclarhis gujanensis</i> | Pitiguari |
| | | <i>Smaragdolanus leucotis</i> | Assobiador-do-castanhal |
| | | <i>Vireo olivaceus</i> | Juruviara-oliva |
| | Emberizidae | <i>Vireo altiloquus</i> | Juruviara-barbuda |
| | | <i>Basileuterus flaveolus</i> | Pula-pula-amarelo |
| | | <i>Phaeothlypis rivularis</i> | Pula-pula-ribeirinho |
| | | <i>Dendroica striata</i> | Mariquita-de-perna-clara |
| | | <i>Schistochlamys melanopis</i> | Tiê-cinza |
| | | <i>Lamprospiza melanoleuca</i> | Pipira-de-bico-vermelho |
| <i>Cissopis leveriana</i> | | Tiêtinga | |
| <i>Hemithraupis guira</i> | | Saíra-de-papo-preto | |
| <i>Tachyphonus cristatus</i> | | Tiê-galo | |
| <i>Tachyphonus luctuosus</i> | | Pipira-de-encontro-branco | |
| <i>Tachyphonus rufus</i> | | Pipira-preta | |
| <i>Thraupis episcopus</i> | Sanhaço-da-Amazônia | | |

Continuação...

| Ordem | Família | Espécie | Nome Popular |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Thraupis palmarum</i> | Sanhaço-do-coqueiro |
| | | <i>Euphonia chlorotica</i> | Vivi ou Gaturamo-fifi |
| | | <i>Euphonia violacea</i> | Gaturamo-verdadeiro |
| | | <i>Euphonia minuta</i> | Gaturamo-de-barriga-branca |
| | | <i>Tangara mexicana</i> | Saíra-de-bando |
| | | <i>Tangara punctata</i> | Saíra-negaça |
| | | <i>Tangara gyrola</i> | Saíra-de-cabeça-castanha |
| | | <i>Tangara nigrocincta</i> | Saíra-mascarada |
| | | <i>Dacnis cayana</i> | Saí-azul |
| | | <i>Chlorophanes spiza</i> | Saí-verde |
| | | <i>Cyanerpes cyaneus</i> | Saí-beija-flor |
| | | <i>Tersina viridis</i> | Saí-andorinha |
| | | <i>Zonotrichia capensis novaesi</i> | Tico-tico |
| | | <i>Ammodramus humeralis</i> | Tico-tico-do-campo |
| | | <i>Volatinia jacarina</i> | Tiziu |
| | | <i>Sporophila nigricollis</i> | Coleiro-baiano |
| | | <i>Sporophila</i> sp. | Papa-capim |
| | | <i>Oryzoborus angolensis</i> | Curió |
| | | <i>Tiaris fuliginosa</i> | Cigarra-do-coqueiro |
| | | <i>Arremon taciturnus</i> | Tico-tico-da-mata-de-bico-preto |
| | | <i>Caryothraustes humeralis</i> | Furriel-de-encontro |
| | | <i>Pitylus grossus</i> | Bico-encarnado |
| | | <i>Saltator maximus</i> | Tenpera-viola |
| | | <i>Passerina cyanoides</i> | Azulão-da-mata |
| | | <i>Psarocolius decumanus</i> | Japu-preto ou Rei-congo |
| | | <i>Psarocolius viridis</i> | Japu-verde |
| | | <i>Cacicus cela</i> | Xexéu |
| <i>Cacicus haemorrhous</i> | Guaxe | | |
| <i>Icterus cayanensis</i> | Encontro | | |
| <i>Scaphidura orzivora</i> | Graúna | | |

Ordem filogenética segundo Sick (1997); número total de espécies de aves = 230.