



ANEXO XIX-M

FICHAS INFORMATIVAS DAS PLANTAS FLORIDAS
REGISTRADAS EM S11 NO PERÍODO DE COLETA


Ficha 1

Espécie/Família	<i>Anemopaegma scabriuscula</i> (Bignoniaceae)	
Cor da flor	SEeme	
Simetria	Zigomorfa	
Soldadura da pétala	Gamopétala	
Tipo de flor	Goela	
Tamanho da flor	45 mm – muito grande	
Recurso oferecido	Pólen e néctar	
Característica do néctar	Volume: 20 µl Concentração de açúcar: 23%	
Guia de néctar	Ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Xylocopa frontalis</i> ; <i>Trigona recursa</i>	
Observações	<i>T. recursa</i> não tocou as partes sexuais da flor durante a visita	
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo C → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	


Ficha 2

Espécie/Família	<i>Vellozia glochidea</i> (Velloziaceae)	
Cor da flor	Branca	
Simetria	Actinomorfa	
Soldadura da pétala	Dialipétala	
Tipo de flor	Campânula	
Tamanho da flor	82 mm – muito grande	
Recurso oferecido	Pólen/néctar	
Característica do néctar	Volume: -	
	Concentração de açúcar: -	
Guia de néctar	Ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Apis mellifera</i> ; <i>Augochlora</i> (<i>Augochlora</i>) sp. 01, <i>Trigona</i> <i>guianae</i> , <i>Trigona recursa</i> ; besouro;	
Observação	Nenhum dos besouros observados em flores de <i>C. glochidea</i> tocou nas partes sexuais da flor.	
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo C → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	


Ficha 3

Espécie/Família	<i>Bauhinia pulchella</i> (Caesalpinoidea)	
Cor da flor	Banca	
Simetria	Zigomorfa	
Soldadura da pétala	-	
Tipo de flor	Pincel	
Tamanho da flor	98 mm – muito grande	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume: 30 µl Concentração de açúcar: 7,5 %	
Guia de néctar	Ausente	
Antese	Noturna	
Síndrome	Quiropterofilia	
Visitantes observados	-	
Observação		
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica Corpo C → Savana Estépica Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	


Ficha 4

Espécie/Família	<i>Sauvagesia tenella</i> (Ochnaceae)	
Cor da flor	Lilás	
Simetria	Zigomorfa	
Soldadura da pétala	Gamopétala	
Tipo de flor	Tubo	
Tamanho da flor	7 mm - pequena	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume: ?	
	Concentração de açúcar: ?	
Guia de néctar	Ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	-	
Observação	Geralmente ocorreu em aglomerados, com poucas plantas ocorrendo isoladamente.	
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo C → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	


Ficha 5

Espécie/Família	<i>cf. Lobelia</i> sp. 01 (Campanulaceae)	
Cor da flor	Branca	
Simetria	Zigomorfa	
Soldadura da pétala	Gamopétala	
Tipo de flor	Campânula	
Tamanho da flor	4,5 mm - pequena	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume: ?	
	Concentração de açúcar: ?	
Guia de néctar	Presente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Ceratinula</i> sp.	
Observação	Ocorre nas margens de cursos d'água, em rochas com acúmulo de matéria orgânica e pouca água corrente. Ocorre em grandes aglomerados.	
Ocorrência na área de estudo	Corpo C → Campo Brejoso;	


Ficha 6

Espécie/Família	<i>Spermacoce</i> sp. 01 (Rubiaceae)	
Cor da flor	Branca	
Simetria	Actinomorfa	
Soldadura da pétala	Gamopétala	
Tipo de flor	Campânula	
Tamanho da flor	6,1 mm - pequena	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume: ?	
	Concentração de açúcar: ?	
Guia de néctar	Ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	Vespas	
Observação	Possivelmente é visitada por pequenas abelhas.	
Ocorrência na área de estudo	Corpo C → Campo Brejoso;	

Ficha 7

Espécie/Família	<i>Cuphea</i> sp. 01 (Lythraceae)	
Cor da flor	Lilás	
Simetria	Zigomorfa	
Soldadura da pétala	Dialipétala	
Tipo de flor	Tubo	
Tamanho da flor	11 mm - média	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume: 2 µl Concentração de açúcar: 32%	
Guia de néctar	Presente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Apis mellifera</i> ; <i>Chilicola</i> (<i>Prosopoides</i>) sp. 01, <i>Coelioxys</i> (<i>ASEocoelioxys</i>) sp. 01, <i>Ceratina</i> (<i>SEewella</i>) sp6, <i>Megachile</i> (<i>Dactylomegachile</i>) sp. 01, <i>Paratrigona cfr lineata</i> <i>Trigona</i> <i>guianae</i> , <i>Trigona recursa</i> ,	
Observação		
Ocorrência na área de estudo	Corpo B→Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo C→Savana Estépica e Campo Brejoso; CorpoD→Savana Estépica e Campo Brejoso.	

Ficha 8


Espécie/Família	<i>Mimosa skinneri</i> (Mimosoidea)	
Cor da flor	Rosa	
Simetria	Actinomorfa	
Soldadura da pétala	-	
Tipo de flor	Escova	
Tamanho da flor	20 mm – média	
Recurso oferecido	Pólen	
Característica do néctar	Volume: - Concentração de açúcar: -	
Guia de néctar	-	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Apis mellifera</i> , <i>Geotrigona aequinoctialis</i> , <i>Melipona (Michmelia) seminigra pernigra</i> , <i>Trigona branneri</i> , <i>Trigona spinepes</i> , <i>Scaptotrigona postica</i> , Coleoptero	
Observação	Ocorre em aglomerados, com poucas plantas ocorrendo isoladamente.	
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo C → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	

Ficha 9

Espécie/Família	<i>Portulaca cf. brevifolia</i> (Portulacaceae)
Cor da flor	Branca
Simetria	Actinomorfa
Soldadura da pétala	Dialipétala
Tipo de flor	Aberta
Tamanho da flor	7,5 mm - pequena
Recurso oferecido	Pólen
Característica do néctar	Volume: - Concentração de açúcar: -
Guia de néctar	ausente
Antese	Diurna
Síndrome	Melitofilia
Visitantes observados	<i>Ceratinula</i> sp.
Observação	Ocorre em grandes aglomerados
Ocorrência na área de estudo	Corpo C → Campo Brejoso;



Ficha 10


Espécie/Família	<i>Ichthyothere terminalis</i> (Asteraceae)	
Cor da flor	Branca	
Simetria	Actinomorfa	
Soldadura da pétala	Gamopétala	
Tipo de flor	Inconspícua	
Tamanho da flor	1,2 mm – pequena	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume: ?	
	Concentração de açúcar: ?	
Guia de néctar	ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Ambifilia	
Visitantes observados	<i>Augochloropsis callichroa</i> , <i>Augochloropsis</i> sp., <i>Geotrigona</i> <i>aequinotialis</i> , <i>Ptilotrigona lurida</i> , <i>Tetragona</i> sp., <i>Trigona guianae</i> , <i>Trigona recurva</i> , <i>Trigona spinipes</i> , moscas, mariposas e borboletas	
Observação	Inflorescência	
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo C → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	

Ficha 11

Espécie/Família	Melastomataceae sp. 01
Cor da flor	Corola: lilás
Simetria	Actinomorfa
Soldadura da pétala	Gamopétala
Tipo de flor	Estandarte
Tamanho da flor	7 mm - pequena
Recurso oferecido	Pólen
Característica do néctar	Volume:
	Concentração de açúcar:
Guia de néctar	ausente
Antese	Diurna
Síndrome	Melitofilia
Visitantes observados	
Observação	Ainda em processo de identificação.
Ocorrência na área de estudo	Corpo C → Savana Estépica
	CorpoD → Savana Estépica



Ficha 12


Espécie/Família	<i>cf. Utricularia</i> sp. 01 (Lentibulariaceae)	
Cor da flor	Corola: amarela Anteras e estigmas: marrons	
Simetria	Zigomorfa	
Soldadura da pétala	Gamopétala	
Tipo de flor	Estandarte	
Tamanho da flor	5 mm – pequena	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume:	
	Concentração de açúcar: -	
Guia de néctar	ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	-	
Observação	Foi registrada apenas 1 planta em toda área.	
Ocorrência na área de estudo	Corpo C → Savana Estépica CorpoD → Savana Estépica	

Ficha 13


Espécie/Família	<i>Croton lobatus</i> (Euphorbiaceae)
Cor da flor	Branca
Simetria	Actinomorfa
Soldadura da pétala	Gamopétala
Tipo de flor	Aberta
Tamanho da flor	7 mm – pequena
Recurso oferecido	Néctar e pólen
Característica do néctar	Volume: ?
	Concentração de açúcar: ?
Guia de néctar	Ausente
Antese	Diurna
Síndrome	Melitofilia (?)
Visitantes observados	<i>Dialictus</i> sp.
Observação	
Ocorrência na área de estudo	Corpo C → Savana Estépica Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso



Ficha 14

Espécie/Família	<i>Solanum crinitum</i> (Solanaceae)	
Cor da flor	Corola: roxa	
Simetria	Actinomorfa	
Soldadura da pétala	Gamopétala	
Tipo de flor	Aberta	
Tamanho da flor	30 mm – grande	
Recurso oferecido	Pólen	
Característica do néctar	Volume: - Concentração de açúcar: -	
Guia de néctar	Ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Augochloropsis callichroa</i> , <i>Centris (Ptilotopus) denudans</i> , <i>Melipona (Michmelia) seminigra pernigra</i> , <i>Paratrigona cfr nuda</i>	
Observação	Anteras poricidas	
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica; Corpo C → Savana Estépica; Corpo D → Savana Estépica.	

Ficha 15


Espécie/Família	<i>Crotalaria maypuresis</i> (Caesalpinoidea)	
Cor da flor	Corola: amarela	
Simetria	Zigomorfa	
Soldadura da pétala	Dialipétala	
Tipo de flor	Estandarte	
Tamanho da flor	18 mm – média	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume: 5 µl	
	Concentração de açúcar: 36%	
Guia de néctar	Presente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Plebeia</i> sp. 01, <i>Centris</i> sp. 01	
Observação		
Ocorrência na área de estudo	Corpo C → Savana Estépica e Campo Brejoso; CorpoD → Savana Estépica e Campo Brejoso.	

Ficha 16

Espécie/Família	Faboidea sp. 01
Cor da flor	Branca
Simetria	Zigomorfa
Soldadura da pétala	Dialipétala
Tipo de flor	Estandarte
Tamanho da flor	32 mm – muito grande
Recurso oferecido	Néctar
Característica do néctar	Volume: 5 μ l
	Concentração de açúcar: 31%
Guia de néctar	Ausente
Antese	Diurna
Síndrome	Melitofilia
Visitantes observados	-
Observação	Ainda em identificação.
Ocorrência na área de estudo	Corpo C → Savana Estépica; CorpoD → Savana Estépica e Campo Brejoso.



Ficha 17


Espécie/Família	<i>cf. Manihot cf. tristis</i> (Euphorbiaceae)	
Cor da flor	SEeme	
Simetria	Actinomorfa	
Soldadura da pétala	Gamopétala	
Tipo de flor	Aberta	
Tamanho da flor	11,5 mm – média	
Recurso oferecido	Pólen e néctar	
Característica do néctar	Volume: - Concentração de açúcar: -	
Guia de néctar	Ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Apis mellifera</i> , <i>Melipona (Michmelia) seminigra</i> e vespas	
Observação		
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo C → Savana Estépica e Campo Brejoso; CorpoD → Savana Estépica e Campo Brejoso.	

Ficha 18


Espécie/Família	<i>Mandevilla hirsute</i> (Apocynaceae)
Cor da flor	Amarela
Simetria	Actinomorfa
Soldadura da pétala	Gamopétala
Tipo de flor	Campânula
Tamanho da flor	65 mm – muito grande
Recurso oferecido	Néctar
Característica do néctar	Volume: 13 µl
	Concentração de açúcar: 32%
Guia de néctar	Presente
Antese	Diurna
Síndrome	Melitofilia
Visitantes observados	<i>Eufriesea elegans</i> e borboleta
Observação	
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica; Corpo C → Savana Estépica; Corpo D → Savana Estépica.




Ficha 19

Espécie/Família	<i>cf. Lepidaploa muricata</i> (Asteraceae)	
Cor da flor	Lilás	
Simetria	Actinomorfa	
Soldadura da pétala	Gamopétala	
Tipo de flor	Tubo	
Tamanho da flor	6,5 mm – pequena	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume: 3 µl Concentração de açúcar: 30%	
Guia de néctar	Ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	-	
Observação		
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica; Corpo C → Savana Estépica; Corpo D → Savana Estépica.	


Ficha 20

Espécie/Família	<i>Cuphea annulata</i> (Lythraceae)	
Cor da flor	Laranja	
Simetria	Actinomorfa	
Soldadura da pétala	Gamopétala	
Tipo de flor	Tubo	
Tamanho da flor	19 mm – média	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume: 8 µl	
	Concentração de açúcar: 9%	
Guia de néctar	Ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Ornitofilia	
Visitantes observados	Beija flor, <i>Trigona recursa</i> , <i>Trigona guianae</i>	
Observação	O beija flor ainda não foi identificado	
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo C → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	


Ficha 21

Espécie/Família	<i>Periandra mediterranea</i> (Faboidea)	
Cor da flor	Azul	
Simetria	Zigomorfa	
Soldadura da pétala	Dialipétala	
Tipo de flor	Estandarte	
Tamanho da flor	29 mm – grande	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume: 8 µl Concentração de açúcar: 32%	
Guia de néctar	Presentes	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Euglossa (Euglossa) sp.</i>	
Observação		
Ocorrência na área de estudo	Corpo C → Savana Estépica; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	


Ficha 22

Espécie/Família	<i>Spermacoce</i> sp. 02 (Rubiaceae)	
Cor da flor	Magenta	
Simetria	Actinomorfa	
Soldadura da pétala	Gamopétala	
Tipo de flor	Campânula	
Tamanho da flor	4,2 mm – pequena	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume: ?	
	Concentração de açúcar: ?	
Guia de néctar	Ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Polinização por vespas	
Visitantes observados	-	
Observação		
Ocorrência na área de estudo	Corpo C → Savana Estépica; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	


Ficha 23

Espécie/Família	<i>Polygala</i> sp. 01 (Polygalaceae)	
Cor da flor	Rosa	
Simetria	Zigomorfa	
Soldadura da pétala	Dialipétala	
Tipo de flor	Estandarte	
Tamanho da flor	23,5 mm – grande	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume: 4 µl Concentração de açúcar: 29,5%	
Guia de néctar	Ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados		
Observação		
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	


Ficha 24

Espécie/Família	<i>Nymphoides indica</i> (Menianthaceae)	
Cor da flor	Branca	
Simetria	Actinomorfa	
Soldadura da pétala	Gamopétala	
Tipo de flor	Campânula	
Tamanho da flor	23,5 mm – grande	
Recurso oferecido	Néctar/pólen (?)	
Característica do néctar	Volume: ?	
	Concentração de açúcar: ?	
Guia de néctar	Presentes	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Apis mellifera</i> ; <i>Trigona recursa</i>	
Observação	Planta aquática	
Ocorrência na área de estudo	Corpo C → Savana Estépica.	


Ficha 25

Espécie/Família	<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (Convolvulaceae)	
Cor da flor	Azul	
Simetria	Actinomorfa	
Soldadura da pétala	Gamopétala	
Tipo de flor	Campânula	
Tamanho da flor	23,2 mm – grande	
Recurso oferecido	Pólen	
Característica do néctar	Volume: - Concentração de açúcar: -	
Guia de néctar	Ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Ceratina (SEewella) sp3</i> , <i>Trigona chanchamayoensis</i> , <i>Trigona guianae</i> , Halictidae sp., besouros.	
Observação		
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo C → Savana Estépica; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	


Ficha 26

Espécie/Família	<i>Lippia grandis</i> (Verbenaceae)	
Cor da flor	Branca	
Simetria	Zigomorfa	
Soldadura da pétala	Gamopétala	
Tipo de flor	Inconspícua	
Tamanho da flor	3,12 mm – pequena	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume: ?	
	Concentração de açúcar: ?	
Guia de néctar	Ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Psicofilia	
Visitantes observados	Borboletas	
Observação	Insetos ainda não foram identificados	
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo C → campo; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	

Ficha 27

Espécie/Família	<i>Sida</i> sp. (Malvaceae)	
Cor da flor	Amarela	
Simetria	Actinomorfa	
Soldadura da pétala	Dialipétala	
Tipo de flor	Aberta	
Tamanho da flor	18 mm – média	
Recurso oferecido	Pólen	
Característica do néctar	Volume: -	
	Concentração de açúcar: -	
Guia de néctar	ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Apis mellifera</i> , <i>Eufriesea elegans</i> , <i>Trigona recursa</i>	
Observação	Ocorre em aglomerados formando manchas	
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo C → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	


Ficha 28

Espécie/Família	<i>Dioclea virgata</i> (Fabaceae)	
Cor da flor	Lilás	
Simetria	Zigomorfa	
Soldadura da pétala	Dialipétala	
Tipo de flor	Estandarte	
Tamanho da flor	37 mm – muito grande	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume: 4 µl Concentração de açúcar: 28%	
Guia de néctar	ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Xylocopa (Neoxylocopa) grisescens.</i> , mariposa	
Observação	A mariposa não foi coletada e por isso a identificação é desconhecida.	
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo C → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	


Ficha 29

Espécie/Família	Comelinaceae	
Cor da flor	Azul	
Simetria	Zigomorfa	
Soldadura da pétala	Dialipétala	
Tipo de flor	Estandarte	
Tamanho da flor	15 mm – média	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume: 5 µl	
	Concentração de açúcar: 31%	
Guia de néctar	ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	-	
Observação	Espécie ainda não identificada	
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica e Campo Brejoso;	
	Corpo C → Savana Estépica e Campo Brejoso;	
	Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	

Ficha 30

Espécie/Família	<i>Ipomoea marabaensis</i> (Convolvulaceae)	
Cor da flor	Lilás	
Simetria	Actinomorfa	
Soldadura da pétala	Gamopétala	
Tipo de flor	Campânula	
Tamanho da flor	78 mm – muito grande	
Recurso oferecido	Pólen e néctar	
Característica do néctar	Volume: ? Concentração de açúcar: ?	
Guia de néctar	presente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Ceratina (SEewella)</i> sp.01, <i>Ceratina (SEewella)</i> sp. 08, <i>Melitoma</i> sp. 01 <i>Trigona recursa</i> , <i>Xylocopa (Neoxylocopa) frontalis</i> , Halictidae sp.	
Observação		
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo C → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	

Ficha 31


Espécie/Família	<i>Banisteriopsis cf. malifolia</i> (Malpighiaceae)	
Cor da flor	Branca	
Simetria	Actinomorfa	
Soldadura da pétala	Dialipétala	
Tipo de flor	Aberta	
Tamanho da flor	17,5 mm – média	
Recurso oferecido	Óleo	
Característica do néctar	Volume de néctar: - Concentração de açúcar: -	
Guia de néctar	ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Centris</i> sp	
Observação	Abelha não foi coletada	
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica; Corpo C → Savana Estépica; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	

Ficha 32


Espécie	Faboidea sp. 02
Cor da flor	Lilás
Simetria	Zigomorfa
Soldadura da pétala	Dialipétala
Tipo de flor	Estandarte
Tamanho da flor	18 mm – média
Recurso oferecido	Néctar
Característica do néctar	Volume: 4 µl
	Concentração de açúcar: 30%
Guia de néctar	ausente
Antese	Diurna
Síndrome	Melitofilia
Visitantes observados	-
Observação	
Ocorrência na área de estudo	Corpo C → Savana Estépica e Campo Brejoso; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.




Ficha 33

Espécie/Família	<i>Byrsonima spicata</i> (Malpighiaceae)	
Cor da flor	Amarela	
Simetria	Actinomorfa	
Soldadura da pétala	Dialipétala	
Tipo de flor	Aberta	
Tamanho da flor	17 mm – média	
Recurso oferecido	Óleo	
Característica do néctar	Volume de néctar: - Concentração de açúcar: -	
Guia de néctar	ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Paratetrapedia (Paratetrapedia)</i> sp.01	
Observação		
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Campo Brejoso; Corpo C → Savana Estépica; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	

Ficha 34

Espécie/Família	<i>Cissus erosa</i> (Vitaceae)	
Cor da flor	amarela	
Simetria	Actinomorfa	
Soldadura da pétala		
Tipo de flor	Inconspícua	
Tamanho da flor	3,5 mm – pequena	
Recurso oferecido	Néctar	
Característica do néctar	Volume: ? Concentração de açúcar: ?	
Guia de néctar	ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Trigona recursa</i>	
Observação		
Ocorrência na área de estudo	Corpo B → Savana Estépica; Corpo C → Savana Estépica; Corpo D → Savana Estépica e Campo Brejoso.	

Ficha 35

Espécie/Família	<i>Catasetum planiceps</i> (Orchidaceae)	
Cor da flor	Esverdeada	
Simetria	Zigomorfa	
Soldadura da pétala	Dialipétala	
Tipo de flor	Goela	
Tamanho da flor	18 mm – média	
Recurso oferecido	Compostos aromáticos	
Característica do néctar	Volume: - Concentração de açúcar: -	
Guia de néctar	ausente	
Antese	Diurna	
Síndrome	Melitofilia	
Visitantes observados	<i>Eulaema singuala</i> ; <i>Eulaema nigrita</i>	
Observação		
Ocorrência na área de estudo	Corpo C → Savana Estépica e Campo Brejoso; CorpoD → Savana Estépica e Campo Brejoso.	