



Convenções Cartográficas

- Divisão municipal
- Sede municipal
- Sede distrital
- Localidade
- Ferrovias
- Estradas
- Drenagens
- Espelho d'água
- Áreas urbanizadas

	Vegetação Pionira Psamífila - Composta por espécies vegetais de pequeno porte, de fisionomia reptante e herbácea, que recobrem a faixa de pós-praia, as antedunas, e as depressões interdunares, e em menor densidade as dunas móveis.
	Vegetação Subperenifólia de Dunas - vegetação de porte arbustivo/arbóreo de caráter subperenifólio, que assume função biostabilizadora das dunas.
	Vegetação Subcaducifólia de Tabuleiro - vegetação de porte arbustivo/arbóreo de caráter subcaducifólio que recobre os sedimentos da Formação Barreiras, exibindo diferentes estágios de conservação e regeneração.
	Vegetação Subcaducifólia de Várzea - vegetação de porte arbóreo-arbustivo com predomínio de Copernicia pruriens que vegeta sobre as planícies lacustres e fluviais.
	Vegetação Subcaducifólia Estacional Arbórea - vegetação densa e de porte elevado que ocupa as vertentes das cristas e morros residuais.
	Caducifólia de Catinga Arbóreo-arbustiva - a composição predominante é o estrato arbóreo que varia de 8 a 15 metros, com a presença de arbustos com uma sinúsa mais baixa e fechada e um conjunto de plantas herbáceas e gramíneas que formam um tapete vegetal que desenvolve-se apenas durante o período chuvoso.
	Vegetação Caducifólia de Catinga Arbustiva - fisionomia vegetal composta por arbustos e subarbustos com alturas inferiores a três metros, havendo ainda um estrato herbáceo que se desenvolve apenas durante o período chuvoso, exibindo diferentes estágios de conservação e regeneração.



ARQUIVO EM WORD			
Y*	30.01.2009	02.02.2009	TADÉU
VERSÃO	INÍCIO	TERMINO	REVISÃO
			OBSERVAÇÕES:
COMPLEXO INDUSTRIAL DO PECÉM SÃO GONÇALO DO AMARANTE E CAUCAIA / CE			
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA			
TÍTULO	MAPA DE VEGETAÇÃO	DATA	SET / 2009
	ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO	ESCALA	1:50.000
			09 05A