

COMAB


ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA

RUA SÃO JOSÉ, 40 - 6º ANDAR - CENTRO
20010-020 - RIO DE JANEIRO - RJ

TEL: (21) 2210-7474
FAX: (21) 2240-0475

FE043 revisão 001

FICHA DE EMERGÊNCIA



PRAESTOL E 125
(Mistura de poliacrilato disperso em polímero solúvel em água)

ASPECTO: Líquido viscoso, branco, solúvel em água, sem odor.

RISCOS

FOGO: Não inflamável. Afaste de fonte de calor ou chama.

SAÚDE: Pele: A exposição prolongada ou repetida pode causar irritação na pele.

Olhos: Pode causar irritação leve nos olhos.

Ingestão: A ingestão de grandes quantidades pode causar lesão.

Inalação: A exposição excessiva pode causar irritação às vias respiratórias superiores e aos pulmões.

EM CASO DE ACIDENTE

SE ISTO OCORRER

FAÇA ISTO



VAZAMENTO

Afaste o veículo da rodovia, desligue o motor. Isolar e sinalizar a área. Evite contato com os olhos, pele e roupas, mantenha-se a favor do vento. Em pequenos vazamentos utilize luvas de borracha e óculos Ampla Visão. Para grandes vazamentos acrescente aventais, botas de PVC ou traje completo de PVC. Construa diques de material absorvente, terra diatomácea, areia ou similar e lave a área com grande quantidade de água, porém evite que atinjam bueiros ou cursos d'água. Recolha todo material para recipientes apropriados.



FOGO

Não inflamável, em caso de incêndio evacue e isole a área. Gera vapores de risco. Em pequenos incêndios use extintor de PQS ou CO₂, em grandes incêndios use neblina de água. Utilize equipamento de respiração autônomo com pressão positiva e roupa de combate ao fogo. Se houver risco de contato com o produto utilize roupas de PVC. Dique o líquido utilizado.

POLUIÇÃO

Contenha o líquido vazado ou derramado e também o líquido utilizado no combate a incêndio para evitar a contaminação do solo, fontes de água ou subsolo.



INFORMAÇÕES AO MÉDICO

Isole a área ao redor, retire a vítima para local ventilado. Se não houver respiração, aplique respiração artificial ou oxigênio. Se houve contato com a pele ou olhos retire toda a roupa e lave imediatamente com água corrente por no mínimo 15 minutos. Se ingerido não induza ao vômito a não ser se orientado pelo médico.

Não disponível.