

Níquel (Ni) (mg/kg)

Diretriz norteadora:
BUCHMAN (2008)

PCA do Bloco BM-S-40 (B. Santos)
Período de amostragem : 25/02/2021 a 03/03/2021



		Réplicas			Estatísticas - por estação				
		Réplica 1	Réplica 2	Réplica 3	Mínimo	Mediana	Máximo	Média	DP
Estação	1	9.817	7.154	8.045	7.154	8.045	9.817	8.339	1.107
	2	7.680	6.344	6.290	6.290	6.344	7.680	6.771	0.643
	3	5.131	7.323	5.814	5.131	5.814	7.323	6.089	0.916
	4	6.449	7.285	7.562	6.449	7.285	7.562	7.099	0.473
	5	6.316	6.796	7.680	6.316	6.796	7.680	6.931	0.565
	6	5.758	7.172	6.914	5.758	6.914	7.172	6.615	0.615
Estatísticas - variação espacial	Mínimo	5.131			Metodologia analítica: USEPA 3050B ver. 02:1996. USEPA 6010C ver. 03:2007 Limite de detecção: 0.023 Limite de quantificação: 0.526 Unidade: mg/kg				
	Mediana	7.163							
	Máximo	9.817							
	Média	6.974							
	DP	0.975							

Observações:

Destaques em cinza para dados não enquadrados.

Níquel (Ni)

PCA do Bloco BM-S-40 (B. Santos)

Período de amostragem : 21/02/2021 a 05/03/2021


Diretriz norteadora: Buchman (2008)

TEL: nível de efeito limiar abaixo do qual não ocorrem efeitos adversos à biota

PEL: nível de efeito provável à ocorrência de efeitos adversos à biota



Dados brutos por estação e réplica analisada



Comparação com dados da literatura

