

Bário (Ba) (mg/kg)

Diretriz norteadora:
BUCHMAN (2008)

PCA do Bloco BM-S-40 (B. Santos)
Período de amostragem : 25/02/2021 a 03/03/2021



		Réplicas			Estatísticas - por estação				
		Réplica 1	Réplica 2	Réplica 3	Mínimo	Mediana	Máximo	Média	DP
Estação	1	34.52	25.02	30.90	25.02	30.90	34.52	30.15	3.91
	2	58.97	26.08	27.63	26.08	27.63	58.97	37.56	15.15
	3	15.89	42.01	18.97	15.89	18.97	42.01	25.62	11.65
	4	34.58	47.95	36.94	34.58	36.94	47.95	39.82	5.83
	5	20.16	19.41	28.14	19.41	20.16	28.14	22.57	3.95
	6	23.72	22.62	24.93	22.62	23.72	24.93	23.76	0.94
Estatísticas - variação espacial	Mínimo	15.89			<i>Metodologia analítica: USEPA 3050B ver. 02:1996. USEPA 6010C ver. 03:2007 Limite de detecção: 0.022 Limite de quantificação: 0.526 Unidade: mg/kg</i>				
	Mediana	27.88							
	Máximo	58.97							
	Média	29.91							
	DP	11.04							

Observações:

Destaques em cinza para dados não enquadrados.

Bário (Ba)

PCA do Bloco BM-S-40 (B. Santos)

Período de amostragem : 21/02/2021 a 05/03/2021


Diretriz norteadora: Buchman (2008)

TEL: nível de efeito limiar abaixo do qual não ocorrem efeitos adversos à biota

PEL: nível de efeito provável à ocorrência de efeitos adversos à biota



Dados brutos por estação e réplica analisada



Comparação com dados da literatura

