

Anexo 5b. Relação dos grupos taxonômicos do zooplâncton identificados para a região compreendida entre Itabapoana e Cabo Frio (RJ). Classificação de acordo com Brusca & Brusca (1990) (continua...).

TAXA ZOOPLANCTONICA
Filo Sarcomastigophora
Subfilo Sarcodina
Superclasse Rhizopoda
Classe Granuloreticulosea
Ordem Foraminiferida
Superclasse Actinopoda
Classe Acantharea
Filo Cnidaria
Superclasse Hydrozoa
Classe Hydroidomedusae
<i>Aglaura hemistoma</i> Péron & Lesueur, 1810
<i>Clytia hemisphaerica</i> (Linnaeus, 1767)
<i>Cunina octonaria</i> McCrady, 1859
<i>Eucheilota paradoxica</i> Mayer, 1900
<i>Euphysora gracilis</i> (Brooks, 1882)
<i>Laodicea minuscula</i> Vannucci, 1957
<i>Liriope tetraphylla</i> (Chamisso & Eisenhardt, 1821)
<i>Obelia dichotoma</i> Hincks, 1868
<i>Rhopalonema velatum</i> Gegenbaur, 1857
<i>Solmaris</i> sp.
<i>Zanclaea</i> sp.
Classe Siphonophora
<i>Abylopsis eschscholtzi</i> (Huxley, 1859)
<i>A. tetragona</i> (Otto, 1823)
<i>Agalma elegans</i> (Sars, 1846)
<i>A. okeni</i> Eschscholtz, 1825
<i>Bassia bassensis</i> Agassiz, 1862
<i>Ceratocymba leuckartii</i> (Huxley, 1859)
<i>Chelophyes appendiculata</i> (Eschscholtz, 1829)
<i>Diphyes bojani</i> (Eschscholtz, 1829)
<i>D. dispar</i> Chamisso & Eysenhardt, 1821
<i>Enneagonum hyalinum</i> Quoy & Gaimard, 1827
<i>Eudoxoides spiralis</i> (Bigelow, 1911)
<i>E. mitra</i> Huxley, 1859
<i>Halistemma rubrum</i> Vogt, 1852
<i>Hippopodius hippopus</i> (Forsk., 1776)
<i>Lensia conoidea</i> (Keferstein & Ehlers, 1860)
<i>L. hunter</i> Totton, 1941
<i>L. campanella</i> (Moser, 1925)
<i>L. cossack</i> Totton, 1941
<i>L. hotspur</i> Totton, 1941
<i>L. subtilis</i> (Chun, 1886)
<i>L. meteori</i> (Leloup, 1934)
<i>Muggiaea kochi</i> (Will, 1844)
<i>Nanomia bijuga</i> (Chiaje, 1841)
<i>Sulculeolaria chuni</i> (Lens & Van Riemsdijk, 1908)
<i>S. quadrivalvis</i> Blainville, 1834
Filo Ctenophora

Anexo 5b. Relação dos grupos taxonômicos do zooplâncton identificados para a região compreendida entre Itabapoana e Cabo Frio (RJ). Classificação de acordo com Brusca & Brusca (1990) (continua...).

TAXA ZOOPLANCTONICA
Filo Platyhelminthes
Classe Turbellaria
Filo Chaetognatha
Classe Sagittoidea
Ordem Apherogamphora
Família Sagittidae
<i>Sagitta bipunctata</i> Quoy & Gaimard, 1827
<i>S. enflata</i> Grassi, 1881
<i>S. friderici</i> Ritter-Záhony, 1911
<i>S. hexaptera</i> d'Orbigny, 1843
<i>S. hispida</i> Conant, 1895
<i>S. minima</i> Grassi, 1881
<i>S. serratodentata</i> Krohn, 1853
Família Pterosagittidae
<i>Pterosagitta draco</i> (Krohn, 1853)
Família Krohnittidae
<i>Krohnitta subtilis</i> (Grassi, 1881)
Filo Annelida
Classe Polychaeta
Filo Arthropoda
Subfilo Crustacea
Classe Branchiopoda
Ordem Ctenopoda (=Sidoidea)
Família Sididae
<i>Penilia avirostris</i> Dana, 1852
Ordem Onycopoda (=Polyphemoidea)
Família Podonidae
<i>Evadne spinifera</i> Müller, 1867
<i>Pleopis polyphemoides</i> (Leuckart, 1859)
<i>Podon intermedius</i> Lilljeborg, 1853
<i>Pseudevadne tergestina</i> (Claus, 1877)
Classe Maxillopoda
Subclasse Ostracoda
Ordem Myodocopa
Família Halocyprididae
<i>Conchoecia</i> sp.
Subclasse Copepoda
Ordem Calanoida
Família Acartiidae
<i>Acartia danae</i> Giesbrecht, 1889
<i>A. lilljeborgi</i> Giesbrecht, 1892
<i>A. longiremis</i> (Lilljeborg, 1853)
Família Aetideidae
<i>Aetideopsis minor</i> (Wolfenden, 1911)
<i>Aetideus giesbrechti</i> (Cleve, 1904)

Anexo 5b. Relação dos grupos taxonômicos do zooplâncton identificados para a região compreendida entre Itabapoana e Cabo Frio (RJ). Classificação de acordo com Brusca & Brusca (1990) (continua...).

TAXA ZOOPLANCTONICA
<i>Euaetideus bradyi</i> (Scott, 1909)
<i>Euchirella rostrata</i> (Claus, 1866)
<i>Gaetanus minor</i> Farran, 1905
<i>Paivella inaciae</i> Vervoort, 1965
<i>P. naporai</i> Wheeler, 1970
<i>Undeuchaeta plumosa</i> (Lubbock, 1856)
Família Augaptilidae
<i>Euaugaptilus hecticus</i> (Giesbrecht, 1889)
<i>Haloptilus acutifrons</i> (Giesbrecht, 1892)
<i>H. austini</i> Grice, 1961
<i>H. fons</i> Farran, 1908
<i>H. longicornis</i> (Claus, 1863)
<i>H. ornatus</i> (Giesbrecht, 1892)
<i>H. spiniceps</i> (Giesbrecht, 1892)
Família Calanidae
<i>Calanoides carinatus</i> (Kroyer, 1849)
<i>Mesocalanus tenuicornis</i> (Dana, 1849)
<i>Nannocalanus minor</i> (Claus, 1863)
<i>Neocalanus gracilis</i> Dana, 1849
<i>Undinula vulgaris</i>
Família Candaciidae
<i>Candacia bipinnata</i> (Giesbrecht, 1888)
<i>C. curta</i> (Dana, 1849)
<i>C. longimana</i> Claus, 1863
<i>C. pachydactyla</i> (Dana, 1848)
<i>Paracandacia bispinosa</i> (Claus, 1863)
<i>P. simplex</i> (Giesbrecht, 1889)
Família Centropagidae
<i>Centropages furcatus</i> Bjornberg, 1963
<i>Centropages velificatus</i> (Oliveira, 1947)
<i>C. violaceus</i> (Claus, 1863)
Família Clausocalanidae
<i>Clausocalanus arcuicornis</i> Dana
<i>C. furcatus</i> (Brady, 1883)
<i>C. ingens</i> Frost & Fleminger, 1968
<i>C. mastigophorus</i> (Claus, 1863)
<i>C. parapergens</i> Frost & Fleminger, 1968
<i>C. paululus</i> Farran, 1926
<i>Ctenocalanus citer</i> Heron & Bowman, 1971
<i>C. vanus</i> Giesbrecht, 1888
<i>Dolichocerea tenuis</i> (Farran, 1926)
Família Eucalanidae
<i>Eucalanus sewelli</i> Fleminger, 1973
<i>E. subcrassus</i> Giesbrecht, 1888
<i>Subeucalanus crassus</i> (Giesbrecht, 1888)
<i>S. monachus</i> (Giesbrecht, 1888)
<i>S. pileatus</i> (Giesbrecht, 1888)
<i>S. subtenuis</i> (Giesbrecht, 1888)
<i>Rhincalanus cornutus</i> (Dana, 1849)
<i>R. nasutus</i> Giesbrecht, 1888

Anexo 5b. Relação dos grupos taxonômicos do zooplâncton identificados para a região compreendida entre Itabapoana e Cabo Frio (RJ). Classificação de acordo com Brusca & Brusca (1990) (continua...).

TAXA ZOOPLANCTONICA
Família Euchaetidae
<i>Euchaeta marina</i> (Prestrandrea, 1833)
Família Heterorhabdidae
<i>Heterorhabdus papilliger</i> (Claus, 1863)
<i>H. spinifrons</i> (Claus, 1863)
Família Lucicutidae
<i>Lucicutia clausi</i> Giesbrecht, 1889
<i>L. flavicornis</i> (Claus, 1863)
<i>L. gaussae</i> Grice, 1963
<i>L. gemina</i> Farran, 1923
<i>L. ovalis</i> Wolfenden, 1906
Família Mecynoceridae
<i>Mecynocera clausi</i>
Família Metridinidae
<i>Pleuromamma abdominalis</i> (Lubbock, 1856)
<i>P. gracilis</i> Claus, 1863
<i>P. piseki</i> Farran, 1929
<i>P. xiphias</i> (Giesbrecht, 1889)
Família Paracalanidae
<i>Acrocalanus longicornis</i> Giesbrecht, 1888
<i>Calocalanus contractus</i> Farran, 1926
<i>C. pavo</i> (Dana, 1849)
<i>C. pavoninus</i> Farran, 1936
<i>C. styliremis</i> Giesbrecht, 1888
<i>Delius sewelli</i> Bjornberg, 1980
<i>Paracalanus aculeatus</i> Giesbrecht, 1888
<i>P. campaneri</i> Bjornberg, 1980
<i>P. indicus</i> Wolfenden, 1905
<i>P. nanus</i> Sars, 1907
<i>P. parvus</i> (Claus, 1863)
<i>P. quasimodo</i> Bowman, 1971
<i>Parvocalanus crassirostris</i> (Dahl, 1894)
Família Phaennidae
<i>Xanthocalanus</i> sp
Família Pontellidae
<i>Calanopia americana</i> Dahl, 1894
<i>Labidocera acutifrons</i> (Dana, 1849)
<i>L. fluviatilis</i> Dahl, 1894
<i>L. nerii</i> (Kroyer, 1848)
<i>Pontellina plumata</i> (Dana, 1849)
<i>Pontellopsis brevis</i> (Giesbrecht, 1889)
Família Pseudodiaptomidae
<i>Pseudodiaptomus acutus</i> (Dahl, 1894)
Família Scolecitrichidae
<i>Lophothrix latipes</i> (Scott, 1893)
<i>Scaphocalanus curtus</i> (Farran, 1926)
<i>S. echinatus</i> (Farran, 1905)
<i>S. medius</i> Sars, 1907
<i>Scolecithricella dentata</i> (Giesbrecht, 1892)
<i>S. tenuiserrata</i> (Giesbrecht, 1892)

Anexo 5b. Relação dos grupos taxonômicos do zooplâncton identificados para a região compreendida entre Itabapoana e Cabo Frio (RJ). Classificação de acordo com Brusca & Brusca (1990) (continua...).

TAXA ZOOPLANCTONICA
<i>Scolecithrix bradyi</i> Giesbrecht, 1888
<i>S. danae</i> (Lubbock, 1856)
Família Temoridae
<i>Temora stylifera</i> (Dana, 1849)
<i>T. turbinata</i> (Dana, 1849)
<i>Temoropia mayumbaensis</i> Scott, 1894
Ordem Cyclopoida
Família Oithonidae
<i>Oithona hebes</i> Giesbrecht, 1891
<i>O. nana</i> Giesbrecht, 1892
<i>O. oculata</i> Farran, 1913
<i>O. ovalis</i> Herbst, 1955
<i>O. plumifera</i> Baird, 1843
<i>O. setigera</i> (Dana, 1849)
<i>O. simplex</i> Farran, 1913
Ordem Poecilostomatoida
Família Sapphirinidae
<i>Copilia mirabilis</i> Dana, 1849
<i>Sapphirina angusta</i> Dana, 1849
<i>S. auronitens-sinuicauda</i> Claus, 1863
<i>S. intestinata</i> Giesbrecht, 1891
<i>S. nigromaculata</i> Claus, 1863
<i>S. opalina-darwinii</i> Dana, 1849
<i>S. ovatolanceolata-gemma</i> Dana, 1849
<i>S. scarlata</i> Giesbrecht, 1891
Família Corycaeidae
<i>Corycaeus amazonicus</i> Dahl, 1894
<i>C. speciosus</i> Dana, 1849
<i>C. furcifer</i> Claus, 1863
<i>C. giesbrechti</i> Dahl, 1894
<i>C. lautus</i> (Dana, 1852)
<i>C. limbatus</i> Brady, 1888
<i>C. ovalis</i> Claus, 1863
<i>C. typicus</i> (Kroyer, 1849)
<i>Farranula gracilis</i> (Dana, 1853)
<i>Farranula rostrata</i> (Claus, 1863)
Família Oncaeidae
<i>Lubbockia squillimana</i> Claus, 1863
<i>Oncaea conifera</i> Giesbrecht, 1891
<i>O. curta</i> Sars, 1916
<i>O. dentipes</i> Giesbrecht, 1891
<i>Oncaea media</i> Giesbrecht, 1891
<i>O. mediterranea</i> (Claus, 1863)
<i>O. minuta</i> Giesbrecht, 1892
<i>O. notopus</i> Giesbrecht, 1891
<i>O. subtilis</i> Giesbrecht, 1892
<i>O. venusta</i> Philippi, 1843
Ordem Harpacticoida

Anexo 5b. Relação dos grupos taxonômicos do zooplâncton identificados para a região compreendida entre Itabapoana e Cabo Frio (RJ). Classificação de acordo com Brusca & Brusca (1990) (continua...).

TAXA ZOOPLANCTONICOS
Família Clytemnestridae
<i>Clytemnestra scutellata</i> Dana, 1848
Família Euterpinidae
<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1847)
Família Miraciidae
<i>Macrosetella gracilis</i> (Dana, 1848)
<i>Miracia efferata</i> Dana, 1849
Família Ectinosomatidae
<i>Longipedia</i> sp.
<i>Microsetella</i> sp.
Subclasse Cirripedia
Ordem Thoracica
<i>Balanus</i> sp.
Classe Malacostraca
Ordem Cumacea
Ordem Amphipoda
Ordem Isopoda
Subordem Epicaridea
<i>Eurydice littoralis</i>
Ordem Mysida
<i>Mysidopsis scintillae</i> Reis
Ordem Euphausiacea
<i>Euphausia recurva</i> Hansen
<i>Stylocheiron affine</i> Hansen
Ordem Decapoda
Família Penaeidae
Família Sergestidae
Família Luciferidae
<i>Lucifer faxoni</i> Borradaile
<i>Lucifer typus</i> Milne-Edwards
Família Alpheidae
Família Palaemonidae
Família Callinassidae
Família Paguridae
Família Diogenidae
Família Porcellanidae
Família Grapsidae
Família Portunidae
Família Xanthidae
Ordem Stomatopoda
Filo Mollusca
Classe Gastropoda
Subclasse Opisthobranchia

Anexo 5b. Relação dos grupos taxonômicos do zooplâncton identificados para a região compreendida entre Itabapoana e Cabo Frio (RJ). Classificação de acordo com Brusca & Brusca (1990) (continuação).

TAXA ZOOPLANCTONICA
Ordem Thecosomata ("Pteropoda")
<i>Limacina</i> sp.
<i>Cresseis acicula</i> Rang
Subclasse Prosobranchia
Ordem Mesogastropoda
Classe Bivalvia
Filo Echinodermata
Filo Chordata
Subfilo Urochordata
Classe Appendicularia
Família Oikopleuridae
<i>Oikopleura albicans</i> (Leuckart, 1854)
<i>O. dioica</i> Fol, 1872
<i>O. fusiformis</i> Fol, 1872
<i>O. longicauda</i> (Vogt, 1854)
Família Fritillariidae
<i>Fritillaria haplostoma</i> Fol, 1872
<i>F. pellucida</i> (Busch, 1851)
Classe Thaliacea
Ordem Doliolida
Família Doliolidae
<i>Doliolum nationalis</i> Borgert, 1893
<i>Dolioletta gegenbauri</i> (Uljanin, 1884)
Ordem Salpida
Família Salpidae
<i>Thalia democratica</i> (Forskål, 1775)
<i>T. cicar</i> Van Soest, 1973
<i>Salpa fusiformis</i> Cuvier, 1804
Ordem Pyrosomatida
Família Pyrosomatidae
<i>Pyrosoma atlanticum</i> Péron, 1804
Subfilo Vertebrata
Classe Osteichthyes

Fonte: PETROBRAS/CEPEMAR (2001)