

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
PROTOZOÁRIOS			X		
Foraminifera (18 tipos presentes)			X		
FILO PORIFERA					X
FILO CNIDARIA	X	X	X	X	X
Classe Hydrozoa			X		X
Ordem Hydroida					X
Ordem Siphonophora			X		
Classe Scyphozoa					X
Ordem Coronatae					X
Classe Anthozoa	X	X	X	X	X
Subclasse Octocorallia				X	X
Ordem Gorgonacea		X			X
<i>Lophogorgia punicea</i>		X			
Ordem Pennatulacea					X
Subclasse Hexacorallia					X
Ordem Scleractinia	X		X	X	X
<i>Caryophyllia ambrosia caribbeana</i>			X		
<i>Fungiacyathus symmetricus</i>			X		
<i>Madreporaria</i> sp.	X				
Ordem Actinaria					X
Ordem Zoanthidea					X
NEMERTINOS		X			
FILO NEMERTINEA		X			
SEUDOCELOMADOS		X	X		X
FILO NEMATODA		X	X		X
Família Prochaetodermatidae			X		
Subclasse Neomeniomorpha			X		
<i>Benthonella gazal</i>			X		
<i>Benthonellania xanthias</i>			X		
<i>Brokula conica</i>			X		
<i>Calliotropis</i> cf. <i>aeglees</i>			X		
<i>Echinogurges</i> sp.			X		
<i>Epitonium</i> sp.			X		
<i>Olivella ambliia</i>			X		
<i>Opaliopsis nitida</i>			X		
<i>Sequenzia</i> cf. <i>hapala</i>			X		

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
Classe Adenophorea					X
Ordem Enoplida					X
Família Oncholaimidae					X
<i>Oncholaímellus</i>					X
Família Leptosomatidae					X
<i>Pseudocella</i>					X
<i>Synonchus</i>					X
Família Phanodermatidae					X
Subclasse Chromadoria					X
Ordem Chromadorida					X
Família Linhomoeidae					X
FILO ANNELIDA	X	X	X	X	X
Classe Polychaeta	X	X	X	X	X
<i>Aricidea</i> sp.			X		
<i>Euclymene</i> sp.		X			
<i>Eulalia</i> sp.		X			
<i>Eupolymnia</i> sp.		X			
<i>Euzonus</i> sp.		X			
<i>Glycinde</i> sp.		X			
<i>Kinbergonuphis</i> sp.		X			
<i>Linopherus</i> sp.			X		
<i>Melinna</i> sp.		X			
<i>Ninoe</i> sp.		X			
<i>Notopygos</i> sp.		X			
<i>Ophelina</i> sp.		X			
<i>Paradiopatra</i> sp.		X			
<i>Parandalia</i> sp.		X			
<i>Paraprionospio</i> sp.		X			
<i>Timarete</i> sp.		X			
<i>Typosyllis</i> sp.		X			
Família Cirratulidae	X				
<i>Cirratulus</i> sp.	X				
<i>Tharyx</i> sp.	X				
Família Cossuridae	X				
<i>Cossura</i> sp.	X				
Família Onuphidae	X		X	X	
<i>Kimbergonupis</i> sp.				X	
<i>Paradiopatra</i> cf. <i>hartmane</i>			X		

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
<i>Paradiopatra</i> sp.	X				
Família Spionidae	X			X	X
<i>Laonice</i> sp.	X				
<i>Malacocerus</i> sp.				X	
<i>Prionospio</i> sp.	X				X
<i>Spiophanes</i> sp.	X				X
Família Apistobranchidae				X	
<i>Apistobranchus typicus</i>				X	
Família Aphroditidae	X				
Família Ampharetidae	X			X	X
<i>Amphicteis</i> sp.	X				X
Família Longosomatidae	X				
<i>Longosoma</i> sp.	X				
Família Orbiniidae	X	X		X	X
<i>Chaetozone</i> sp.					X
<i>Leitoscoloplos</i> sp.	X			X	X
<i>Orbinia</i> sp.		X			
<i>Scoloplos</i> sp.				X	X
Família Capitellidae	X		X	X	
<i>Capitella</i> sp.			X		
<i>Notomastus</i> sp.	X	X	X	X	
Família Maldanidae	X		X	X	X
<i>Clymenella</i> sp.		X			
<i>Chirimia</i> sp.	X				X
<i>Euclymene</i> sp.					X
<i>Lumbriclymene</i> sp.					X
<i>Rhodine</i> sp.	X				
Família Nereididae					X
<i>Neanthes</i> sp.					X
Família Ophelidae					X
<i>Travisia</i> sp.					X
Família Paralacydonidae	X				
Família Cirritulidae			X	X	X
<i>Cirratulus</i> sp.			X		
<i>Tharyx</i> sp.			X	X	X
Família Cosuridae					X
<i>Cossura</i> sp.					X
Família Flabelligeridae	X				X

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
<i>Brada</i> sp.					X
<i>Diplocirrus</i> sp.	X				
<i>Pherusa</i> sp.	X				
Família Lumbrineridae	X		X	X	X
<i>Abyssoninoe</i> sp.					X
<i>Lumbrineris</i> sp.			X		
<i>Magelona</i> sp.			X		
Família Paraonidae	X	X			X
<i>Aricidea</i> sp.	X				X
<i>Cirrophorus</i> sp.					X
Paraonidae sp.		X			
Família Phyllodocidae	X			X	
<i>Eteone</i> sp.				X	
Família Pilargidae	X				
<i>Cabira</i> sp.	X				
<i>Sigambra</i> sp.	X				
Família Sternaspidae	X				X
<i>Sternaspis</i> sp.	X				X
Família Syllidae	X	X	X	X	X
<i>Exogone</i> sp.	X			X	
<i>Exogonella</i> sp.	X				
<i>Langerthansia</i> sp.					X
<i>Syllis</i> sp.		X			
Família Terebellidae	X				X
<i>Artacamella</i> sp.	X				
<i>Pista</i> sp.					X
Família Trichobranchidae	X				X
<i>Terebellides</i> sp.	X				X
Família Hesionidae	X			X	
<i>Podarke</i> sp.	X			X	
Família Amphinomidae	X				X
<i>Chloeia</i> sp.					X
<i>Linopherus</i> sp.					X
<i>Paramphinome</i> sp.	X			X	
Família Glyceridae	X	X	X	X	X
<i>Glycera</i> sp.		X	X		
<i>Hemipodus</i> sp.	X		X	X	X
Família Goniadidae	X			X	X

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
<i>Goniada maculata</i>	X				
<i>Goniada</i> sp.				X	X
Família Paraonidae				X	
<i>Aricidea</i> sp.				X	
Família Opheliidae	X			X	
<i>Ophelina</i> sp.	X		X		
<i>Polyophtalmus</i> sp.	X				
<i>Travisia</i> sp.				X	
Família Sabellidae	X			X	
<i>Branchiomma</i> sp.		X			
Família Polynoidae	X	X	X		
<i>Phyllodoce</i> sp.			X		
<i>Polynoidae</i> sp.		X			
<i>Spiophanes</i> sp.			X		
Família Sigalionidae	X		X		X
<i>Ehlerseleanira</i> sp.	X				
<i>Sthenolepis</i> sp.					X
Família Chaetopteridae	X	X			X
<i>Eunice</i> sp.		X			
<i>Lumbrineris</i> sp.		X			
<i>Lysidice</i> sp.		X			
<i>Spiochaetopterus</i> sp.	X	X			X
Superfamília Eunicida		X			
Família Nereidae		X			
<i>Diopatra</i> sp.		X			
<i>Nereis</i> sp.		X			
Família Sabellariidae		X			
<i>Sabelaria</i> sp.		X			
Família Owenidae			X		
Classe Oligochaeta			X		X
FILO MOLLUSCA	X	X	X	X	X
<i>Anadara brasiliana</i>		X			
<i>Callista eucymata</i>		X			
<i>Carditamera floridana</i>		X			
<i>Cooperella atlantica</i>		X			
<i>Corbula caribaea</i>		X			
<i>Corbula cubaniana</i>		X			
<i>Crassinella martinicensis</i>		X			

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
<i>Crenella divaricata</i>		X			
<i>Cuspidaria brasiliensis</i>		X			
<i>Eurhomalea exalbida</i>		X			
<i>Felaniella candeana</i>		X			
<i>Gastrochaena hians</i>		X			
<i>Glycymeris pectinata</i>		X			
<i>Limopsis janeiroensis</i>		X			
<i>Macoma tenta</i>		X			
<i>Persicula catenata</i>		X			
<i>Pitar</i> sp.		X			
Classe Aplacophora	X			X	X
Classe Gastropoda	X	X		X	
<i>Aglaja unsa</i>		X			
<i>Dorsanum moliniferum</i>		X			
<i>Fusinus marmoratus</i>		X			
<i>Nassarius albus</i>		X			
<i>Simnia uniplicata</i>		X			
Família Acteonidae	X		X	X	
<i>Acteon</i> sp.	X		X	X	
Família Hamineidae	X		X	X	
<i>Atys</i> aff. <i>sandersoni</i>	X				
<i>Atys sandersoni</i>				X	
<i>Atys</i> sp.	X				
<i>Brookula</i> sp.			X		
<i>Haminoea</i> pp.n.sp.	X				
<i>Haminoea</i> sp.			X		
<i>Haminoea</i> spp.	X				
<i>Rictaxis</i> sp.	X				
Família Limacinidae	X				
<i>Limacina bulimoides</i>	X				
<i>Limacina inflata</i>	X				
<i>Limacina lesueuri</i>	X				
<i>Limacina trochiformis</i>	X				
Família Cavoliniidae	X		X		
<i>Cavolinia</i> sp.	X				
<i>Clio andreae</i>	X				
<i>Clio polita</i>	X				
<i>Clio pyramidata</i>	X				

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
<i>Clio recurva</i>	X				
<i>Clio</i> sp.	X				
<i>Creseis acicula</i>	X				
<i>Creseis</i> sp.	X				
<i>Creseis virgula</i>	X				
<i>Cuvierina columnella</i>	X				
<i>Styliola subula</i>	X		X		
Família Veneridae	X				
Família Verticordiidae					X
<i>Euciroa grandis</i>					X
Família Omalogyridae	X				
<i>Adeuomphalus</i> aff. <i>ammoniformis</i>	X				
<i>Adeuomphalus</i> sp.	X				
Família Cyclichnidae	X				
<i>Acteocina</i> sp.	X				
<i>Acteocina</i> aff. <i>inconspicua</i>	X				
<i>Cylichna alba</i>	X				
<i>Scaphander</i> sp.	X				
Família Peraclididae	X				
<i>Peracle</i> sp.	X				
Família Philinidae	X				
<i>Philine sagra</i>	X				
<i>Philine</i> sp.	X				
Família Vanikoridae				X	
<i>Megalomphalus</i> sp.				X	
Família Cerithiidae	X				
<i>Cerithiella</i> sp.	X				
Família Diaphanidae	X				
<i>Diaphana</i> pp.n.sp.	X				
Família Barleeidae	X				
<i>Barleeia</i> sp.	X				
Família Tornidae	X				
<i>Macromphalina</i> pp.n.sp.	X				
Família Trochidae	X		X	X	
<i>Basilissa alta</i>			X		
<i>Basilissa</i> sp.			X		
<i>Calliostoma</i> sp.	X				

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
<i>Calliotropis actinophora</i>	X			X	
<i>Calliotropis</i> sp.	X			X	
<i>Cirsonella</i> sp.	X				
<i>Echinogurges clavatus</i>				X	
<i>Echinogurges</i> aff. <i>clavatus</i>	X				
<i>Echinogurges</i> sp.	X		X		
<i>Margarites</i> sp.	X				
<i>Solariella</i> sp.	X		X		
<i>Vetulonia</i> sp.	X			X	
Família Turbinidae	X				
<i>Moelleria</i> sp.	X				
Família Tjaernoidea	X			X	
<i>Tjaernoia michaeli</i>				X	
<i>Tjaernoia</i> pp.n.sp.	X				
Família Cerithiopsidae	X			X	
<i>Eumetula</i> cf. <i>aliceae</i>	X				
<i>Eumetula</i> sp.	X			X	
Família Aclididae	X		X	X	
<i>Aclis</i> sp.	X		X	X	
<i>Costaclis</i> sp.				X	
Família Skeneidae	X			X	
<i>Abyssogyra</i> sp.				X	
<i>Akritogyra</i> sp.				X	
<i>Anekes</i> sp.	X			X	
<i>Cirsonella</i> sp.	X			X	
<i>Eudaronia</i> aff. <i>aperta</i>				X	
<i>Eudaronia</i> sp.				X	
<i>Eudaronia</i> sp.	X				
<i>Granygira oblatogira</i>				X	
<i>Granygira</i> sp.	X		X		
<i>Haplocochlias</i> pp.n.sp.	X				
<i>Lissomphalia</i> pp.n.sp.	X				
<i>Lissomphalia</i> sp.				X	
<i>Lissotesta</i> aff. <i>turrita</i>	X				
<i>Lissotesta</i> pp.n.sp.	X			X	
<i>Lissotesta</i> sp.				X	
<i>Moelleriopsis</i> aff. <i>abyssicola</i>	X				
<i>Moelleriopsis</i> cf. <i>sincera</i>	X				

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
<i>Moelleriopsis</i> pp.n.sp.	X				
<i>Moelleriopsis</i> sp.			X	X	
<i>Moelleriopsis watsoni</i>	X				
<i>Palazzia</i> aff. <i>ausonia</i>				X	
<i>Palazzia</i> aff. <i>planorbis</i>	X				
<i>Palazzia</i> n. sp.				X	
<i>Palazzia planorbis</i>				X	
<i>Palazzia</i> pp.n.sp.	X				
<i>Retigyra</i> sp.				X	
Skeneidae sp.	X				
<i>Trenchia</i> sp.	X			X	
<i>Trochaclis</i> pp.n.sp.	X				
<i>Trochaclis</i> sp.				X	
<i>Xylodiscula</i> ? pp.n.sp.	X				
<i>Xylodiscula</i> aff. <i>lens</i>				X	
Família Retusidae	X		X	X	
<i>Pyrunculus ovatus</i>	X		X	X	
<i>Pyrunculus</i> sp.	X				
Família Cerithiidae	X				
<i>Cerithiella</i> sp.	X				
Família Collumbelidae	X				
Família Cyclostrematidae	X			X	
<i>Brookula</i> aff. <i>conica</i>	X				
<i>Brookula</i> aff. <i>spinulata</i>	X				
<i>Brookula conica</i>	X			X	
<i>Brookula pfeifferi</i>				X	
<i>Brookula</i> sp.				X	
<i>Brookula spinulata</i>				X	
<i>Cyclostrema</i> sp.	X			X	
<i>Liotia</i> sp.				X	
Família Janthinidae	X				
<i>Janthina pallida</i>	X				
Família Seguenziidae	X			X	
<i>Carenzia carinata</i>	X				
<i>Carenzia</i> sp.	X			X	
<i>Carenzia trispinosa</i>	X				
<i>Mirachelus</i> sp.	X				
<i>Seguenzia</i> aff. <i>hapala</i>	X				

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
<i>Seguenzia</i> pp.n.sp.	X				
<i>Seguenzia</i> sp.	X			X	
Família Rissoidae	X			X	
<i>Alvania xanthias</i>	X		X	X	
<i>Alvania</i> pp.n.sp.	X				
<i>Benthonella gaza</i>	X			X	
<i>Benthonella tenella</i>	X		X		
<i>Benthonella</i> sp.	X				
Família Atlantidae	X			X	
<i>Atlanta</i> aff. <i>peroni</i>	X			X	
<i>Atlanta</i> sp.	X				
Família Buccinidae			X	X	
<i>Belomitra exculpta</i>				X	
Família Olividae	X			X	X
<i>Olivella ambliia</i>	X		X	X	
<i>Olivella ephamilla</i>	X				
<i>Olivella</i> sp.	X			X	X
<i>Olivella minuta</i>		X			
Família Triphoridae				X	
<i>Triphora</i> sp.				X	
Família Epitoniidae	X		X	X	X
<i>Alora</i> pp.n.sp	X				
<i>Eccliseogyra</i> aff. <i>exquisita</i>	X				
<i>Epitonium</i> aff. <i>novangliae</i>	X				
<i>Epitonium cadeanum</i>				X	
<i>Epitonium</i> sp.	X		X	X	
<i>Opaliopsis nitida</i>	X				X
Família Eulimidae	X		X	X	X
<i>Crinolamia</i> pp. n.sp	X				
<i>Crinolamia</i> sp.				X	
<i>Eulima</i> sp.	X		X		X
<i>Fusceulima</i> sp.	X				
<i>Hallieloides</i> pp.n.sp	X				
<i>Melanella</i> sp.	X				
<i>Mucronalia</i> sp.	X				
<i>Ophieulima</i> sp.	X				
<i>Umbilicalcis lata</i>	X			X	
Família Cimidae	X				

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
Cima pp.n.sp	X				
Família Turridae	X		X	X	X
<i>Borsonia</i> sp.	X				
<i>Compsodrillia</i> pp.n.sp	X				
<i>Cryoturris citronella</i>	X				
<i>Cryoturris</i> pp.n.sp	X				
<i>Cryoturris serga</i>	X			X	
<i>Cryoturris</i> sp.	X			X	X
<i>Drillia</i> sp.			X		
<i>Famelica</i> pp.n.sp	X				
<i>Gymnobella</i> aff. <i>blakeana</i>	X				
<i>Gymnobella extensa</i>	X				
<i>Gymnobella</i> sp.	X				
<i>Leucosyrinx verrillii</i>	X				
<i>Mangelia</i> aff. <i>bendela</i>				X	
<i>Micropleurotoma</i> sp.	X				
<i>Neopleurotomoides</i> pp.n.sp.	X				
<i>Philbertia</i> aff. <i>perparva</i>	X				
<i>Phynorhynchus</i> pp.n.sp.	X				
<i>Pleurotomella</i> aff. <i>cala</i>	X				
<i>Pleurotomella</i> aff. <i>ipara</i>	X				
<i>Pleurotomella circumvoluta</i>	X				
<i>Pleurotomella meriacum</i>	X				
<i>Pleurotomella</i> sp.	X		X		
<i>Taranis</i> sp.	X				
<i>Turridae</i> sp.	X				
<i>Xanthodaphne</i> pp.n.sp.	X				
Família Marginellidae	X				
<i>Volvarina</i> sp.	X				
Família Pyramidellidae	X		X		
<i>Turbonilla</i> sp.			X	X	
<i>Turbonilla</i> spp.	X				
<i>Odostomia</i> sp.	X			X	
<i>Liostomia</i> sp.				X	
Família Naticidae			X		
Ordem Vetigastropoda			X		
Família Seguenzioidae			X		
<i>Seguenzia</i> sp.			X		

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
Família Trichotropidae			X		
<i>Lyocyclus pernambucensis</i>			X		
Classe Polyplacophora		X			
<i>Connexochiton moreirai</i>		X			
Classe Bivalvia		X	X	X	X
<i>Abra lioica</i>		X			
<i>Tindaria</i> sp.			X		
Família Arcidae	X			X	
<i>Barbatia</i> aff. <i>ectocomata</i>	X				
<i>Bathyarca</i> sp.				X	
Família Limidae	X				
<i>Limatula</i> pp.n.sp.	X				
Família Nuculidae	X			X	X
<i>Nucula pernambucensis</i>			X		
<i>Nucula puelcha</i>		X			
<i>Nucula semiornata</i>		X			
<i>Nucula</i> sp.	X			X	X
<i>Nucula verrilli</i>			X		
<i>Nuculana semen</i>	X	X		X	
<i>Nuculana</i> sp.	X		X	X	
<i>Portlandia</i> sp.	X				X
<i>Pronucula benguelana</i>	X			X	X
<i>Tindaria</i> sp.	X			X	
<i>Youldia</i> sp.				X	
Família Limopsidae					X
<i>Limopsis</i>					X
Família Leptonidae				X	X
<i>Mysella</i> sp.				X	
<i>Pythinella</i> sp.				X	
Família Pectinidae	X				
<i>Cyclopecten strigillatus</i>	X				
Família Tellinidae	X	X		X	
<i>Tellidora</i> sp.	X				
<i>Tellina</i> sp.	X	X		X	
Família Malletiidae	X			X	X
Protobranchia					X
<i>Saturnia</i> aff. <i>acinula</i>				X	
<i>Saturnia</i> sp.	X			X	X

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
Família Periplomatidae	X				
<i>Periploma</i> sp.	X				
Família Cuspidariidae	X			X	
<i>Cardiomya</i> pp.n.sp.	X				
<i>Cuspidaria</i> aff. <i>braziliensis</i>	X				
<i>Cuspidaria monasterra</i>	X				
<i>Cuspidaria platensis</i>	X				
<i>Cuspidaria</i> pp.n.sp.	X				
<i>Cuspidaria rostrata</i>	X				
<i>Cuspidaria</i> sp.				X	
<i>Myonera paucistriata</i>	X				
<i>Myonera</i> pp.n.sp.	X				
<i>Myonera ruginosa</i>				X	
<i>Myonera</i> sp.				X	
Família Verticordiidae	X			X	
<i>Euciroa</i> aff. <i>grandis</i>	X				
<i>Euciroa</i> pp.n.sp	X				
<i>Halicardia</i> sp.	X				
<i>Lyonsiella</i> sp.	X				
<i>Verticordia woodi</i>	X			X	
Família Semelidae	X				
<i>Abra</i> sp.	X				
Família Teredinidae				X	
Família Thraciidae	X			X	
<i>Thracia</i> sp.	X				
Família Pandoridae				X	
Família Propeamussiidae	X				
<i>Propeamusium pourtalesium</i>	X				
<i>Pandora</i> sp.				X	
Família Hiatellidae	X			X	
<i>Hiatella</i> sp.	X				
<i>Panopea</i> sp.				X	
Família Mytilidae	X		X	X	
<i>Barbatia profundicola</i>			X		
<i>Cuspidaria</i> sp.			X		
<i>Dacridium</i> sp.	X			X	
<i>Fissidentalium</i> sp.			X		
<i>Idas</i> sp.				X	

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
<i>Verticordia</i> cf. <i>woodii</i>			X		
Pteropoda			X		
Classe Scaphopoda	X		X	X	
Família Dentaliidae	X			X	
<i>Antalis</i> (<i>oblongo</i>) sp.	X				
<i>Antalis disparille</i>	X		X	X	
<i>Antalis</i> sp.	X				
<i>Compressidens pressum</i>				X	
<i>Dentalium</i> sp.	X		X	X	
<i>Fissidentalium</i> sp.	X				
<i>Graptacme</i> sp.	X				
<i>Laevidentalium</i> sp.	X				
Família Gadilidae	X		X	X	
<i>Cadulus</i> aff. <i>parvus</i>	X				
<i>Cadulus</i> sp.	X			X	
<i>Gadila</i> sp.	X			X	
<i>Graptacme</i> sp.				X	
QUELICERADOS			X		
Pantopoda		X			
Ordem Acarina		X	X		
FILO ARTHOPODA	X				
Classe Crustácea	X	X	X	X	X
Larva sp.		X			
Classe Ostracoda	X	X			X
<i>Aversolata</i> sp.	X				
<i>Bairdidae</i> sp.	X				
<i>Bairdopilata</i> (<i>Bairdopilata</i>) sp.	X				
<i>Krithe</i> sp.	X				
<i>Macropyxis</i> sp.	X				
Ordem Myodocopida	X		X		
<i>Myodocopida</i> sp.	X				
Ordem Podocopida	X				
<i>Podocopida</i> sp.	X				
Família Cyprididae	X				
<i>Cypridacea</i> sp.	X				
Família Cytherideidae	X				
<i>Cytheracea</i> sp.	X				
Família Cytherellidae	X				

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
<i>Cytherella</i> sp.	X				
Classe Brachiopoda		X			
<i>Terebratulina</i> sp.		X			
Classe Copepoda	X	X	X		
<i>Paguristes</i> sp.			X		
Ordem Harpacticoida	X				
Família Adenopleurellidae	X				
<i>Harpacticoida</i> sp.	X				
<i>Calanoida</i> sp.	X				
Família Oncacidae		X			
Família Corophiidae			X		
<i>Liljeborgia</i> sp.			X		
Família Ischyroceridae			X		
<i>Amanthillopsis atlantica</i>			X		
<i>Elasmopus</i> sp.			X		
<i>Moira atropos</i>			X		
Classe Malacostraca	X	X			
Superordem Peracarida	X				
Ordem Amphipoda	X	X	X	X	
<i>Jassa</i> sp.			X		
<i>Haploops</i> sp.			X		
<i>Carangolia</i> sp.			X		
<i>Gammaropsis</i> sp.		X			
Caprellidae sp.		X			
Família Eusiridae	X				
<i>Rhachotropis</i> sp.	X				
Família Isaeidae				X	
<i>Gammaropsis</i> sp.				X	
Família Phoxocephalidae	X			X	X
<i>Birubiinae</i> sp.	X				
<i>Harpinia</i> sp.	X			X	
<i>Phoxocephalidae</i> sp.	X				
Família Lysianassidae	X			X	X
<i>Hippomedon</i> sp.				X	
<i>Lysianassidae</i> sp.	X				
Ordem Cumacea	X	X	X	X	X
Família Dyastilidae	X				
<i>Dyastilidae</i> sp.	X				

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
Família Lampropidae	X				
<i>Lampropidae</i> sp.	X				
Família Nannastacidae	X			X	
<i>Nannastacus</i> sp.				X	
<i>Nannastacidae</i> sp.	X				
Família Synopiidae				X	
<i>Bruzelia</i> sp.				X	
Família Stenothoidae				X	
<i>Parametopella</i> sp.				X	
Subordem Gammaridea	X				X
<i>Gammaridea</i> sp.	X				
Família Pardaliscidae	X				
<i>Pardaliscidae</i> sp.	X				
Família Dexaminidae	X				
<i>Atylus</i> sp.	X				
<i>Lepechinella</i> sp.	X				
Família Aoridae					X
<i>Aoroidea</i> sp.					X
Família Ampeliscidae	X		X		X
<i>Ampelisca</i> sp.		X			X
<i>Ampelisca panamensis</i>			X		
<i>Ampeliscidae</i> sp.	X				
<i>Bybliosoides</i> sp.					X
<i>Haploops</i> sp.					X
Família Ampithoidae					X
<i>Ampithoe</i> sp.					X
Família Haustoriidae					X
<i>Carangolia</i> sp.			X		X
Família Ischyroceridae	X		X		X
<i>Ischyrocerus</i> sp.		X			
<i>Ischyroceridae</i> sp.	X				
Família Oedicerotidae	X				X
<i>Oedicerotidae</i> sp.	X				
Família Urothoidae	X				
<i>Urothoe falcata</i>	X				
Superordem Hoplocarida		X			
Ordem Stomatoda		X			
<i>Squilla</i> sp.		X			

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
Ordem Decápoda		X			
Família Penaidae		X			
<i>Lucifer faxoni</i>		X			
<i>Mesopenaeus</i> sp.		X			
Família Caridae		X			
<i>Alpheus</i> sp.		X			
Ordem Macrura		X			
Superfamília Thalassinidea		X			
<i>Sergio mirim</i>		X			
Ordem Anomura		X			
<i>Munida irrasa</i>		X			
Ordem Brachyura		X			
<i>Cronius ruber</i>		X			
<i>Cryptodromiopsis antillensis</i>		X			
<i>Ebalia stimpsoni</i>		X			
Família Leucosiidae		X			
<i>Microphys</i> sp.		X			
<i>Pilumnoides hassleri</i>		X			
<i>Pinnixia cristata</i>		X			
<i>Ranilia muricata</i>		X			
Superordem Eucarida	X				
Ordem Decápoda	X				
Ordem Euphasiacea	X				
<i>Euphausiacea</i> sp.	X				
Ordem Tanaidacea	X	X	X	X	
Família Kalliapseudidae	X				
<i>Kalliapseudidae</i> sp.	X				
Família Nototanaididae				X	
<i>Protonaissus</i> cf. <i>alvesi</i>				X	
Família Tanaidae				X	
Família Tanapseudidae				X	
<i>Tanapseudes</i> sp.				X	
Família Apseudidae				X	
<i>Bunakenia</i> sp.					
Subordem Apseudomorpha	X				
<i>Apseudomorpha</i> sp.	X				
Ordem Isopoda (Malacostraca)	X	X		X	X
Família Pleurogoniidae	X				

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
<i>Pleurogonium</i> sp.	X				
Família Stenetriidae	X			X	
<i>Stenetrium</i> sp.	X			X	
<i>Stenobermuda</i> sp.				X	
Família Asellidae			X		
Família Desmosomatidae	X				X
<i>Desmososma</i> sp.	X				X
Família Janiridae				X	X
<i>Abyssianira</i> sp.				X	
Família Macrostylidae				X	
<i>Macrostylis</i> aff. <i>caribbicus</i>				X	
Família Ischnomesidae	X			X	
<i>Haplomesus</i> aff. <i>angustus</i>				X	
<i>Heteromesus</i> sp.	X				
Família Anthuridae	X			X	X
<i>Anthuridae</i> sp.	X				
Subordem Flabellifera					X
<i>Pseudoanthura</i> sp.				X	
Família Cirolanidae					X
Família Gmnathidae					X
Subordem Asellota	X				
<i>Asellota</i> sp.	X				
<i>Apsidoniscus</i> sp.	X				
Subordem Epicaridea	X				
Família Cryptoniscidae	X				
<i>Cryptoniscidae</i> sp.					
PROTOSTOMADOS MENORES		X	X	X	X
FILO SIPUNCULIDA	X	X	X	X	X
FILO ECHIURIDA	X	X			X
FILO PRIAPULIDA		X			
Lofoforados					
FILO PHORONIDA		X			
FILO BRYOZOA	X			X	X
<i>Bryozoa</i> sp.	X				
FILO ECTOPROCTA		X		X	
<i>Cupuladria canarinsis</i>		X			
FILO ECHINODERMATA	X	X	X	X	X

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
Classe Stelleroidea		X			
Subclasse Asteroidea		X			
<i>Anterinides folium</i>		X			
<i>Astropecten armatus brasiliensis</i>		X			
<i>Astropecten marginatus</i>		X			
<i>Echinaster brasiliensis</i>		X			X
Classe Ophiuroidea	X	X			X
<i>Amphiodia</i> sp.		X			
Ordem Ophiura					X
Família Ophiuridae	X				X
<i>Ophiomisidium</i> sp.	X				X
<i>Ophiotypa</i> sp.	X				
<i>Ophiuroglypha irrorata</i>					X
Família Amphilepididae					X
<i>Amphilepis</i> sp.					X
Família Ophiacanthidae	X				X
<i>Amphilimna</i> sp.					X
<i>Microphiura</i> sp.	X				
<i>Ophiacanthella troscheli</i>	X				
<i>Ophiomedeia duplicata</i>	X				
Família Amphiuridae	X	X	X	X	
<i>Amphiodia</i> sp.	X				
<i>Amphiura</i> (<i>Ophionema</i>) <i>intricata</i>	X				
<i>Amphiura flexuosa</i>		X			
<i>Amphiura joubini</i>		X			
<i>Amphiura kimbergi</i>			X		
<i>Amphiura mulleri</i>		X			
<i>Amphiura</i> sp.		X	X		
<i>Ophiactis lymani</i>		X			
<i>Ophiocantha vivipara</i>		X			
<i>Ophiomidium pulchelum</i>		X			
<i>Ophioplocus januarii</i>		X			
<i>Ophiothrix ratbuni</i>		X			
<i>Ophocten amitinum</i>			X		
Classe Echinoidea	X	X			
<i>Echinoidea</i> sp.	X				
<i>Neoma ventricosa</i>		X			

Anexo 5-VI. Lista de táxons zoobentônicos presentes nos campos de Marlim Sul, Barracuda Vermelho e Espadarte, Bacia de Campos, RJ (pp.n.sp. refere-se às prováveis novas espécies). Fonte: PETROBRAS, 2000; PETROBRAS, 2002a; PETROBRAS, 2002b; PETROBRAS/HABTEC, 2002b; PETROBRAS/CENPES, 2001.

TÁXONS	RONCADOR	VERMELHO	MARLIM SUL	BARRACUDA	ESPADARTE
<i>Stylocidaris lineata</i>		X			
Classe Holoturoidea			X		X
Ordem Apolida					X
Família Chirodotidae					X
Classe Crinoidea		X		X	
<i>Neocomatella pulchella</i>		X			
<i>Tropiometra carinata carinata</i>		X			
FILO CHORDATA		X			
Subfilo Cephalochordata		X			
<i>Branchiostoma platae</i>		X			
Subfilo Urochordata		X			
Classe Ascidiacea		X			