

**LEGENDA**


- Direção Preferencial das Correntes Superficiais (Verão)
- Direção Preferencial das Correntes Superficiais (Inverno)
- Área de Domicílio da Pesca Artesanal (Linha de Fundo e Rede)
- Área de Domicílio da Pesca Industrial (Espalho de Superfície e Fundo, Varras e Laca Viva, Arrasto com Rede)
- Unidades de Conservação
- Zonas de Amortecimento (ZDM) das Unidades de Conservação
- Espírito Santo
- Rio de Janeiro
- Parque Nacional Reserva de Jurubatuba
- Área de Proteção Ambiental de Santa Rosa
- Ecótipo Ilhaecharas
- APA Lagoa de Iny
- Parque dos Passaros
- Cabo Frio
- Reserva Ecológica Ilha do Cabo Frio
- Reserva Ecológica Ilha de Maratizes
- APA de Maratizes

- Níveis de Sensibilidade Ambiental**
- 1 - Costões rochosos, ilhas, falésias em rochas sedimentares, estruturas artificiais fixas
  - 2 - detritos marinhos, estruturas artificiais fixas (definido medida espacial (não ocorre))
  - 3 - praias dissipativas, de areia fina a média, abrigada
  - 4 - praias de areia grossa, praias intermediárias, de areia média expostas
  - 5 - praias de areia grossa, praias intermediárias, superfícies irregulares ou recobertas de vegetação (não ocorre)
  - 6 - praias de cascalho, depósito de talus, empacotamento, plataforma rec. conc. later. ou bloc.
  - 7 - planície de maré arenosa exposta de baixa-mar
  - 8 - exposição (não ocorre), alagadiço, áreas de rocha não lisa arrastada, empacotamentos
  - 9 - planície de maré arenosa/lamaosa alagadas, berrão de baixa-mar tansoso abrigado
  - 10 - terrenos alagadiços, banhados, brejos, manguezais de floresta, marismas, manguezais

- Recursos Biológicos e Sócio-Econômicos**
- Aves Permitidas
  - Unidades de Conservação Marinha
  - Praias
  - Pesca Artesanal
  - Camarões
  - Caranguejos
  - Área de Concentração de Baías Juatuba
  - Galinhas e Andorinhas
  - Rotas de Transposição, Aves Marinhas, Pinguins e Tarsídeos (*Phoebastria immutabilis* e *Sterna fuscata*)
  - Ostras e Mexilhões
  - Catiçães (*Pholis nebulosa*)
  - Argemone rosaelegans*

- CONVENÇÕES**
- Espírito d'água
  - Curso d'água
  - Estrada
  - Limite Estadual
  - Limite Municipal Costeiro
  - Capital estadual
  - Sede municipal
  - Bateria
  - Limite de Baía
  - FPSO Cidade de Vitória
  - Campo de Galimão
  - Gasoduto B'
  - Gasoduto Revival
  - Limite de Coleta de Canapú

- Probabilidade de Presença de Óleo (%)**
- Por caso (atenuamento do FPSO), após 30 dias no inverno, tempo mínimo para atingir a costa = 60 horas, probabilidade máxima de toque na costa = 97%, extensão de linha de costa com probabilidade de toque = 600km.
- 0 - 10
  - 10 - 20
  - 20 - 30
  - 30 - 40
  - 40 - 50
  - 50 - 60
  - 60 - 70
  - 70 - 80
  - 80 - 90
  - 90 - 100



**ESCALA GRÁFICA**

0 10 20 30 40 50 60 km

TÍTULO	MAPA II.5.4.2 - VULNERABILIDADE MARÍTIMA
CARTOGRAFIA	AUTOR
Mapa atualizado em:	Projeto: P. Marinha
DATA	ESCALA
18/02/09	1:600.000
DATA	REV.
04/11/08	01

Referência Cartográfica: IBGE, Atlas Nacional do Brasil, 2001  
 Referência Topográfica: IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002  
 Referência Fotográfica: EIV, Campo de Contorno, Fase II  
 BH - PETROBRAS

**ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA CAMPO DE GOLEINHO - MÓDULO II**

Folha 2/3