



- LEGENDA**
- Corrente Preferencial das Correntes Superficiais (Voras)
 - Corrente Preferencial das Correntes Superficiais (Inverno)
 - Área de Domínio da Pesca Artesanal (Linha de Fundação)
 - Área de Domínio da Pesca Industrial (Espirito de Superfície e Fundo, Vira e Boca Viva, Arrasto com Rede)
 - Unidades de Conservação
 - Zona de Amortecimento (10km) das Unidades de Conservação
 - Escrito Santeiro
 - 1- APA de Conceição da Barra
 - 2- Estação Biológica de Barra Nova
 - 3- Reserva Biológica de Corumbau
 - 4- Parque Natural Municipal David V. Faria
 - 5- Reserva Ecológica Manguezal Pirajá-Açu e Pirajá-Mirim
 - 6- Reserva de Biologia Marinha de Santa Cruz
 - 7- APA Costa das Albas
 - 8- APA Lago de Jaconé
 - 9- APA da Praia Moa
 - 10- Reserva Ecológica Municipal Ilha do Lançamento
 - 11- APA do Morro do Monte
 - 12- Parque Ecológico Morro do Penedo
 - 13- Reserva Ecológica Municipal Praieira de Camburi
 - 14- Parque Natural Municipal de Jacarandá
 - 15- Área Estadual Pôrto Cascalho-Vinha
 - 16- APA de Três Ilhas
 - 17- APA de Itabela
 - 18- APA de Guarabara

- Níveis de Sensibilidade Ambiental**
- 1 - Costões rochosos ísois, fendas em rochas sedimentares, estruturas artificiais (aço)
 - 2 - Tempo recente lido ou subseqüente de instabilidade média a espessa (fósil comum)
 - 3 - Praias desprovidas, de areia fina a média, organizada
 - 4 - Praias de areia grossa grossa intermediárias, de areia fina a média, espaciais
 - 5 - Praias mistas de cascalho e areia, plataforma de abrasão, superfície irregular ou recoberta de vegetação (fósil comum)
 - 6 - Praias de cascalho, depósito de talas, enrocamento; pedregalmo no coral-lado no lido
 - 7 - Plataforma de areia arenosa exposta de baixa-mar
 - 8 - Encosta de rocha lisa abrigada, encosta de rocha não lisa abrigada; enrocamento
 - 9 - Plataforma de areia arenosa abrigada tempo de baixa-mar sempre abrigado
 - 10 - Terreno aquático, bambuzais, mangro, mangrove de rios e lagoas, marismas, manguezais
- Recursos Biológicos e Sócio-Econômicos**
- Aeroporto
 - Praias
 - Pesca Artesanal
 - Camarões
 - Carangujas
 - Galvetas e Andorinhas
 - Crustáceos e Mexilhões
 - Área de Nidificação de Aves Odeadoras
 - Áreas Pânticas
 - Unidades de Conservação Marinha
 - Local de Desove de Quaternários (Condição cartográfica e demográfica simplificada)
 - Sedimentos Biocásticos e Algas Calcárias
 - Área de Concentração de Bateria Jubarte (Megaptera novaeangliae)
 - Rota de Tinturugas, Aves Marinhas e Peixes Calcários (Fundos) Abundantes e Coloridos (Piscicultura e Turismo Sustentável)
 - Rota Migratória das Baleias Jubarte (Megaptera novaeangliae)
- Probabilidade de Presença de Óleo (N)**
 Por caso (ultrapassagem do FPSO): após 30 dias no inverno tempo mínimo para atingir a costa = 90 horas, probabilidade máxima na toca na costa = 5000m, este tipo de toca de costa com probabilidade de toques = 500m
- 0 - 10
 - 10 - 20
 - 20 - 30
 - 30 - 40
 - 40 - 50
 - 50 - 60
 - 60 - 70
 - 70 - 80
 - 80 - 90
 - 90 - 100
- Centro Delimitativo Crítico**
 Por caso (ultrapassagem do FPSO): após 30 dias no inverno tempo mínimo para atingir a costa = 31 horas, volume de óleo que chega a costa = 43,42m³ espalhado limite para ambiente sensível = 0,0020mm, espessura de filme de recolhimento 0,05mm
- Entre 0,0020 e 0,0010 (mm)
 - Entre 0,0010 e 0,0005 (mm)
 - Entre 0,0005 e 0,0010 (mm)
 - Entre 0,0010 e 0,0010 (mm)
 - Entre 0,0010 e 0,0005 (mm)

