

APÊNDICE 7.2

APÊNDICE 7.2

Tabela com táxons obtidos no Projeto Marseal (2010-2011) e registro da presença destes táxons nas amostragens de caracterização da plataforma, nos convênios/contratos desenvolvidos entre a PETROBRAS e a Universidade Federal de Sergipe. Cada campanha de amostragem está designada pelo período do convênio/contrato.

| TÁXON | 2010-2011 | 2001-2003 | 1999-2000 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Porifera | X | X | X |
| Cnidaria | | | |
| <i>Renilla</i> sp. | X | X | X |
| Nemertea | X | | |
| Sipunculidea | X | | |
| Echiura | X | | |
| Polychaeta | | | |
| Amphinomidae | X | | |
| Aphroditidae | X | | |
| Capitellidae | X | | |
| Eunicidae | X | | |
| Hesionidae | X | | |
| Lumbrineridae | X | | |
| Maldanidae | X | | |
| Nereididae | X | | |
| Onuphidae | X | | |
| Owenidae | X | | |
| Pectinariidae | X | | |
| Polynoidae | X | | |
| Sabellidae | X | | |
| Serpullidae | X | | |
| Terebellidae | X | | |
| Arthropoda-Crustacea | | | |
| <i>Acanthonyx dissimulatus</i> | X | | |
| <i>Acetes americanus</i> | X | X | X |
| <i>Alpheus</i> sp. | X | | |
| <i>Anomalothir furcillatus</i> | X | | |
| <i>Calappa angusta</i> | X | | |
| <i>Calappa sulcata</i> | X | X | X |
| Callianassidae | X | | |
| <i>Callidactylus asper</i> | X | | |

(continua)

(continuação – Apêndice 7.2)

| TÁXON | 2010-2011 | 2001-2003 | 1999-2000 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Callinectes danae</i> | X | | |
| <i>Callinectes ornatus</i> | X | X | X |
| <i>Chasmocarcinus</i> sp. | X | | |
| <i>Collodes inermis</i> | X | | |
| <i>Collodes</i> sp | X | | |
| <i>Coryrhynchus algicola</i> | X | X | |
| <i>Cronius ruber</i> | X | X | |
| <i>Cronius tumidulus</i> | X | | X |
| <i>Cryptodromiopsis antillensis</i> | X | X | |
| <i>Cryptodromiopsis</i> sp. | X | | |
| <i>Ctenodrilus serratus</i> | X | | |
| <i>Dardanus venosus</i> | X | | X |
| <i>Ericerodes gracilipes</i> | X | | |
| <i>Exhippolysmata oplophoroides</i> | X | X | X |
| <i>Farfantepenaeus subtilis</i> | X | X | X |
| <i>Gibbesia prasinolineata</i> | X | X | X |
| <i>Hepatus gronovii</i> | X | | |
| <i>Hepatus pudibundus</i> | X | X | X |
| <i>Hypoconcha arcuata</i> | X | X | |
| <i>Iliacantha liodactylus</i> | X | X | |
| Inachidae | X | | |
| <i>Iridopagurus</i> sp. | X | | |
| <i>Libinia ferreirae</i> | X | X | X |
| <i>Litopenaeus schmitti</i> | X | X | X |
| <i>Macrocoeloma concavum</i> | X | | |
| <i>Macrocoeloma eutheca</i> | X | | |
| <i>Macrocoeloma laevigatum</i> | X | | |
| <i>Macrocoeloma septemspinusum</i> | X | | |
| <i>Macrocoeloma trispinosum</i> | X | | |
| <i>Metoporphaphis calcarata</i> | X | | |
| <i>Mithraculus forceps</i> | X | | |
| <i>Mithrax caribaeus</i> | X | | |
| <i>Mithrax hemphilli</i> | X | | |
| <i>Mithrax hispidus</i> | X | | |
| <i>Mithrax tortugae</i> | X | | |
| <i>Nematopalaemon schmitti</i> | X | X | X |
| <i>Nemausa acuticornis</i> | X | | |
| <i>Neogonodactylus oerstedii</i> | X | | |
| <i>Notolopas brasiliensis</i> | X | | |
| <i>Paguristes erythrops</i> | X | | |

(continua)

(continuação – Apêndice 7.2)

| TÁXON | 2010-2011 | 2001-2003 | 1999-2000 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Paguristes</i> sp. | X | | |
| Paguridae | X | X | X |
| <i>Palaemonetes</i> sp. | X | X | X |
| <i>Palaemonetes vulgaris</i> | X | | |
| Palaemonidae | X | | |
| Palinuroidea | X | X | |
| <i>Panopeus</i> sp | X | X | |
| <i>Panulirus argus</i> | X | X | X |
| <i>Panulirus laevicauda</i> | X | | |
| <i>Paractaea rufopunctata nodosa</i> | X | | |
| <i>Parribacus antarcticus</i> | X | | |
| <i>Parthenope agona</i> | X | | |
| <i>Persephona lichtensteinii</i> | X | X | X |
| <i>Persephona punctata</i> | X | X | X |
| <i>Petrochirus diogenes</i> | X | | |
| <i>Petrolisthes rosariensis</i> | X | | |
| <i>Picroceroides tubularis</i> | X | | |
| <i>Pilumnus floridanus</i> | X | | |
| <i>Pilumnus spinosissimus</i> | X | | |
| <i>Pilumnus</i> sp. | X | | |
| <i>Pitho herminieri</i> | X | | |
| <i>Podochela brasiliensis</i> | X | X | |
| <i>Podochela minusculus</i> | X | X | |
| <i>Polybiinae</i> sp. | X | | |
| <i>Pomatogebia operculata</i> | X | | |
| <i>Portunus anceps</i> | X | X | |
| <i>Portunus spinicarpus</i> | X | X | X |
| <i>Portunus spinimanus</i> | X | X | X |
| <i>Pseudosquilla ciliata</i> | X | | |
| <i>Raninoides loevis</i> | X | X | |
| <i>Rimapenaeus constrictus</i> | X | | |
| <i>Sicyonia brevirostris</i> | X | | |
| <i>Sicyonia dorsalis</i> | X | X | X |
| <i>Sicyonia stimpsoni</i> | X | | |
| <i>Sicyonia typica</i> | X | X | X |
| <i>Speocarcinus</i> sp. | X | | |
| <i>Squilla brasiliensis</i> | X | X | X |
| <i>Stenorhynchus seticornis</i> | X | X | |
| <i>Symethis variolosa</i> | X | | |
| <i>Synalpheus</i> sp. | X | | |

(continua)

(continuação – Apêndice 7.2)

| TÁXON | 2010-2011 | 2001-2003 | 1999-2000 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Thyrolambrus astroides</i> | X | | |
| <i>Trachycaris restrictus</i> | X | | |
| <i>Tyche potiguara</i> | X | | |
| Xanthidae | X | | |
| <i>Xiphopenaeus kroyeri</i> | X | X | X |
| Arthropoda-Pycnogonida | | | |
| Callipallenidae | X | | |
| Mollusca | | | |
| <i>Amygdalum dendriticum</i> | X | | |
| <i>Anachis veleda</i> | X | | |
| <i>Anadara boughmani</i> | X | | |
| <i>Anadara chemitz</i> | X | | |
| <i>Anadara notabilis</i> | X | X | |
| <i>Anadara secernenda</i> | X | | |
| <i>Arca imbricata</i> | X | X | |
| <i>Arca zebra</i> | X | X | |
| <i>Architectonica nobilis</i> | X | | X |
| <i>Arcinella brasiliiana</i> | X | | |
| Bucinidae | X | | |
| <i>Bursa corrugata ponderosa</i> | X | | X |
| <i>Bursa rhodostoma thomae</i> | X | | |
| <i>Calliostoma echinatum</i> | X | | |
| <i>Calliostoma hassler</i> | X | | |
| <i>Calliostoma</i> sp. | X | | |
| <i>Callistochiton</i> sp. | X | | |
| <i>Chama</i> sp. | X | X | |
| Chamidae | X | | |
| <i>Chicoreus formosus</i> | X | | |
| <i>Chicoreus pomum</i> | X | | |
| <i>Chione cancellata</i> | X | | |
| <i>Chione</i> sp.1 | X | | |
| <i>Chione</i> sp.2 | X | | |
| <i>Chlamys</i> cf. <i>munda</i> | X | | |
| <i>Chlamys</i> sp. | X | X | |
| <i>Columbraria obscura</i> | X | | |
| <i>Conus austini</i> | X | | |
| <i>Cypraea acicularis</i> | X | | |
| <i>Cypraea cinerea</i> | X | | |
| Discodorididae | X | | |
| <i>Distorsio clathrata</i> | X | X | X |

(continua)

(continuação – Apêndice 7.2)

| TÁXON | 2010-2011 | 2001-2003 | 1999-2000 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Distorsio constricta</i> | X | | |
| <i>Laevicardium pictum</i> | X | | |
| <i>Lima lima</i> | X | X | |
| <i>Loligo</i> sp. | X | X | X |
| <i>Lolliguncula brevis</i> | X | X | X |
| <i>Macoma tageliformis</i> | X | | |
| Marginellidae | X | | |
| Mithracidae | X | | |
| <i>Morum denisoni</i> | X | | |
| <i>Natica cayenensis</i> | X | | |
| <i>Nemocardium</i> sp. | X | | |
| <i>Nemocardium tinctum</i> | X | | |
| Octopodidae | X | | |
| <i>Octopus joubini</i> | X | | |
| <i>Octopus macropus</i> | X | | |
| <i>Octopus vulgaris</i> | X | | |
| <i>Oliva sayana</i> | X | | X |
| <i>Paraleptopecten bavayi</i> | X | | |
| <i>Pecten chazaliei</i> | X | | |
| Pectinidae | X | X | |
| <i>Phyllonotum pomun</i> | X | | |
| <i>Pickfordiateuthis pulchella</i> | X | | |
| <i>Pitar albidus</i> | X | | |
| <i>Pitar arestus</i> | X | | X |
| <i>Pollia tincta</i> | X | | |
| Polyplacophora | X | | |
| <i>Polystira florence</i> | X | | |
| <i>Pteria hirundo</i> | X | | |
| Ranellidae | X | | |
| Rapaninae | X | | |
| <i>Scaphander watsoni</i> | X | | |
| <i>Spathochlamys benedicti</i> | X | | |
| <i>Tellina angulosa</i> | X | | |
| <i>Tellina envitrea</i> | X | | |
| <i>Tellina</i> sp. | X | | |
| <i>Temnoconcha brasiliiana</i> | X | | |
| <i>Terebra taurina</i> | X | | |
| <i>Tonna galea</i> | X | X | X |
| <i>Trachycardium magnum</i> | X | | |

(continua)

(conclusão – Apêndice 7.2)

| TÁXON | 2010-2011 | 2001-2003 | 1999-2000 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Tritonoharpa lanceollata</i> | X | | |
| <i>Vasum cassiforme</i> | X | X | X |
| Veneridae | X | | |
| <i>Ventricolaria strigillina</i> | X | | |
| <i>Vexillum hendersoni</i> | X | | |
| <i>Xenophora conchyliophora</i> | X | X | X |
| Echinodermata | | | |
| <i>Astropecten braziliensis</i> | X | X | X |
| <i>Astropecten marginatus</i> | X | X | X |
| Echinoidea | X | | X |
| <i>Encope emarginata</i> | X | | |
| <i>Eucidaris tribuloides</i> | X | | X |
| Gorgonocephalidae | X | | |
| <i>Luidia clathrata</i> | X | X | |
| <i>Luidia senegalensis</i> | X | X | X |
| <i>Lytechinus variegatus</i> | X | X | X |
| <i>Moira atropos</i> | X | | |
| <i>Narcissia trigonaria</i> | X | X | |
| Ophiuroidea sp. | X | X | X |
| Ophiuroidea sp.1 | X | | |
| Ophiuroidea sp.2 | X | | |
| Ophiuroidea sp.3 | X | | |
| Ophiuroidea sp.4 | X | | |
| Ophiuroidea sp.5 | X | | |
| Ophiuroidea sp.6 | X | | |
| Ophiuroidea sp.7 | X | | |
| Ophiuroidea sp.8 | X | | |
| Ophiuroidea sp.9 | X | | |
| Ophiuroidea sp.10 | X | | |
| Ophiuroidea sp.11 | X | | |
| Ophiuroidea sp.12 | X | | |
| Ophiuroidea sp.13 | X | | |
| Ophiuroidea sp.14 | X | | |
| Ophiuroidea sp.15 | X | | |
| Ophiuroidea sp.16 | X | | |
| Ophiuroidea sp.17 | X | | |
| Ophiuroidea sp.18 | X | | |
| Ophiuroidea sp.19 | X | | |
| Ophiuroidea sp.20 | X | | |
| <i>Tropiometra carinata</i> | X | | |