

**ANEXO
EIA da NSS
BR-040**

Lista de Fauna

CONCER/CÉU-ABERTO

11 de janeiro de 2010

Tabela 1: Espécies citadas para a área de interesse do empreendimento, segundo fontes bibliográficas consultadas. A taxonomia e a seqüência sistemática das espécies encontram-se atualizadas de acordo com a mais recente Lista das Aves do Brasil (CBRO, 2009). O status de conservação das mesmas refere-se a sua eventual presença nas listas de espécies ameaçadas do Brasil (Brasil, 2003) e do estado do Rio de Janeiro (Alves *et al*, 2000).

Nome do táxon	Nome popular	Habitat	Conservação
Tinamiformes			
Tinamidae			
<i>Tinamus solitarius</i> EN	macuco	F	EP (RJ)
<i>Crypturellus soui</i>	tururim	B	
<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambuguaçu	F	
<i>Crypturellus tataupa</i>	inhambu-chintã	B	
Galliformes			
Cracidae			
<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba	F; B	
Odontophoridae			
<i>Odontophorus capueira</i> EN	uru	F	PA (RJ)
Podicipediformes			
Podicipedidae			
<i>Tachybaptus dominicus</i>	mergulhão-pequeno	A	
Cathartiformes			
Cathartidae			
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	A	
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta	A; U	
<i>Sarcorampus papa</i>	urubu-rei	F; B; A	VU (RJ)
Falconiformes			
Accipitridae			
<i>Chondrohierax uncinatus</i>	caracoleiro	B	
<i>Harpagus diodon</i>	gavião-bombachinha	F; B	
<i>Accipiter superciliosus</i>	gavião-miudinho	F; B	PA (RJ)
<i>Leucopternis lacemulatus</i> EN	gavião-pombo-pequeno	F	AM (BRA); VU (RJ)
<i>Leucopternis polionotus</i> EN	gavião-pombo-grande	F	PA (RJ)
<i>Harpyhaliaetus coronatus</i>	águia-cinzenta	A	AM (BRA); SD (RJ)
<i>Pernohierax leucorrhous</i>	gavião-de-sobre-branco	F; B	
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	B; A; U	
<i>Buteo albicaudatus</i> IN	gavião-de-rabo-branco	A	
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta	B; A	
<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pega-macaco	F	PA (RJ)
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	gavião-pato	F	VU (RJ)
<i>Spizaetus omatus</i>	gavião-de-penacho	F	PE (RJ)
Falconidae			
<i>Caracara plancus</i>	caracará	A	
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	A	
<i>Herpetotheres cachinnans</i> IN	acauã	A	
<i>Micrastur ruficollis</i>	falcão-caburé	F	
<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri	B; A	
<i>Falco ruficularis</i>	cauré	A	
Gruiformes			
Rallidae			
<i>Aramides saracura</i> EN	saracura-do-mato	B	
<i>Porzana albicollis</i>	sanã-carijó	B; A	
Charadriiformes			
Rostratulidae			
<i>Nycticryphes semicollaris</i>	narceja-de-bico-torto	A	PA (RJ)
Columbiformes			
Columbidae			
<i>Columbina minuta</i>	rolinha-de-asa-canela	B; A	
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	B; A; U	
<i>Claravis pretiosa</i>	pararu-azul	B	
<i>Claravis godefrida</i> EN	pararu-espelho	F	AM (BRA); EP (RJ)
<i>Patagioenas maculosa</i>	pomba-do-orvalho	B	
<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa	F	
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	B	
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-gemeadeira	F; B	
<i>Geotrygon montana</i>	pariri	F; B	

Nome do táxon	Nome popular	Habitat	Conservação
Psittaciformes			
Psittacidae			
<i>Pyrrhura frontalis</i> EN	tiriba-de-testa-vermelha	F; B; U	
<i>Pyrrhura leucotis</i> EN	tiriba-de-orelha-branca	F; B	AM (BRA); VU (RJ)
<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim	B	
<i>Brotogeris tirica</i> EN	periquito-rico	F; B	
<i>Touit melanonotus</i> EN	apuim-de-costas-pretas	F	AM (BRA); VU (RJ)
<i>Pionopsitta pileata</i> EN	cuiú-cuiú	F; B	PA (RJ)
<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde	F; B	
<i>Triclaria malachitacea</i> EN	sabiá-dca	F; B	VU (RJ)
Cuculiformes			
Cuculidae			
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	F; B	
<i>Coccyzus melacoryphus</i>	papa-lagarta-acanelado	B	
<i>Coccyzus americanus</i>	papa-lagarta-de-asa-vermelha	B	
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	B; A; U	
<i>Tapera naevia</i>	saci	B	
Strigiformes			
Strigidae			
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	B; U	
<i>Megascops atricapilla</i> EN	corujinha-sapo	F	
<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> EN	murucututu-de-barriga-amarela	F	
<i>Bubo virginianus</i>	jacurutu	B; A	
<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé	B	
<i>Athene cunicularia</i> IN	coruja-buraqueira	A	
<i>Asio clamator</i>	coruja-orelhuda	B; A	
Caprimulgiformes			
Nyctibiidae			
<i>Nyctibius griseus</i>	mãe-da-lua	F; B	
Caprimulgidae			
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	F; B	
<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau	B; A	
<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura	B; A	
Apodiformes			
Apodidae			
<i>Cypseloides fumigatus</i>	taperuçu-preto	F; B; A; U	
<i>Streptoprocne zonaris</i>	taperuçu-de-coleira-branca	F; B; A; U	
<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-sobre-cinza	F; B	
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal	F; B; A; U	
<i>Tachornis squamata</i>	tesourinha	B; A	
<i>Panyptila cayennensis</i>	andorinhão-estofador	F; B; A	
Trochilidae			
<i>Ramphodon naevius</i> EN	beija-flor-rajado	F; B	PA (RJ)
<i>Glaucis hirsutus</i>	balança-rabo-de-bico-torto	B	
<i>Phaethornis squalidus</i>	rabo-branco-pequeno	F; B	
<i>Phaethornis ruber</i>	rabo-branco-rubro	F; B	
<i>Phaethornis eurynome</i> EN	rabo-branco-de-garganta-rajada	F; B	
<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	B; U	
<i>Aphantochroa cirrochloris</i> EN	beija-flor-cinza	B; U	
<i>Florisuga fusca</i> EN	beija-flor-preto	B; U	
<i>Colibri serrirostris</i>	beija-flor-de-orelha-violeta	B; A	
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta	B	
<i>Stephanoxis lalandi</i> EN	beija-flor-de-topete	B	
<i>Lophomis magnificus</i>	topetinho-vermelho	B	
<i>Discosura longicaudus</i>	bandeirinha	F	
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-velho	B; U	
<i>Thalurania glaucopsis</i> EN	beija-flor-de-frente-violeta	B; U	
<i>Hylocharis sapphirina</i>	beija-flor-safira	B	
<i>Hylocharis cyanus</i>	beija-flor-roxo	B	
<i>Leucochloris albicollis</i> EN	beija-flor-de-papo-branco	B; U	
<i>Amazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca	B; U	
<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	B; U	
<i>Clytolaema rubricauda</i> EN	beija-flor-rubi	F; B	
<i>Calliphlox amethystina</i>	estrelinha-ametista	B; U	
Trogoniformes			

Nome do táxon	Nome popular	Habitat	Conservação
Trogonidae			
<i>Trogon viridis</i>	surucuá-grande-de-barriga-amarela	F; B	
<i>Trogon surrucura</i> EN	surucuá-variado	F; B	
<i>Trogon rufus</i>	surucuá-de-barriga-amarela	F; B	
Coraciiformes			
Alcedinidae			
<i>Chloroceryle aenea</i>	martinho	B	SD (RJ)
Momotidae			
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> EN	juruva-verde	F; B	
Galbuliformes			
Galbulidae			
<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba-de-cauda-ruiva	B	
Bucconidae			
<i>Nystalus chacuru</i> IN	joão-bobo	B	
<i>Malacoptila striata</i> EN	barbudo-rajado	F; B	
Piciformes			
Ramphastidae			
<i>Ramphastos vitellinus</i> EN	tucano-de-bico-preto	F; B	
<i>Ramphastos dicolorus</i>	tucano-de-bico-verde	F; B	
<i>Selenidera maculirostris</i> EN	araçari-poca	F; B	
<i>Pteroglossus bailloni</i> EN	araçari-banana	F; B	
Picidae			
<i>Picumnus cirratus</i>	pica-pau-anão-barrado	F; B; U	
<i>Melanerpes flavifrons</i> EN	benedito-de-testa-amarela	F; B	
<i>Veniliornis maculifrons</i> EN	picapauzinho-de-testa-pintada	F; B	
<i>Piculus flavigula</i>	pica-pau-bufador	F; B	
<i>Piculus aurulentus</i> EN	pica-pau-dourado	F; B	
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	A	
<i>Ceelus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela	F; B	
Passeriformes			
Thamnophilidae			
<i>Hypoedaleus guttatus</i> EN	chocão-carijó	F; B	
<i>Batara cinerea</i>	matracão	F	
<i>Mackenziaena severa</i> EN	borralhara	F; B	
<i>Biatas nigropectus</i> EN	papo-branco	F	AM (BRA); PA (RJ)
<i>Thamnophilus palliatus</i>	choca-listrada	B	
<i>Thamnophilus ambiguus</i> EN	choca-de-sooretama	B	
<i>Dysithamnus stictothorax</i> EN	choquinha-de-peito-pintado	B	
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa	B	
<i>Dysithamnus xanthopterus</i> EN	choquinha-de-asa-ferrugem	B	
<i>Myrmotherula gularis</i> EN	choquinha-de-garganta-pintada	F; B	
<i>Myrmotherula axillaris</i>	choquinha-de-flanco-branco	B	
<i>Myrmotherula minor</i> EN	choquinha-pequena	F; B	AM (BRA); VU (RJ)
<i>Myrmotherula unicolor</i>	choquinha-cinzenta	B	
<i>Drymophila ferruginea</i> EN	trovoada	F; B	
<i>Drymophila genei</i> EN	choquinha-da-serra	B; A	
<i>Drymophila ochropyga</i> EN	choquinha-de-dorso-vermelho	B	
<i>Drymophila squamata</i> EN	pintadinho	F; B	
<i>Terenura maculata</i> EN	zidedê	F; B	
<i>Pyriglena leucoptera</i> EN	papa-taoca-do-sul	F; B	
<i>Myrmeciza loricata</i> EN	formigueiro-assobiador	F; B	
Conopophagidae			
<i>Conopophaga lineata</i> EN	chupa-dente	B	
<i>Conopophaga melanops</i> EN	cuspidor-de-máscara-preta	B	
Grallariidae			
<i>Grallaria varia</i>	tovacuçu	F; B	
Rhinocryptidae			
<i>Scytalopus notorius</i> EN	tapaculo-preto	F	
Formicariidae			
<i>Formicarius colma</i>	galinha-do-mato	F; B	
<i>Chamaeza campanisona</i>	tovaca-campainha	F	
<i>Chamaeza ruficauda</i> EN	tovaca-de-rabo-vermelho	F	
Scleruridae			
<i>Sclerurus scansor</i> EN	vira-folha	F; B	
Dendrocolaptidae			

Nome do táxon	Nome popular	Habitat	Conservação
<i>Dendrocincla turdina</i> EN	arapaçu-liso	F; B	
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde	F; B	
<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	arapaçu-de-garganta-branca	F; B	
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande	F; B	
<i>Xiphorhynchus fuscus</i> EN	arapaçu-rajado	F; B	
<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	arapaçu-de-garganta-amarela	F	SD (RJ)
<i>Lepidocolaptes squamatus</i> EN	arapaçu-escamado	F; B	
<i>Campylorhynchus falcularius</i> EN	arapaçu-de-bico-torto	F; B	
Furnariidae			
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	B; A; U	
<i>Synallaxis ruficapilla</i> EN	pichororé	B	
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném	B; A	
<i>Phacellodomus erythrophthalmus</i> EN	joão-botina-da-mata	B	
<i>Anabacerthia amaurotis</i> EN	limpa-folha-miúdo	F; B	
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete	F; B	
<i>Philydor lichtensteini</i> EN	limpa-folha-ocráceo	F; B	
<i>Philydor atricapillus</i> EN	limpa-folha-coroado	F; B	
<i>Philydor rufum</i>	limpa-folha-de-testa-baia	F; B	
<i>Anabazenops fuscus</i> EN	trepador-coleira	F; B	
<i>Cichlocolaptes leucophrus</i> EN	trepador-sobrancelha	F; B	
<i>Automolus leucophthalmus</i> EN	barranqueiro-de-olho-branco	F; B	
<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca	F; B	
<i>Heliobletus contaminatus</i> EN	trepadorzinho	F; B	
<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo	F; B	
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó	F; B	
Tyrannidae			
<i>Mionectes oleagineus</i>	abre-asa	F; B	
<i>Mionectes rufiventris</i> EN	abre-asa-de-cabeça-cinza	F; B	
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	F; B	
<i>Corythopis delalandi</i>	estalador	B	
<i>Hemitriccus orbitatus</i> EN	tiririzinho-do-mato	F; B	
<i>Todirostrum poliocephalum</i> EN	teque-teque	B	
<i>Todirostrum cinereum</i> IN	ferreirinho-relógio	A	
<i>Phyllomyias virescens</i> EN	piolhinho-verdoso	B	
<i>Myiopagis gaimardii</i>	maria-pechim	F; B	
<i>Elaenia flavogaster</i>	guara-cava-de-barriga-amarela	B; U	
<i>Elaenia mesoleuca</i>	tuque	B	
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	B	
<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela	F; B	
<i>Euscarthmus meloryphus</i>	barulhento	B	
<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-do-mato	F; B	
<i>Phylloscartes oustaleti</i> EN	papa-moscas-de-olheiras	F; B	VU (RJ)
<i>Phylloscartes difficilis</i> EN	estalinho	F; B	
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	B	
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho	F; B	
<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	B	
<i>Myiobius barbatus</i>	assanhadinho	F; B	
<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro	B; A; U	
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	F; B	
<i>Knipolegus cyanirostris</i>	maria-preta-de-bico-azulado	B; A	
<i>Knipolegus nigerrimus</i> EN	maria-preta-de-garganta-vermelha	B; A	
<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno	B	
<i>Fluvicola nengeta</i> IN	lavadeira-mascarada	B; A; U	
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	B	
<i>Machetornis rixosa</i> IN	suiriri-cavaleiro	B; A; U	
<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-pirata	F; B	
<i>Myiozetetes cayanensis</i>	bentevizinho-de-asa-ferrugínea	B	
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho	B; U	
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	B; A; U	
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	B	
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	F; B	
<i>Empidonomus varius</i>	peítica	B	
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	B; A; U	
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	B; A	
<i>Rhytipterna simplex</i>	vissia	B	

Nome do táxon	Nome popular	Habitat	Conservação
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	maria-cavaleira-pequena	B	
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	B	
<i>Attila rufus</i> EN	capitão-de-saíra	B	
Cotingidae			
<i>Phibalura flavirostris</i>	tesourinha-da-mata	B	PA (RJ)
<i>Carpomys cucullata</i> EN	corocochó	F; B	
<i>Procnias nudicollis</i> EN	araponga	F; B	PA (RJ)
<i>Tijuca atra</i> EN	saudade	F	
<i>Tijuca condita</i> EN	saudade-de-asa-cinza	F	AM (BRA); PA (RJ)
<i>Pyroderus scutatus</i> EN	pavó	F; B	VU (RJ)
Pipridae			
<i>Ilicura militaris</i> EN	tangarazinho	F	
<i>Machaeropterus regulus</i>	tangará-rajado	F	
<i>Manacus manacus</i>	rendeira	F; B	
<i>Chiroxiphia caudata</i> EN	tangará	F	
Tityridae			
<i>Oxyruncus cristatus</i>	araponga-do-horto	F; B	
<i>Schiffornis virescens</i> EN	flautim	B	
<i>Laniisoma elegans</i> EN	chibante	F	PA (RJ)
<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-branco-de-bochecha-parda	F; B	PA (RJ)
<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto	B	
<i>Pachyramphus viridis</i>	caneleiro-verde	B	
<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro	B	
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto	B	
<i>Pachyramphus marginatus</i>	caneleiro-bordado	F	
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	B	
Vireonidae			
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	F; B	
<i>Vireo olivaceus</i>	juruviara	F; B	
<i>Hylophilus thoracicus</i>	vite-vite	B	
Hirundinidae			
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	B; A; U	
<i>Atticora tibialis</i>	calcinha-branca	B	
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	B; A	
<i>Progne tapera</i> IN	andorinha-do-campo	B; A	
<i>Progne subis</i>	andorinha-azul	B; A	
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-doméstica-grande	B; A; U	
<i>Tachycineta leucorhoa</i> IN	andorinha-de-sobre-branco	A	
<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-de-bando	A	
Troglodytidae			
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	B; A; U	
<i>Pheugopedius genibarbis</i> IN	garrinchão-pai-avô	B	
<i>Cantorchilus longirostris</i>	garrinchão-de-bico-grande	B	
Poliopitidae			
<i>Ramphocaenus melanurus</i>	bico-assoavelado	F; B	VU (RJ)
Turdidae			
<i>Catharus ustulatus</i>	sabiá-de-óculos	B	
<i>Turdus flavipes</i>	sabiá-una	F	
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	B; A; U	
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco	B; U	
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	B; A; U	
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	F	
Motacillidae			
<i>Anthus hellmayri</i>	caminheiro-de-barriga-acanelada	A	
Coerebidae			
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	B; U	
Thraupidae			
<i>Saltator fuliginosus</i> EN	pimentão	F	
<i>Saltator maximus</i>	tempera-viola	F	
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro	F	
<i>Orchesticus abeillei</i> EN	sanhaçu-pardo	F	
<i>Schistochlamys ruficapillus</i>	bico-de-veludo	B; A	
<i>Nemosia pileata</i> IN	saíra-de-chapéu-preto	B	
<i>Orthogonys chloricterus</i> EN	catirumbava	F	
<i>Trichothraupis melanops</i>	tiê-de-topete	F; B	

Nome do táxon	Nome popular	Habitat	Conservação
<i>Tachyphonus cristatus</i>	tiê-galo	F	
<i>Tachyphonus coronatus</i> EN	tiê-preto	B; U	
<i>Tachyphonus rufus</i>	pipira-preta	B	
<i>Ramphocelus bresilius</i> EN	tiê-sangue	B	
<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaçu-cinzentos	B; U	
<i>Thraupis cyanoptera</i> EN	sanhaçu-de-encontro-azul	B	
<i>Thraupis ornata</i> EN	sanhaçu-de-encontro-amarelo	B; U	
<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaçu-do-coqueiro	B; U	
<i>Stephanophorus diadematus</i>	sanhaçu-frade	B	
<i>Tangara brasiliensis</i> EN	cambada-de-chaves	B	VU (RJ)
<i>Tangara seledon</i> EN	saíra-sete-cores	B; U	
<i>Tangara cyanocephala</i> EN	saíra-militar	B; U	
<i>Tangara desmaresti</i>	saíra-lagarta	B	
<i>Tangara cayana</i> IN	saíra-amarela	B; U	
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	B; U	
<i>Dacnis nigripes</i> EN	saí-de- pernas-pretas	B	PA (RJ)
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	B; U	
<i>Hemithraupis ruficapilla</i> EN	saíra-ferrugem	F; B	
<i>Hemithraupis flavicollis</i>	saíra-galega	F; B	
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho	B; U	
Emberizidae			
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	B; A; U	
<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo	A	
<i>Haplospiza unicolor</i> EN	cigarra-bambu	F	
<i>Poospiza thoracica</i> EN	peito-pinhão	B	
<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo	A	
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	B; A	
<i>Sporophila falcirostris</i> EN	cigarra-verdadeira	B	AM (BRA); EP (RJ)
<i>Sporophila caerulea</i>	coleirinho	B; A	
<i>Coryphospingus pileatus</i> IN	tico-tico-rei-cinza	B; A	
Cardinalidae			
<i>Habia rubica</i>	tiê-do-mato-grosso	F	
<i>Caryothraustes canadensis</i>	furriel	F; B	
<i>Cyanoloxia brissonii</i>	azulão	B	VU (RJ)
Parulidae			
<i>Parula pitiayumi</i>	mariquita	B; U	
<i>Dendroica cerulea</i>	mariquita-azul	B	
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	B; A	
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	B	
Icteridae			
<i>Psarocolius decumanus</i>	japu	F; B	
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	F; B	
<i>Agelasticus cyanopus</i>	carretão	A	
<i>Molothrus oryzivorus</i>	iraúna-grande	B; A	PA (RJ)
<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta	B; A; U	
<i>Sturnella supercilialis</i> IN	polícia-inglesa-do-sul	A	
Fringillidae			
<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	B; U	
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro	B; U	
<i>Euphonia pectoralis</i> EN	ferro-velho	F; B	
Estrildidae			
<i>Estrilda astrild</i>	bico-de-lacre	A; U	
Passeridae			
<i>Passer domesticus</i>	pardal	U	

Legendas:

EN = Endêmico da Mata Atlântica (Brooks *et al*, 1999);

IN = Invasora no estado do RJ (Pacheco, 1993)

Habitat: F = Florestal; B = Borda de floresta e formações secundárias; A = Áreas abertas; U = Urbano ou antropizado;

Conservação: AM = Ameaçada; EP = Em Perigo; VU = Vulnerável; PA = Provavelmente Ameaçada; PE = Provavelmente Extinta; SD = Status Desconhecido.

Nome do táxon	Nome popular	Habitat	Conservação
<i>Tachyphonus cristatus</i>	tiê-galo	F	
<i>Tachyphonus coronatus</i> EN	tiê-preto	B; U	
<i>Tachyphonus rufus</i>	pipira-preta	B	
<i>Ramphocelus bresilius</i> EN	tiê-sangue	B	
<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaçu-cinzentos	B; U	
<i>Thraupis cyanoptera</i> EN	sanhaçu-de-encontro-azul	B	
<i>Thraupis ornata</i> EN	sanhaçu-de-encontro-amarelo	B; U	
<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaçu-do-coqueiro	B; U	
<i>Stephanophorus diadematus</i>	sanhaçu-frade	B	
<i>Tangara brasiliensis</i> EN	cambada-de-chaves	B	VU (RJ)
<i>Tangara seledon</i> EN	saíra-sete-cores	B; U	
<i>Tangara cyanocephala</i> EN	saíra-militar	B; U	
<i>Tangara desmaresti</i>	saíra-lagarta	B	
<i>Tangara cayana</i> IN	saíra-amarela	B; U	
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	B; U	
<i>Dacnis nigripes</i> EN	saí-de- pernas-pretas	B	PA (RJ)
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	B; U	
<i>Hemithraupis ruficapilla</i> EN	saíra-ferrugem	F; B	
<i>Hemithraupis flavicollis</i>	saíra-galega	F; B	
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho	B; U	
Emberizidae			
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	B; A; U	
<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo	A	
<i>Haplospiza unicolor</i> EN	cigarra-bambu	F	
<i>Poospiza thoracica</i> EN	peito-pinhão	B	
<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo	A	
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	B; A	
<i>Sporophila falcirostris</i> EN	cigarra-verdadeira	B	AM (BRA); EP (RJ)
<i>Sporophila caerulea</i>	coleirinho	B; A	
<i>Coryphospingus pileatus</i> IN	tico-tico-rei-cinza	B; A	
Cardinalidae			
<i>Habia rubica</i>	tiê-do-mato-grosso	F	
<i>Caryothraustes canadensis</i>	furriel	F; B	
<i>Cyanoloxia brissonii</i>	azulão	B	VU (RJ)
Parulidae			
<i>Parula pitiayumi</i>	mariquita	B; U	
<i>Dendroica cerulea</i>	mariquita-azul	B	
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	B; A	
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	B	
Icteridae			
<i>Psarocolius decumanus</i>	japu	F; B	
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	F; B	
<i>Agelasticus cyanopus</i>	carretão	A	
<i>Molothrus oryzivorus</i>	iraúna-grande	B; A	PA (RJ)
<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta	B; A; U	
<i>Sturnella superciliosa</i> IN	polícia-inglesa-do-sul	A	
Fringillidae			
<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	B; U	
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro	B; U	
<i>Euphonia pectoralis</i> EN	ferro-velho	F; B	
Estrildidae			
<i>Estrilda astrild</i>	bico-de-lacre	A; U	
Passeridae			
<i>Passer domesticus</i>	pardal	U	

Legendas:

EN = Endêmico da Mata Atlântica (Brooks *et al*, 1999);

IN = Invasora no estado do RJ (Pacheco, 1993)

Habitat: F = Florestal; B = Borda de floresta e formações secundárias; A = Áreas abertas; U = Urbano ou antropizado;

Conservação: AM = Ameaçada; EP = Em Perigo; VU = Vulnerável; PA = Provavelmente Ameaçada; PE = Provavelmente Extinta; SD = Status Desconhecido.

Tabela 2 - Lista das espécies levantadas em campo na área do estudo. A taxonomia e a seqüência sistemática seguem a sugerida pelo CBRO (2009). A marcação com "x" na última coluna significa a presença na lista resultante de pesquisa às fontes secundárias para a região.

Nome do táxon	Nome em português	Ponto	Habitat	Altitude
Tinamiformes Huxley, 1872				
Tinamidae Gray, 1840				
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambuquaçú	3; 4	F	E; M
Galliformes Linnaeus, 1758				
Cracidae Rafinesque, 1815				
<i>Penelope superciliosus</i> (Temminck, 1815)	jacupemba	1	F; B	E
<i>Penelope obscura</i> (Temminck, 1815)	jacuaçu	3	F	M
Pelecaniformes Sharpe, 1891				
Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849				
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	5	A	E
Ciconiiformes Bonaparte, 1854				
Ardeidae Leach, 1820				
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	1	A	E
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	1	A	E
<i>Ardea alba</i> (Linnaeus, 1758)	garça-branca-grande	1	A	E
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-facelira	1	A	E
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	1	A	E
Cathartiformes Seebohm, 1890				
Cathartidae Lafresnaye, 1839				
<i>Cathartes burrovianus</i> (Cassin, 1845)	urubu-de-cabeça-amarela	6	A	E
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	1; 2; 3; 4; 5; 6	A; U	E; M
Falconiformes Bonaparte, 1831				
Accipitridae Vigors, 1824				
<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	caracoleiro	1; 2	B	E
<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha	4	F; B	E; M
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi	3	A	E
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	1; 2; 3; 4; 5; 6	B; A; U	E; M
<i>Buteo albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-rabo-branco	1; 6	A	M
<i>Buteo brachyurus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-cauda-curta	5	B; A	M
<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	4	F	E; M
Falconidae Leach, 1820				
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará	1; 2; 3; 4; 5; 6	A	E
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	1; 2; 3; 4; 5; 6	A	E; M
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	3	F	E; M
<i>Falco femoralis</i> (Temminck, 1822)	falcão-de-coleira	1	B; A	E; M

Nome do táxon	Nome em português	Ponto	Habitat	Altitude
Gruiformes Bonaparte, 1854				
Rallidae Rafinesque, 1815				
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825) En	saracura-do-mato	2; 3; 6	B	E; M
<i>Amaurolinna concolor</i> (Gosse, 1847)	saracura-lisa	1	B	E
<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	1	B; A	E; M
Charadriiformes Huxley, 1867				
Charadriidae Leach, 1820				
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	queiro-queiro	1	A	E
Jacaniidae Chenu & Des Murs, 1854				
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jacaná	1	A	E
Columbiformes Latham, 1790				
Columbidae Leach, 1820				
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	1; 2; 3; 4; 5; 6	B; A; U	E; M
<i>Columba livia</i> (Gmelin, 1789)	pombo-doméstico	1; 5	U	E; M
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	1; 2	A	E
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa	3	F	E; M
<i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, 1855)	juruti-pupu	1	B	E
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juruti-gemeadeira	2; 3	F; B	E; M
Psittaciformes Wagler, 1830				
Psittacidae Rafinesque, 1815				
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã	3; 4	B; A	M
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817) En	tiriba-de-testa-vermelha	2; 4; 6	F; B; U	E; M
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	2; 6	B	E; M
<i>Brotogeris trica</i> (Gmelin, 1788) En	periquito-rico	5	F; B	E; M
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	2; 3; 6	F; B	E; M
<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766)	curica	1	F; B	E
Cuculiformes Wagler, 1830				
Cuculidae Leach, 1820				
<i>Playa cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	3; 4; 5; 6	F; B	E; M
<i>Crotophaga ani</i> (Linnaeus, 1758)	anu-preto	1; 6	B; A; U	E; M
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	1	B; A; U	E; M
Strigiformes Wagler, 1830				
Strigidae Leach, 1820				
<i>Athene cucularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	1	A	E
Caprimulgiformes Ridgway, 1881				
Caprimulgidae Vigors, 1825				
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju	2; 3	F; B	E; M
<i>Caprimulgus longirostris</i> (Bonaparte, 1825)	bacurau-da-telha	5	B; A; U	E; M
Apodiformes Peters, 1940				

Nome do táxon	Nome em português	Ponto	Habitat	Altitude
Gruiformes Bonaparte, 1854				
Rallidae Rafinesque, 1815				
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825) En	saracura-do-mato	2; 3; 6	B	E; M
<i>Amaurillimas concolor</i> (Gosse, 1847)	saracura-lisa	1	B	E
<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	1	B; A	E; M
Charadriiformes Huxley, 1867				
Charadriidae Leach, 1820				
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	queiro-queiro	1	A	E
Jacaniidae Chenu & Des Murs, 1854				
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	1	A	E
Columbiformes Latham, 1790				
Columbidae Leach, 1820				
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	1; 2; 3; 4; 5; 6	B; A; U	E; M
<i>Columba livia</i> (Gmelin, 1789)	pombo-doméstico	1; 5	U	E; M
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	1; 2	A	E
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa	3	F	E; M
<i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, 1855)	juruti-pupu	1	B	E
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juruti-gemeadeira	2; 3	F; B	E; M
Psittaciformes Wagler, 1830				
Psittacidae Rafinesque, 1815				
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã	3; 4	B; A	M
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817) En	tiriba-de-testa-vermelha	2; 4; 6	F; B; U	E; M
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	2; 6	B	E; M
<i>Brotogeris trica</i> (Gmelin, 1788) En	periquito-rico	5	F; B	E; M
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	2; 3; 6	F; B	E; M
<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766)	curica	1	F; B	E
Cuculiformes Wagler, 1830				
Cuculidae Leach, 1820				
<i>Playa cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	3; 4; 5; 6	F; B	E; M
<i>Crotophaga ani</i> (Linnaeus, 1758)	anu-preto	1; 6	B; A; U	E; M
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	1	B; A; U	E; M
Strigiformes Wagler, 1830				
Strigidae Leach, 1820				
<i>Athene cucularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	1	A	E
Caprimulgiformes Ridgway, 1881				
Caprimulgidae Vigors, 1825				
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju	2; 3	F; B	E; M
<i>Caprimulgus longirostris</i> (Bonaparte, 1825)	bacurau-da-telha	5	B; A; U	E; M
Apodiformes Peters, 1940				

Nome do táxon	Nome em português	Ponto	Habitat	Altitude
<i>Myrmotherula gularis</i> (Spix, 1825) En	choquinha-de-garganta-pintada	4; 6	F; B	E; M
<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	choquinha-de-flanco-branco	1	B	E
<i>Drymophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906) En	choquinha-de-dorso-vermelho	3	B	M
<i>Terenura maculata</i> (Wied, 1831) En	zidedê	2	F; B	E
<i>Pyrgilena leucoptera</i> (Vieillot, 1818) En	papa-taoca-do-sul	3; 4	F; B	E; M
Conopophagidae				
<i>Conopophaga melanops</i> (Vieillot, 1818) En	cuspidor-de-máscara-preta	2	B	E
Grallariidae				
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu	3	F; B	E; M
Formicariidae				
<i>Chamaeza ruficauda</i> (Cabanis & Heine, 1859) En	tovaca-de-rabo-vermelho	3	F	M
Dendrocolaptidae				
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	3; 4	F; B	E; M
<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-garganta-branca	3	F; B	E; M
<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818) En	arapaçu-rajado	3	F; B	E; M
<i>Campylorhamphus falcularius</i> (Vieillot, 1822) En	arapaçu-de-bico-torto	3	F; B	E; M
Furnariidae				
<i>Furnarius figulus</i> (Lichtenstein, 1823)	casaca-de-couro-da-lama	1	B; A; U	E; M
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	1	B; A; U	E; M
<i>Synallaxis ruficapilla</i> (Vieillot, 1819) En	pichororé	4	B	E; M
<i>Synallaxis spixi</i> (Sclater, 1856)	joão-teneném	3; 4; 5	B; A	E; M
<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831) En	arredio-pálido	3; 4	B	M
<i>Phacelodomus erythrophthalmus</i> (Wied, 1821) En	joão-botina-da-mata	3	B	E; M
<i>Anabazenops fuscus</i> (Vieillot, 1816) En	trepador-coleira	3; 4	F; B	E; M
<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca	3; 4	F; B	E; M
<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	bico-virado-miúdo	1	F; B	E; M
<i>Xenops rutilans</i> (Temminck, 1821)	bico-virado-carijó	6	F; B	E; M
Tyrannidae				
<i>Mionectes rufiventris</i> (Cabanis, 1846) En	abre-asa-de-cabeça-cinza	2; 6	F; B	E; M
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> (Tschudi, 1846)	cabeçudo	2; 6	F; B	E; M
<i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822) En	olho-falso	3	F; B	M
<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831) En	tiririzinho-do-mato	6	F; B	E
<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831) En	tachuri-campainha	6	B	E; M
<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818) En	miudinho	2	F; B	E; M
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831) En	teque-teque	1	B	E; M
<i>Phyllomyias burmeisteri</i> (Cabanis & Heine, 1859)	piolinho-chiador	2; 6	B	E; M
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolinho	3	B	E; M
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	1; 2; 3	B; U	E; M
<i>Campostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	1; 2; 3; 4; 5; 6	B	E; M

Nome do táxon	Nome em português	Ponto	Habitat	Altitude
<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)	marianinha-amarela	1	F; B	E; M
<i>Tolmomyias sulphureus</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	2; 3; 4; 6	B	E; M
<i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831)	bico-chato-amarelo	1	B	E; M
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	1; 3	B	E; M
<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro	1; 6	B; A; U	E; M
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	2; 3; 4; 6	F; B	E; M
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu	1	B	E
<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada	1; 2; 3; 4; 5; 6	B; A; U	E; M
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	1; 5	B; A; U	E; M
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	1; 2; 6	F; B	E
<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	bentevizinho-de-asa-ferruginea	3	B	E; M
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	1; 2; 3; 4; 5; 6	B; U	E; M
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	1; 2; 3; 4; 5; 6	B; A; U	E; M
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado	1; 2; 3; 4; 5; 6	B	E; M
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei	1; 2; 3; 4; 5; 6	F; B	E; M
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	petica	2; 6	B	E; M
<i>Tyrannus melancholicus</i> (Vieillot, 1819)	suiriri	1; 2; 3; 4; 5; 6	B; A; U	E; M
<i>Tyrannus savana</i> (Vieillot, 1808)	tesourinha	1; 6	B; A	E; M
<i>Myiarchus swainsoni</i> (Cabanis & Heine, 1859)	irré	3	B	E; M
<i>Myiarchus ferrox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	6	B	E; M
<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819) En	capitão-de-saíra	2; 4	B	E; M
Cotingidae Bonaparte, 1849				
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817) En	araponga	3	F; B	E; M
Pipridae Rafinesque, 1815				
<i>Ilicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809) En	tangarazinho	2	F	E; M
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira	1; 6	F; B	E
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793) En	tangará	2; 3; 4; 6	F	E; M
Tityridae Gray, 1840				
<i>Oxyruncus cristatus</i> (Swainson, 1821)	araponga-do-horto	4	F; B	E; M
<i>Pachyrhamphus polychropterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	6	B	E; M
Vireonidae Swainson, 1837				
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	3; 4; 5	F; B	E; M
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juvuíara	1; 2; 3; 4; 5; 6	F; B	E; M
<i>Hylophilus poicilotis</i> (Temminck, 1822) En	verdinho-coroado	3; 5	F	M
<i>Hylophilus thoracicus</i> (Temminck, 1822)	vite-vite	1	B	E
Hirundinidae Rafinesque, 1815				
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	1; 2; 3; 4; 5; 6	B; A; U	E; M
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	1; 2; 6	B; A	E; M

Nome do táxon	Nome em português	Ponto	Habitat	Altitude
Troglodytidae Swainson, 1831				
<i>Troglodytes musculus</i> (Naumann, 1823)	corruíra	1; 2; 3; 4; 5; 6	B; A; U	E; M
<i>Cantorchilus longirostris</i> (Vieillot, 1819)	garrinção-de-bico-grande	1; 2; 6	B	E; M
Turdidae Rafinesque, 1815				
<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	1; 2; 3; 4; 5; 6	B; A; U	E; M
<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	1; 2; 3; 4; 5; 6	B; U	E; M
Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838				
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	1; 2; 3; 4; 5; 6	B; U	E; M
Thraupidae Cabanis, 1847				
<i>Saltator maximus</i> (Statius Muller, 1776)	tempera-viola	1; 2; 6	F	E
<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	3	F; B	E; M
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo	1; 2; 6	F	E
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822) En	tiê-preto	1; 2; 3; 6	B; U	E; M
<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766) En	tiê-sangue	1	B	E
<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	1; 2; 3; 4; 5; 6	B; U	E; M
<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789) En	sanhaçu-de-encontro-amarelo	2; 3; 5	B; U	E; M
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	1; 2; 3; 4; 5; 6	B; U	E; M
<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776) En	saíra-sete-cores	2; 6	B; U	E; M
<i>Tangara cyanocephala</i> (Statius Muller, 1776) En	saíra-militar	6	B; U	E
<i>Tangara desmaresti</i> (Vieillot, 1819)	saíra-lagarta	3; 4	B	M
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	3	B; U	M
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	2; 6	B; U	E; M
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	1; 2; 3; 4; 6	B; U	E; M
<i>Hemithraupis flavicollis</i> (Vieillot, 1818)	saíra-galega	1; 2	F; B	E
<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	1; 6	B; U	E
Emberizidae Vigors, 1825				
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	3; 4; 5	B; A; U	E; M
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro	1	B; A; U	E; M
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	1; 2; 6	B; A	E; M
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823)	baiano	1	B; A	E; M
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	1; 2; 3; 6	B; A	E; M
Cardinalidae Ridgway, 1901				
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso	3; 6	F	E; M
<i>Caryothraustes canadensis</i> (Linnaeus, 1766)	furriel	2; 6	F; B	E
Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947				
<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	1; 2; 3; 4; 5; 6	B; U	E; M
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	1; 6	B; A	E; M
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	1; 2; 3; 4; 6	B	E; M

Nome do táxon	Nome em português	Ponto	Habitat	Altitude
Icteridae Vigors, 1825				
<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769)	japu	1	F; B	E; M
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	6	B; A; U	E; M
Fringillidae Leach, 1820				
<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo	3	B; A	M
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim	1	B; U	E
<i>Euphonia xanthogaster</i> (Sundevall, 1834)	fim-fim-grande	2; 6	F; B	E
<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801) En	ferro-velho	4; 5	F; B	E; M
Estrilidae Bonaparte, 1850				
<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	1; 2	A; U	E
Passeridae Rafinesque, 1815				
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	1; 3; 5	U	E; M

Legendas:

En = Endêmico da Mata Atlântica (Brooks *et al.*, 1999)

Pontos de Amostragem: 1 = INMETRO; 2 = Sítio do Maciel; 3 = Castelo Country Club; 4 = SAL-2; 5 = Duarte da Silveira; 6 = Grotão

Habitat: F = Florestal; B = Borda de floresta e formações secundárias; A = Áreas abertas; U = Urbano ou antropizado

Altitude: E = Baixada e encosta submontana; M = Montana