

Anexo 15. Lista de aves com provável ocorrência na AE.

Familia	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Accipitridae	<i>Accipiter bicolor</i> ^{RA}	gavião-bombachinha-grande	Floresta	Árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Accipitridae	<i>Accipiter striatus</i> ^{MI}	gavião-miúdo	Floresta	Árvores	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2019
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2019
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2019
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2019
								-	Toropi	BirdLife International, 2019
								-	Quevedos	BirdLife International, 2019
								-	Jari	BirdLife International, 2019
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2019
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2019
								-	Joia	BirdLife International, 2019
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2019
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2019
								-	Girúá	BirdLife International, 2019
								Formigueiro	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Accipitridae	<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-rabo-curto	Campo e floresta	Árvores	-	-	-	Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Accipitridae	<i>Buteo platypterus</i> ^{RA,MI}	gavião-de-asa-larga	Floresta e vegetação arbustiva	Árvores (hemisfério norte)	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Accipitridae	<i>Chondrohierax uncinatus</i> ^{RA}	caracoleiro	Áreas úmidas e floresta	Alto de árvores	DD	-	-	-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Accipitridae	<i>Circus buffoni</i>	gavião-do-banhado	Áreas úmidas	Solo em locais pantanosos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Capão do Cipó	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Accipitridae	<i>Circus cinereus</i> ^{RA,MI}	gavião-cinza	Áreas úmidas e campo	Campos úmidos com vegetação alta	VU	VU	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Accipitridae	<i>Elanoides forficatus</i> ^{MI}	gavião-tesoura	Floresta	Alto de árvores	-	-	-	-	São Sepé	BirdLife International, 2016; BENCKE, 2001
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Accipitridae	<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira	Campo	Ninhos abandonados ou em árvores	-	-	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Accipitridae	<i>Geranoaetus albicaudatus</i> ^{RA}	gavião-de-rabo- branco	Campo e floresta	Árvores ou rochas entre gravatás	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Accipitridae	<i>Geranoaetus melanoleucus</i> ^{RA}	águia-serrana	Campo	Escarpas rochosas com galhos secos	NT	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Accipitridae	<i>Geranospiza caerulescens</i> ^{RA}	gavião-pernilongo	Floresta	AVES DE RAPINA Árvores	-	-	-	-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Accipitridae	<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo	Áreas úmidas e campo	Árvores altas, eucaliptos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Accipitridae	<i>Ictinia plumbea</i> ^{MI}	sovi	Floresta	Galhos grossos em foma de foquilha	-	-	-	-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Accipitridae	<i>Leptodon cayanensis</i> ^{RA}	gavião-gato	Floresta	Forquilhas de árvores a 15 metros de altura ou mais	NT	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								Accipitridae	<i>Parabuteo unicinctus</i> ^{RA}	gavião-asa-telha
-	São Sepé	BirdLife International, 2016								
-	Formigueiro	BirdLife International, 2016								
-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016								
-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016								
-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016								
-	Toropi	BirdLife International, 2016								
-	Quevedos	BirdLife International, 2016								
-	Jari	BirdLife International, 2016								
-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016								
-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016								
-	Joia	BirdLife International, 2016								
-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016								

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Accipitridae	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro	Áreas úmidas	Sarandis e matagais próximos a cropos d'água	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Accipitridae	<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	Campo e floresta	Árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Capão do Cipó	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Accipitridae	<i>Spizaetus melanoleucus</i> ^{RA}	gavião-pato	Campo e floresta	No alto de árvores grande em florestas	EN	-	-	Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Accipitridae	<i>Spizaetus tyrannus</i> ^{RA}	gavião-pega-macaco	Floresta e vegetação arbustiva	Árvores	EN	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Accipitridae	<i>Urubitinga coronata</i> ^{RA}	águia-cinzenta	Campo e floresta	Árvores altas	CR	EN	EN	-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Accipitridae	<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto	Áreas úmidas	Árvore	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Alcedinidae	<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	Áreas úmidas	Buracos em barrancos	-	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Alcedinidae	<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	Áreas úmidas	Buracos em barrancos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	Áreas úmidas	Buracos em barrancos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Anatidae	<i>Amazonetta brasiliensis</i> ^{CI}	marreca-pé-vermelho	Áreas úmidas	No solo em pastagens baixas próximo a brejos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Capão do Cipó	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Anatidae	<i>Anas flavirostris</i> ^{CI}	marreca-pardinha	Áreas úmidas	Cavidades no solo, ninhos de caturrita abandonado	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Anatidae	<i>Anas georgica</i> ^{CI}	marreca-parda	Áreas úmidas	No solo em pastagens baixas próximo a brejos	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Girúá	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Anatidae	<i>Anas versicolor</i> ^{CI}	marreca-criri	Áreas úmidas	No solo em campos próximo a brejos ou ninhos de caturrita abandonados	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Anatidae	<i>Cairina moschata</i> ^{CI}	pato-do-mato	Áreas úmidas	Cavidade de árvores ou em galhos de árvores, ninhos de águias e ciconídeos abandonados	NT	-	-	Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Anatidae	<i>Calonetta leucophrys</i> ^{CI}	marreca-oveira	Áreas umidas	Oco de árvores, oco de barrancos, ninhos de caturrita abandonados e de pica-paus do gênero <i>Campephilus</i>	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								Formigueiro	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Anatidae	<i>Coscoroba coscoroba</i> ^{CI}	capororoca	Áreas úmidas	Inotas secas em banhados	-	-	-	-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Anatidae	<i>Dendrocygna autumnalis</i> ^{CI,RA}	marreca-cabocla	Áreas úmidas	Oco árvore	-	-	-	-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Anatidae	<i>Dendrocygna bicolor</i> ^{CI}	marreca-caneleira	Áreas úmidas	Solo próximo a banhados	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Anatidae	<i>Dendrocygna viduata</i> ^{CI}	marreca-piadeira	Áreas úmidas	Vegetação herbácea ou arbustiva próximo a áreas úmidas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruí	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Anatidae	<i>Netta peposaca</i> ^{CI}	marrecão	Áreas úmidas	Banhados	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Anatidae	<i>Nomonyx dominicanus</i> ^{CI,RA}	marreca-de-bico-roxo	Áreas úmidas	Lago	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Anatidae	<i>Ortalis squamatta</i> ^{CI}	jacuaçu	Floresta e vegetação arbustiva	Cipoais, alto de árvores, troncos caídos, ninhos abandonados, gravatás	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2019
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2019
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2019
								-	Toropi	BirdLife International, 2019
								-	Quevedos	BirdLife International, 2019
								-	Jari	BirdLife International, 2019
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2019
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2019
								-	Joia	BirdLife International, 2019
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2019
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2019
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2019
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2019
								-	Giruá	BirdLife International, 2019
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; BENCKE, 2001
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016

Familia	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Anatidae	<i>Oxyura vittata</i> ^{CI,RA,MI}	marreca-rabo-de- espinho	Áreas úmidas	Vegetação emergente sobre a água	-	-	-	-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Anatidae	<i>Penelope obscura</i> ^{CI}	jacuaçu	Floresta e vegetação arbustiva	Cipoais, alto de árvores, troncos caídos, ninhos abandonados, gravatás	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Anatidae	<i>Sarkidiornis sylvicola</i> ^{CI,RA}	pato-de-crista	Áreas úmidas	Oco de árvores, galhos de árvores, em meio a capins altos, entre pedras	NT	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
				ninhos grandes abandonados				-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Anhimidae	<i>Chauna torquata</i>	tachã	Áreas úmidas	Banhados, Vegetação lacustre	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Apodidae	<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-sobre- cinzento	Floresta	Ocos de árvores, chaminés, forros de casa	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Apodidae	<i>Chaetura meridionalis</i> ^{MI}	andorinhão-do-temporal	Floresta e áreas urbanas	Construções e ocos de árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Apodidae	<i>Cypseloides senex</i>	taperuçu-velho	Floresta	Paredões e escarpas de pedra, ao redor de cascatas e grutas úmidas	-	-	-	Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Apodidae	<i>Streptoprocne zonalis</i>	taperuçu-de-coleira-branca	Áreas úmidas, campo e floresta	Cavernas	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Aramidae	<i>Aramus guarauna</i>	carão	Áreas úmidas	Árvores emergentes em áreas alagadas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruí	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	garça-moura	Áreas úmidas	Moitas densas, arbustos lenhosos, sarandizais próximo a áreas alagadas; juncais com vegetação densa	-	-	-	São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2019
								-	Quevedos	BirdLife International, 2019
								-	Jari	BirdLife International, 2019
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2019
								-	Joia	BirdLife International, 2019
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2019
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2019
								-	Giruí	BirdLife International, 2019
Ardeidae	<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	Áreas úmidas	Moitas densas, arbustos lenhosos, sarandizais próximo a áreas alagadas; juncais com vegetação densa	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	Campo	Juncais, banhados com vegetação densa	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
				densa				Girúá	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2019
								-	Toropi	BirdLife International, 2019
								-	Jari	BirdLife International, 2019
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2019
								-	Joia	BirdLife International, 2019
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2019
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2019
Ardeidae	<i>Butorides striata</i> ^{MI}	socozinho	Áreas úmidas	Banhado	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Ardeidae	<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	Áreas úmidas	Moitas densas, arbustos lenhosos, sarandizais próximo a áreas alagadas; juncais com vegetação densa	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	savacu	Áreas úmidas	Árvores em áreas alagadas, sarandizais, por vezes junto com outras garças	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2019
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2019
								-	Toropi	BirdLife International, 2019
								-	Quevedos	BirdLife International, 2019
								-	Jari	BirdLife International, 2019
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2019
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2019
								-	Joia	BirdLife International, 2019
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2019
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2019
								-	Girúá	BirdLife International, 2019
Ardeidae	<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	Áreas úmidas e campo	Árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Girúá	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Ardeidae	<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	Áreas úmidas	Alto de árvores	-	-	-	Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
Bucconidae	<i>Nystalus chacuru</i>	joão-bobo	Campo e vegetação arbustiva	Buracos no solo em áreas abertas	-	-	-	Formigueiro	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruí	-	Wiki aves, 2020
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Caprimulgidae	<i>Hydropsalis longirostris</i>	bacurau-da-telha	Campo com formações rochosas	Solo	-	-	-	-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Caprimulgidae	<i>Hydropsalis parvula</i> ^{MI}	bacurau-chintã	Floresta	Solo	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Caprimulgidae	<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura	Campo e floresta	Solo	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Caprimulgidae	<i>Lurocalis semitorquatus</i> ^{MI}	tuju	Floresta	Galhos largos em matas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Caprimulgidae	<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau	Floresta	Solo	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Caprimulgidae	<i>Podager nacunda</i> ^{MI}	corução	Áreas úmidas, campo e formações rochosos	Solo	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Cardinalidae	<i>Amaurospiza moesta</i> ^{RA}	negrinho-do-mato	Floresta	Ramos de árvores e arbustos	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Cardinalidae	<i>Cyanoloxia brissonii</i>	azulão	Floresta e vegetação arbustiva	Ramos de árvores e arbustos	-	-	-	Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Cardinalidae	<i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i>	azulinho	Floresta e vegetação arbustiva	Ramos de árvores e arbustos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Cardinalidae	<i>Habia rubica</i> ^{RA}	tiê-de-bando	Floresta	Arbustos em florestas	-	-	-	-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Cardinalidae	<i>Piranga flava</i> ^{MI}	sanhaço-de-fogo	Floresta	Árvore em matas de galeria	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Girúá	BirdLife International, 2017
								-	Girúá	BirdLife International, 2017
Cariamidae	<i>Cariama cristata</i>	seriema	Campo	Alto de árvores	-	-	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	Campo e floresta	Rochas ou sob raízes de locais de difícil acesso	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Cathartidae	<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela	Campo e floresta	Árvores ocas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta	Campo e áreas urbanas	Rochas ou sob raízes de locais de difícil acesso	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Charadriidae	<i>Charadrius collaris</i>	batuíra-de-coleira	Áreas úmidas e arenosas	Áreas abertas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Charadriidae	<i>Charadrius modestus</i> ^{MI}	batuíra-de-peito-de-tijo	Áreas úmidas e arenosas	Campos pantanosos, campos rochosos (Terra do Fogo e Malvinas)	-	-	-	-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Charadriidae	<i>Pluvialis dominica</i> ^{MI}	batuiriçu	Áreas úmidas	Tundra	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020

Familia	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Charadriidae	Vanellus chilensis	quero-quero	Campo	Campos abertos	-	-	-	Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Ciconiidae	Ciconia maguari	maguari	Áreas úmidas	Áreas úmidas com taboais e juncais	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Ciconiidae	Mycteria americana ^{MI}	cabeça-seca	Áreas úmidas	Árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Columbidae	<i>Columbina picui</i>	rolinha-picuí	Campo e vegetação arbustiva	Ambientes antrópicos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Columbidae	<i>Columbina squammata</i> ^{RA}	fogo-apagou	Campo	Campo seco, savanas e jardins	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Columbidae	<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha roxa	Áreas úmidas e vegetação arbustiva	Árvores, arbustos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Columbidae	<i>Geotrygon montana</i>	pariri	Floresta	Solo	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Columbidae	<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-gemedeira	Campo e floresta	Árvores baixas, arbustos	-	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Columbidae	<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	Campo e floresta	Árvores baixas, arbustos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016

Familia	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Columbidae	<i>Patagioenas cayennensis</i> ^{CI,MI}	pomba-galega	Floresta	Cipós a meia altura na floresta	-	-	-	-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Columbidae	<i>Patagioenas picazuro</i> ^{CI}	asa-branca	Campo e floresta	Árvores, cerca viva, solo	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
								Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando
Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020								
Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020								
Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020								
São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020								
São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020								
Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020								
Joia	-	Wiki aves, 2020								
São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020								
Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020								
Santo Ângelo	-	Wiki aves, 2020								
-	Toropi	BirdLife International, 2016								

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Conopophagidae	<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente	Floresta	Solo de floresta	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	gralha-azul	Floresta	Árvores	-	-	NT	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Giruá	BirdLife International, 2017
Corvidae	<i>Cyanocorax chrysops</i>	gralha-picaça	Floresta	Árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
Cotingidae	<i>Phytotoma rutila</i> ^{RA,MI}	corta-ramos	Vegetação arbustiva	Vegetação espinhenta (Argentina)	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Cuculidae	<i>Coccyzus americanus</i> ^{MI}	papa-lagarta-de-asa-vermelha	Floresta e vegetação arbustiva	Nidoparasita facultativo, pode nidificar em árvores e arbustos	-	-	-	-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Cuculidae	<i>Coccyzus euleri</i> ^{RA}	papa-lagarta-de-euler	Floresta	Árvores em floresta	DD	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016

Familia	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Cuculidae	<i>Coccyzus melacoryphus</i> ^{MI}	papa-lagarta	Áreas úmidas	Arbustos	-	-	-	-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Cuculidae	<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	Campo e vegetação arbustiva	Capoeiras, áreas cultivadas, locais alagados	-	-	-	São Sepé	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020, CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS)
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	MCT(PUCRS)
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
								Cuculidae	<i>Crotophaga major</i> ^{RA,MI}	anu-coroca
Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020								
Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020								
Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020								
-	São Sepé	BirdLife International, 2016								
-	Formigueiro	BirdLife International, 2016								
-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016								
-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016								
-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016								
-	Toropi	BirdLife International, 2016								
-	Quevedos	BirdLife International, 2016								
-	Jari	BirdLife International, 2016								
-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016								

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Cuculidae	<i>Dromococcyx pavoninus</i>	peixe-frito-pavonino	Floresta e vegetação arbustiva	Nidoparasita de aves florestais	VU	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Cuculidae	<i>Guira guira</i>	anu-branco	Campo e vegetação arbustiva	Campos, capoeiras, pomares, vegetação de beira de estrada	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Girúá	-	Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Cuculidae	<i>Micrococcyx cinereus</i> ^{RA}	papa-lagarta-cinzeno	Áreas úmidas e vegetação arbustiva	Arbustos e árvores em áreas abertas arbustivas	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Cuculidae	<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	Floresta	Taquaral	-	-	-	São Sepé	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020, CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Girúá	-	Wiki aves, 2020
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Cuculidae	<i>Tapera naevia</i>	saci	Floresta e vegetação arbustiva	Nidoparasita de aves florestais	-	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Dendrocolaptidae	<i>Campyloramphus falcularius</i> ^{RA}	arapaçu-de-bico-torto	Floresta	Oco de árovre	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2017

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Dendrocolaptidae	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande	Floresta	Oco de árvore	-	-	-	-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Giruí	BirdLife International, 2017
Dendrocolaptidae	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	arapaçu-do-cerrado	Campo, floresta e vegetação arbustiva	Oco de árvore	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2017
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2017
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2017
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Giruí	BirdLife International, 2017
Dendrocolaptidae	<i>Lepidocolaptes falcinellus</i>	arapaçu-escamoso-do-sul	Floresta	Oco de árvore	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Girúá	BirdLife International, 2017
Dendrocolaptidae	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde	Floresta	Oco de árvore	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Dendrocolaptidae	<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	arapaçu-de-garganta-branca	Floresta	Oco de árvore	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Falconidae	<i>Caracara plancus</i>	caracará	Áreas úmidas e campo	Árvore	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruí	-	Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Falconidae	<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	Campo	Ninhos de outras aves em árvores ou uma plataforma qualquer	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
								São Sepé	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Falconidae	<i>Falco peregrinus</i> ^{MI}	falcão-peregrino	Campo e áreas urbanas	Paredões rochosos e prédios (América do Norte)	-	-	-	Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2019
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2019
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2019
								-	Toropi	BirdLife International, 2019
								-	Quevedos	BirdLife International, 2019
								-	Jari	BirdLife International, 2019
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2019
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2019
								-	Joia	BirdLife International, 2019
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2019
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2019
								-	Girúá	BirdLife International, 2019
Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri	Áreas úmidas e campo	Oco de árvores, ninhos abandonados	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
				Oco de árvores,				Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Falconidae	<i>Herpetotheres cachinnans</i> ^{RA}	acauã	Campo e floresta	buracos em escarpas rochosas	-	-	-	-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Falconidae	<i>Micrastur ruficollis</i> ^{RA}	falcão-caburé	Floresta	Oco de árvores	-	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Falconidae	<i>Micrastur semitorquatus</i> ^{RA}	falcão-relógio	Floresta	Oco de árvores e ninhos de psitacídeos abandonados	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Falconidae	<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	Áreas úmidas e campo	Árvore	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Falconidae	<i>Milvago chimango</i>	chimango	Áreas úmidas e campo	Árvore	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Formicariidae	<i>Chamaeza campanisona</i>	tovaca-campainha	Floresta	Cavidade cônicas de troncos caídos ou ocos de árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
Fringillidae	<i>Chlorophonia cyanea</i>	gaturamo-bandeira	Floresta e vegetação arbustiva	Ninhos abrigados em locais bem sombreados junto a epífitas e em palmeiras	-	-	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Fringillidae	<i>Euphonia chalybea</i>	cais-cais	Floresta	Ninhos abrigados em locais bem sombreados junto a epífitas e em palmeiras	-	-	NT	-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Fringillidae	<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	Floresta	Ninhos abrigados em locais bem sombreados junto a epífitas e em palmeiras	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Fringillidae	<i>Euphonia pectoralis</i>	ferro-velho	Floresta	Ninhos abrigados em locais bem sombreados junto a palmeiras	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
				epífitas e em palmeiras				-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
Fringillidae	<i>Euphonia cyanocephala</i>	gaturamo-rei	Floresta e vegetação arbustiva	Árvores isoladas e borda de floresta	-	-	-	Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
Fringillidae	<i>Spinus magellanicus</i>	pintassilgo	Vegetação arbustiva	Alto de pinheiros ou araucárias	-	-	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Furnariidae	<i>Anumbius annumbi</i>	cochicho	Campo	Árvores isoladas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Capão do Cipó	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	-	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Furnariidae	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié	Áreas úmidas e vegetação arbustiva	Arbustos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Furnariidae	<i>Cranioleuca obsoleta</i>	arredio-oliváceo	Floresta	Árvore de florestas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								Formigueiro	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Furnariidae	<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	Campo e áreas urbanas	Árvores em meio a campos, postes, traves, cercas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Girúá	-	Wiki aves, 2020
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2017

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Furnariidae	<i>Heliobletus contaminatus</i>	trepadorzinho	Floresta	Ocos de árvores	-	-	-	-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Girúá	BirdLife International, 2017
Furnariidae	<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca	Áreas úmidas e floresta	Buracos escavados em barrancos	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Furnariidae	<i>Phacellodomus ruber</i> ^{RA}	graveteiro	Áreas úmidas e vegetação arbustiva	Árvores isoladas	-	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Furnariidae	<i>Philydor rufum</i>	limpa-folha-de-testa-baia	Floresta	Ocos de árvores	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Furnariidae	<i>Phleocryptes melanops</i>	bate-bico	Áreas úmidas	Juncais	-	-	-	Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Furnariidae	<i>Schoeniophylax phryganophilus</i>	bichoita	Áreas úmidas e campo	Árvores e arbustos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Furnariidae	<i>Synallaxis albescens</i> ^{RA}	uí-pi	Campo e vegetação arbustiva	Vegetação arbórea em áreas campestres	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, CAPPELLARI, 2012
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Furnariidae	<i>Synallaxis cinerascens</i>	pi-pui	Floresta	Solo em floresta	-	-	-	Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Furnariidae	<i>Synallaxis frontalis</i>	petrim	Vegetação arbustiva	Capoeira baixa e densa	-	-	-	Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020

Familia	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Furnariidae	Synallaxis ruficapilla	pichororé	Floresta	Solo da floresta, entre ramos secos de uma árvore caída, alto de árvores ou entre a vegetação emaranhada de cipós e folhas no interior da floresta	-	-	-	Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	IUCN, 2020.
								-	São Martinho da Serra	IUCN, 2020.
								-	Toropi	IUCN, 2020.
								-	Quevedos	IUCN, 2020.
								-	Jari	IUCN, 2020.
								-	Tupanciretã	IUCN, 2020.
								-	Capão do Cipó	IUCN, 2020.
								-	Joia	IUCN, 2020.
								-	Eugênio de Castro	IUCN, 2020.
								-	Vitória das Missões	IUCN, 2020.
								-	Sete de Setembro	IUCN, 2020.
								-	Giruá	IUCN, 2020.
Furnariidae	Synallaxis spixi	joão-teneném	Campo, floresta e vegetação arbustiva	Arbusto fechado em campos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
								Furnariidae	Syndactyla rufosuperciliata	trepador-quiete
Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020								
Santa Maria	-	Wiki aves, 2020								
Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020								
São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020								
São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020								
Toropi	-	Wiki aves, 2020								
Quevedos	-	Wiki aves, 2020								
Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020								
São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020								

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Hirundinidae	<i>Alopochelidon fucata</i>	andorinha-morena	Campo	Buracos em barrancos de rios, valas	-	-	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruí	-	Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i> ^{MI}	andorinha-de-bando	Áreas úmidas	Penhascos, cavernas, construções humanas	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2019
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2019
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2019
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2019
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2019
								-	Toropi	BirdLife International, 2019
								-	Quevedos	BirdLife International, 2019
								-	Jari	BirdLife International, 2019
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2019
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2019
								-	Joia	BirdLife International, 2019
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2019

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2019
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2019
								-	Giruá	BirdLife International, 2019
Hirundinidae	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i> ^{MI}	andorinha-de-sobre-acanelado	Áreas úmidas e campo	Penhascos e construções humanas	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruá	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Hirundinidae	<i>Progne chalybea</i> ^{MI}	andorinha-doméstica-grande	Campo e áreas urbanas	Edificações, ninhos de joão-de-barro e árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Hirundinidae	<i>Progne tapera</i> ^{MI}	andorinha-do-campo	Campo	Ninhos de joão-de-barro	-	-	-	Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Hirundinidae	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	Campo e áreas urbanas	Ocos de árvores e edificações	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Giruí	BirdLife International, 2017
								São Sepé	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Hirundinidae	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> ^{MI}	andorinha-serradora	Campo	Buracos em barrancos de rios, valas	-	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Hirundinidae	<i>Tachycineta albiventer</i> ^{MI}	andorinha-do-rio	Áreas úmidas, principalmente cursos de rios	Barrancos, rochas ao longo dos rios, galhos ocios	-	-	-	Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Hirundinidae	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-testa-branca	Áreas úmidas e campo	Cavidades em construções humanas, galhos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
				ocos, barrancos				-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Icteridae	<i>Agelaioides badius</i>	asa-de-telha	Vegetação arbustiva	Ninhos abandonados	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Girúá	BirdLife International, 2017
Icteridae	<i>Cacicus chrysopterus</i>	tecelão	Floresta e vegetação arbustiva	Galhos ou lianas em florestas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
Icteridae	<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	Floresta	Palmeiras nas proximidades de florestas	-	-	-	Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruá	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Icteridae	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi	Áreas úmidas	Juncos, gramíneas e galhos de banhados	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Icteridae	<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto	Campo e floresta	Buracos em rochas e construções	-	-	-	Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Icteridae	<i>Icterus pyrrhopterus</i>	encontro	Floresta	Arbustos a aproximadamente 4 metros do solo	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruí	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Icteridae	<i>Molothrus bonariensis</i>	chupim	Campo e vegetação arbustiva	Nidoparasita especialmente de <i>Zonotrichia capensis</i> e <i>Furnarius rufus</i>	-	-	-	São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Icteridae	<i>Molothrus oryzovor</i> ^{RA}	iraúna-grande	Campo	Banhados	NT	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Icteridae	<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	vira-bosta-picumã	Campo e vegetação arbustiva	Nidoparasita de <i>Agelaioides badius</i>	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Icteridae	<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	chopim-do-brejo	Áreas úmidas e campo	Vegetação à margem de brejos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Icteridae	<i>Pseudoleistes virescens</i>	dragão-do-banhado	Áreas úmidas	Áreas úmidas	-	-	-	Santa Maria	-	FNJV (UNICAMP), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Icteridae	<i>Sturnella supercilialis</i>	polícia-inglesa	Campo	Solo em meio a moitas de capins	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> ^{RA}	veste-amarela	Áreas úmidas	Vegetação de banhados ou vegetação seca	VU	VU	EN	Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2019
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2019
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2019
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2019
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2019
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2019
								-	Toropi	BirdLife International, 2019
								-	Jari	BirdLife International, 2019
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2019
								-	Joia	BirdLife International, 2019
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2019
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2019
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2019
								-	Girúá	BirdLife International, 2019
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Jacanidae	<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	Áreas úmidas	Vegetação flutuante aquática	-	-	-	Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Mimidae	<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	Campo e vegetação arbustiva	Arbustos e árvores em áreas campestres	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Mimidae	<i>Mimus triurus</i> ^{MI}	calhandra-três-rabos	Campo e vegetação arbustiva	Vegetação arbustiva em áreas desérticas (Argentina)	-	-	-	-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Motacillidae	<i>Anthus furcatus</i>	caminheiro-de-unha-curta	Campo	Capinzal	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Motacillidae	<i>Anthus hellmayri</i>	caminheiro-de-barriga-acanelada	Campo e formações rochosas	Capinzal	-	-	-	Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Motacillidae	<i>Anthus lutescens</i>	caminheiro-zumbidor	Campo	Capinzal	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Nyctibiidae	<i>Nyctibius griseus</i> ^{MI}	urutau	Floresta	Cavidades naturais no extremo de troncos de árvores quebradas ou de galhos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Parulidae	<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	Floresta	Solo em floresta	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Giruá	BirdLife International, 2017
Parulidae	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	Áreas úmidas e vegetação arbustiva	Moitas e capins em áreas alagadas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Giruá	BirdLife International, 2017
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Parulidae	<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador	Floresta	Solo em floresta	-	-	-	Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Parulidae	<i>Setophaga pitaiyumi</i>	mariquita	Floresta	Vegetação epifítica no alto de árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruí	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Passerilidae	<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo	Campo	Moita de capim	-	-	-	Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Passerilidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	Áreas úmidas, campo e floresta	Moita de capim, solo ou arbusto	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Phalacrocoracidae	<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga	Áreas úmidas	Árvores em matas alagadas e sarandizais, às vezes em garçais	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Phalacrocoracidae	<i>Nannopterum brasilianus</i>	biguá	Áreas úmidas	Árvores em matas alagadas e sarandizais, às vezes em garçais, ilhotas em corpos d'água	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Picidae	<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça- amarela	Floresta	Oco de árvore	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Picidae	<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	Campo e floresta	Oco de árvores postes	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Picidae	<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado	Campo, floresta e vegetação arbustiva	Oco de árvores e postes	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Picidae	<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda- branca	Floresta	Oco de árvores	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Picidae	<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco	Campo e vegetação arbustiva	Oco de árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Picidae	<i>Melanerpes flavifrons</i>	benedito-de-testa-amarela	Floresta	Oco de árvores	-	-	-	-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Picidae	<i>Piculus aurulentus</i>	pica-pau-dourado	Floresta	Oco de árvores	-	-	NT	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Giruí	BirdLife International, 2017
								Picidae	<i>Picumnus temminckii</i>	picapauzinho-de-coleira
Formigueiro	-	SILVA et al., 2013								
Santa Maria	-	Wiki aves, 2020								
Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020								
Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020								
-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016								
-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016								
-	Toropi	BirdLife International, 2016								
-	Quevedos	BirdLife International, 2016								
-	Jari	BirdLife International, 2016								
-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016								
-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016								
-	Joia	BirdLife International, 2016								

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Picidae	<i>Picumnus nebulosus</i>	pica-pau-anão-carijó	Floresta e vegetação arbustiva	Oco de árvores mortas	-	-	NT	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Picidae	<i>Veniliornis spilogaster</i>	picapauzinho-verde-carijó	Campo, floresta e vegetação arbustiva	Oco de árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Sete de Setembro	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Pipridae	<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará	Floresta	Forquilhas de arbustos, árvores de sub-bosque, ramagens pendentes sobre riachos no interior de florestas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Platyrinchidae	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho	Floresta	Galhos finos bem perto do solo em sub-bosque de floresta	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinagética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Podicipedidae	<i>Podiceps major</i>	mergulhão-grande	Áreas úmidas	Locais alagados	-	-	-	-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador	Áreas úmidas	Plataforma flutuante em corpos d'água	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Podicipedidae	<i>Rollandia rolland</i>	mergulhão-de-brejo-branca	Áreas úmidas	Plataforma flutuante em corpos d'água	-	-	-	-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Podicipedidae	<i>Tachybaptus dominicanus</i>	mergulhão-pequeno	Áreas úmidas	Corpos d'água	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Poliophtilidae	<i>Poliophtila dumicola</i>	balança-rabo-de-máscara	Vegetação arbustiva	Forquilha vertical em árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Poliophtidae	<i>Poliophtila lactea</i> ^{RA}	balança-rabo-leitoso	Vegetação arbustiva	Copa de árvores	NT	NT	NT	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Psittacidae	<i>Amazona pretrei</i>	papagaio-charão	Floresta	Oco de árvore	VU	VU	VU	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Psittacidae	<i>Myiopsitta monachus</i>	caturrita	Campo e áreas urbanas	Árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	FNJV (UNICAMP), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruíá	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
Psittacidae	<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-bronzeada	Floresta	Oco de árvore	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruíá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Psittacidae	<i>Psittacara leucophthalmus</i> ^{RA}	maracanã-malhada	Floresta	Grutas	-	-	-	-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Psittacidae	<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba-de-testa-vermelha	Floresta	Oco de árvore	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
			Áreas úmidas e					São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2019
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2019
								-	Quevedos	BirdLife International, 2019
								-	Jari	BirdLife International, 2019

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Rallidae	<i>Aramides cajaneus</i>	saracura-três-potes	Áreas úmidas e floresta	Floresta ripária	-	-	-	-	Tupanciretã	BirdLife International, 2019
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2019
								-	Joia	BirdLife International, 2019
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2019
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2019
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2019
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2019
								-	Girúá	BirdLife International, 2019
Rallidae	<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-brejo	Áreas úmidas e floresta	Vegetação arbustiva	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Girúá	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Rallidae	<i>Aramides ypecaha</i>	saracuruçu	Áreas úmidas, campo e floresta	Áreas úmidas com vegetação alta	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Rallidae	<i>Fulica armillata</i>	carqueja-de-bico-manchado	Áreas úmidas	Pastagem alagada	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Rallidae	<i>Fulica leucoptera</i>	carqueja-de-bico-amarelo	Áreas úmidas	Áreas alagadas	-	-	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Rallidae	<i>Gallinula galeata</i>	galinha-d'água	Áreas úmidas e campo	Plantas aquáticas flutuantes em banhados	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Rallidae	<i>Laterallus leucopyrrhus</i> ^{RA}	sanã-vermelha	Áreas úmidas	Vegetação gramínea	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Rallidae	<i>Laterallus melanophaius</i>	sanã-parda	Áreas úmidas	Arbustos e cipoais ocasionalmente distante da água	-	-	-	-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Rallidae	<i>Mustelirallus albicollis</i>	sanã-carijó	Áreas úmidas	Riachos pantanosos	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Rallidae	<i>Pardirallus maculatus</i>	saracura-carijó	Áreas úmidas	Terrenos pantanosos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Rallidae	<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã	Áreas úmidas	Banhados e pântanos com matas ralas	-	-	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Rallidae	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	saracura-do-banhado	Áreas úmidas	Área alagada com vegetação densa	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Rallidae	<i>Porphyrio martinicus</i> ^{MI}	frango-d'água-azul	Áreas úmidas	Vegetação palustre	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Rallidae	<i>Porphyriops melanops</i>	frango-d'água-carijó	Áreas úmidas	Plantas aquáticas flutuantes em banhados	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Ramphastidae	<i>Pteroglossus castanotis</i> ^{RA}	araçari-castanho	Floresta	Oco de árvores e cupinzeiros arborícolas	NT	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Ramphastidae	<i>Ramphastos dicolorus</i>	tucano-de-bico- verde	Floresta	Oco de árvore	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2017

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Ramphastidae	<i>Ramphastos toco</i>	tacanuçu	Floresta	Oco de árvore	-	-	-	-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Girúá	BirdLife International, 2017
Recurvirostridae	<i>Himanotopus melanurus</i>	pernilongo	Áreas úmidas	Brejos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Capão do Cipó	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Sete de Setembro	-	Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2019
								-	Quevedos	BirdLife International, 2019
								-	Jari	BirdLife International, 2019
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Girúá	BirdLife International, 2019
Rheidae	<i>Rhea americana</i>	ema	Campo	Vegetação campestre	-	-	NT	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Rhynchocyclidae	<i>Corythopsis delalandi</i> ^{RA}	estalador	Floresta	Próximo ao solo em floresta	EN	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2017
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2017
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2017
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2017
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Girúá	BirdLife International, 2017
Rhynchocyclidae	<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> ^{RA}	sebinho-de-olho-de- ouro	Campo	Árvores	-	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2017
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2017
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2017
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2017
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Girúá	BirdLife International, 2017
Rhynchocyclidae	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	Floresta	Raízes expostas de barrancos em ravinas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Rhynchocyclidae	<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça- cinza	Floresta	Árvores e ninhos abandonados	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Rhynchocyclidae	<i>Myiornis auricularis</i> ^{RA}	miudinho	Floresta	Sub-bosque	-	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Rhynchocyclidae	<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-do-mato	Floresta	Epífitas e galhos finos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinagética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Rhynchocyclidae	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	tororó	Floresta	Cipoais e bordas de floresta	-	-	-	Santo Ângelo	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Rhynchocyclidae	<i>Todirostrum cinereum</i> ^{RA}	ferreirinho-relógio	Floresta e vegetação arbustiva	Capoeira e borda de mata seca	-	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Rhynchocyclidae	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	Floresta	Árvores perto de vespeiros ou Formigueiros	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Rynchopidae	<i>Rynchops niger</i>	talha-mar	Áreas úmidas	Praia de rios frequentemente junto com trinta-réis	-	-	-	Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Scleruridae	<i>Geositta cunicularia</i>	curriqueiro	Campo e áreas arenosas	Buracos em banco de areia	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Scleruridae	<i>Sclerurus scansor</i>	vira-folha	Floresta	Raízes de árvores caídas ou barrancos	-	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Scolopacidae	<i>Bartramia longicauda</i> ^{MI}	maçarico-do-campo	Áreas úmidas	Pradarias conservadas (Estados Unidos e Canadá)	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; BENCKE, 2001

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Scolopacidae	<i>Calidris fuscicollis</i> ^{MI}	maçarico-de-sobre-branco	Áreas úmidas	Tundra (Canadá e Alasca)	-	-	-	Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Giruí	BirdLife International, 2017
Scolopacidae	<i>Calidris himantopus</i> ^{MI}	maçarico-pernilongo	Áreas úmidas	Tundra (Canadá, Alasca)	-	-	-	Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020

Familia	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Scolopacidae	Calidris melanotos ^{MI}	maçarico-de-colete	Áreas úmidas	Tundra (Canadá, Alasca, Rússia)	-	-	-	Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruí	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								Scolopacidae	Gallinago paraguaiae	narceja
Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020								
Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020								
Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020								
São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020								
Quevedos	-	Wiki aves, 2020								
Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020								
Joia	-	Wiki aves, 2020								
Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020								
-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016								
-	Toropi	BirdLife International, 2016								
-	Jari	BirdLife International, 2016								
-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016								
-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016								
-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016								
-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016								
-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016								
-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016								
-	Giruí	BirdLife International, 2016								
Scolopacidae	Limosa haemastica ^{RA,MI}	narceja-de-bico-virado	Áreas úmidas	Áreas alagadas próximas a rios e marismas (Alasca e Canadá)	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Scolopacidae	<i>Phalaropus tricolor</i> ^{MI}	pisa-n'água	Áreas úmidas	Pradarias pantanosas (Estados Unidos, Canadá)	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Scolopacidae	<i>Tringa flavipes</i> ^{MI}	maçarico-de-perna-amarela	Áreas úmidas	Áreas pantanosas (Canadá e Alasca)	-	-	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Scolopacidae	<i>Tringa melanoleuca</i> ^{MI}	maçarico-grande-de-perna-amarela	Áreas úmidas	Áreas pantanosas com poucas árvores, lagos pantanosos (Canadá e Alasca)	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Scolopacidae	<i>Tringa solitaria</i> ^{MI}	maçarico-solitário	Áreas úmidas	Florestas boreais (Canadá, Alasca)	-	-	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Sternidae	<i>Phaetusa simplex</i>	trinta-réis-grande	Áreas úmidas	Bancos e praias arenosas de rios e lagoas muitas vezes junto a outros esternídeos e talha-mares	-	-	-	-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Sternidae	<i>Sternula superciliaris</i> ^{MI}	trinta-réis-pequeno	Áreas úmidas	Praias arenosas de rios	-	-	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Strigidae	<i>Asio clamator</i>	coruja-orelhuda	Campo, floresta e vegetação arbustiva	Solo	-	-	-	-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Strigidae	<i>Asio flammeus</i>	mocho-dos-banhados	Áreas úmidas e campo	Solo	NT	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Strigidae	<i>Asio stygius</i>	mocho-diabo	Campo, floresta e vegetação arbustiva	Árvores	-	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Strigidae	<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	Campo	Buracos no solo	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Capão do Cipó	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruí	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Strigidae	<i>Bubo virginianus</i>	jacurutu	Campo e floresta	Solo e ninhos abandonados	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
Strigidae	<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé	Floresta	Árvores ocas, ninhos abandonados	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Strigidae	<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	Floresta e vegetação arbustiva	Oco de árvores, cupinzeiros arbóreos, ninhos abandonados	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Strigidae	<i>Megascops sanctaecatarinae</i>	corujinha-do-sul	Floresta e vegetação arbustiva	Oco de árvores, cupinzeiros arbóreos, ninhos abandonados	-	-	-	-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Thamnophilidae	<i>Batara cinerea</i> ^{RA}	matracão	Floresta e vegetação arbustiva	Sub-bosque de vegetação densa	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Thamnophilidae	<i>Drymophila malura</i> ^{RA}	choquinha-carijó	Floresta	Sub-bosque	-	-	-	-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Thamnophilidae	<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa	Floresta	Em galhos e arbustos no sub-bosque de floresta	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2017
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2017
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Girúá	BirdLife International, 2017
Thamnophilidae	<i>Mackenziaena leachii</i>	borralhara-assobiadora	Floresta e vegetação arbustiva	Sub-bosque de vegetação densa	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Girúá	-	Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Thamnophilidae	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	Floresta	Arbusto no sub- bosque	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Thamnophilidae	<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	choca-de-boné- vermelho	Campo e vegetação arbustiva	Arbusto no sub- bosque	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Thraupidae	<i>Cissopis leverianus</i> ^{RA}	tietinga	Floresta	Forquilhas de arbustos e árvoretas a baixa altura	NT	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Thraupidae	<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	Floresta e vegetação arbustiva	Arbustos e árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Thraupidae	<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho	Floresta	Árvores e lianas	-	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Thraupidae	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	tico-tico-rei	Floresta e vegetação arbustiva	Árvores em florestas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinagética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Thraupidae	<i>Donacospiza albifrons</i>	tico-tico-do-banhado	Áreas úmidas e campo	Pastagens	-	-	-	-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Thraupidae	<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo	Campo	Próximo do solo na base de touceiras	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	FNJV (UNICAMP), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Girúá	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
Thraupidae	<i>Emberizoides ypiranganus</i>	canário-do-brejo	Áreas úmidas	Touceiras de gramíneas	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinagética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
Thraupidae	<i>Embernagra platensis</i>	sabiá-do-banhado	Áreas úmidas e campo	Moita de capins	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Thraupidae	<i>Hemithraupis guira</i>	saíra-de-papo-preto	Floresta	Ramos de árvores	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Thraupidae	<i>Microspignus cabanisi</i>	quete	Floresta	Ramos de árvores e arbustos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Thraupidae	<i>Nemosia pileata</i> ^{RA}	saíra-de-chapéu- preto	Vegetação arbustiva	Alto de árvores esparsas	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Thraupidae	<i>Paroaria capitata</i>	cavalaria	Campo	Árvores sobre riachos e rios	-	-	-	-	Santa Maria	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
Thraupidae	<i>Paroaria coronata</i>	cardeal	Campo e vegetação arbustiva	Árvores em bosques	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Thraupidae	<i>Pipraeidea bonariensis</i>	sanhaçu-papa-laranja	Floresta e vegetação arbustiva	Ramo de árvores e arbustos	-	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Girúá	BirdLife International, 2017
Thraupidae	<i>Pipraeidea melanonota</i>	saíra-viúva	Floresta	Epífitas no alto de árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Thraupidae	<i>Poospiza nigrorufa</i>	quem-te-vestiu	Áreas úmidas e vegetação arbustiva	Borda de floresta	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Girúá	BirdLife International, 2017
Thraupidae	<i>Pyrrhocomma ruficeps</i>	cabecinha-castanha	Floresta	Ramo de árvores e arbustos	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Girúá	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Thraupidae	<i>Saltator aurantiirostris</i>	bico-duro	Campo e vegetação arbustiva	Árvores baixas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Thraupidae	<i>Saltator coerulescens</i> ^{RA}	sabiá-gonga	Áreas úmidas e campo	Ramos de árvores e arbustos	-	-	-	-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2017
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2017
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2017
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2017
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Girúá	BirdLife International, 2017
Thraupidae	<i>Saltator maxillosus</i>	bico-grosso	Floresta	Ramos de árvores e arbustos	-	-	-	Formigueiro	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Thraupidae	<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro	Floresta	Ramos de árvores e arbustos	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruá	-	Wiki aves, 2020
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra-verdadeiro	Campo e vegetação arbustiva	Ninho de João-de-Barro, edificações, árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruá	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Thraupidae	<i>Sicalis luteola</i>	típico	Campo	Capinzal	-	-	-	-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
Thraupidae	<i>Sporophila angolensis</i> ^{RA}	curió	Floresta	Arbustos em baixa altura	EN	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
								Thraupidae	<i>Sporophila beltoni</i> ^{RA}	patativa-tropeira
-	São Sepé	BirdLife International, 2017								
-	Formigueiro	BirdLife International, 2017								
-	Santa Maria	BirdLife International, 2017								
-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2017								
-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017								
-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017								
-	Toropi	BirdLife International, 2017								
-	Quevedos	BirdLife International, 2017								
-	Jari	BirdLife International, 2017								
-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017								
-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017								
-	Joia	BirdLife International, 2017								

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Girúá	BirdLife International, 2017
Thraupidae	<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho	Campo e vegetação arbustiva	Árvores e arbustos em vegetação nativa, pomares e jardins	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropí	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Thraupidae	<i>Sporophila cinnamomea</i> ^{RA}	caboclinho-de-chapéu-cinzento	Áreas úmidas	Ramos de arbustos	NT	VU	VU	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2019
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2019
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2019
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2019
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2019
								-	Toropí	BirdLife International, 2019
								-	Quevedos	BirdLife International, 2019
								-	Jari	BirdLife International, 2019
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2019
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2019
								-	Joia	BirdLife International, 2019
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2019
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2019
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2019

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2019
								-	Giruá	BirdLife International, 2019
Thraupidae	<i>Sporophila collaris</i>	coleiro-do-brejo	Áreas úmidas	Ramos de arbustos e arvoretas na borda de banhados	NT	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Thraupidae	<i>Sporophila hypoxantha</i> ^{RA,MI}	caboclinho-de-barriga-vermelha	Áreas úmidas	Moita baixa em área pantanosa	VU	VU	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2019

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Thraupidae	<i>Sporophila palustris</i> ^{RA,MI}	caboclinho-de-papo-branco	Áreas úmidas	Banhados	VU	VU	EN	-	Formigueiro	BirdLife International, 2019
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2019
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2019
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2019
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2019
								-	Toropi	BirdLife International, 2019
								-	Quevedos	BirdLife International, 2019
								-	Jari	BirdLife International, 2019
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2019
								-	Joia	BirdLife International, 2019
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2019
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2019
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2019
								-	Giruí	BirdLife International, 2019
Thraupidae	<i>Sporophila pileata</i>	caboclinho-branco	Campo	Vegetação herbácea próximo da água	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruí	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2017
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2017
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Thraupidae	<i>Sporophila ruficollis</i> ^{RA,MI}	caboclinho-de-papo-escuro	Campo	Capinzal	VU	VU	NT	-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
Thraupidae	<i>Stephanophorus diadematus</i>	sanhaçu-frade	Floresta e vegetação arbustiva	Arbustos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Thraupidae	<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto	Floresta	Sub-bosque florestal	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Thraupidae	Tangara preciosa	saíra-preciosa	Floresta	Árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	Wiki aves, 2020
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Thraupidae	Tangara sayaca	sanhaçu-cinzento	Floresta, vegetação arbustiva e áreas urbanas	Árvores em pomares, eucaliptos e florestas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Thraupidae	<i>Tersina viridis</i> ^{MI}	saí-andorinha	Floresta e vegetação arbustiva	Buracos de barrancos, rochas no meio de mata, ocos em árvores	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruá	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Thraupidae	<i>Tricothraupis melanops</i>	tiê-de-topete	Floresta	Ramos de árvores	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Thraupidae	<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	Campo	Touceiras e capins	-	-	-	São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Threskiornithidae	<i>Mesembrinibis cayennensis</i> ^{RA}	coró-coró	Áreas úmidas e floresta	Árvores	NT	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
				Banhados, áreas				São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Threskiornithidae	<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru	Áreas úmidas	alagadas com arbustos	-	-	-	Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruá	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Threskiornithidae	<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	Áreas úmidas	Banhados com vegetação lenhosa	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Threskiornithidae	<i>Plegadis chihi</i>	caraúna	Áreas úmidas	Áreas alagadas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Sete de Setembro	-	Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Threskiornithidae	<i>Theristicus caerulescens</i>	curicaca-real	Áreas úmidas e campo	Árvores ou rochas em ambientes campestres	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Threskiornithidae	<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca	Áreas úmidas e campo	Paredões rochosos, alto de árvores e construções abandonadas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Tinamidae	<i>Crypturellus noctivagus</i> ^{CI,RA}	jaó-do-sul	Floresta	Serrapilheira	CR	VU	NT	São Sepé	-	Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Tinamidae	<i>Crypturellus obsoletus</i> ^{CI}	inhambuguaçu	Floresta	Serrapilheira	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Tinamidae	<i>Crypturellus parvirostris</i> ^{CI,RA}	inhambu-chororó	Floresta	Serrapilheira	-	-	-	-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Tinamidae	<i>Crypturellus tataupa</i> ^{CI}	inhambu-chintã	Floresta	Serrapilheira	-	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	MCT(PUCRS)
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Tinamidae	<i>Nothura maculosa</i> ^{CI}	codorna-amarela	Campo	Cavidade no solo	-	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2019
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2019
								-	Joia	BirdLife International, 2019
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2019
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2019
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2019
								-	Girúá	BirdLife International, 2019
Tinamidae	<i>Rhynchotus rufescens</i> ^{CI}	perdigão	Campo	Cavidade no solo	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								-	-	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Tityridae	<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro	Floresta	Alto de árvores perto de vespeiros ou Formigueiros	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinagética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Tityridae	<i>Pachyramphus polychopterus</i> ^{MI}	caneleiro-preto	Floresta	Alto de árvores perto de vespeiros ou Formigueiros	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Giruá	BirdLife International, 2017
Tityridae	<i>Pachyramphus validus</i> ^{MI}	caneleiro-de-chapéu-preto	Floresta	Alto de árvores perto de vespeiros ou Formigueiros	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruá	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Tityridae	<i>Pachyramphus viridis</i>	caneleiro-verde	Floresta	Alto de árvores perto de vespeiros ou Formigueiros	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	MCT(PUCRS)
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Tityridae	<i>Schiffornis virescens</i>	flautim	Floresta	Cavidade de troncos	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
								São Sepé	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinagética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Tityridae	<i>Tityra cayana</i> ^{MI}	anambé-de-rabo-preto	Floresta	Buracos ou cavidades de árvores	-	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Tityridae	<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-de-bochecha-parda	Floresta	Buracos ou cavidades de árvores	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Trochilidae	<i>Amazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca	Floresta e vegetação arbustiva	Ramo de árvore ou arbusto	-	-	-	-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Trochilidae	<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta	Floresta e vegetação arbustiva	Ramo de árvore ou arbusto	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Trochilidae	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	Áreas úmidas, floresta e vegetação arbustiva	Sob barrancos, beira de estrada, junto a riachos, fios pendentes em construções abandonadas ou pouco utilizadas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruí	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Trochilidae	<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	Vegetação arbustiva	Ramo de árvore ou arbusto	-	-	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Trochilidae	<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto	Floresta e vegetação arbustiva	Parte dorsal de uma folha	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Trochilidae	<i>Heliomaster furcifer</i>	bico-reto-azul	Floresta e vegetação arbustiva	Ramo de árvore ou arbusto	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
Trochilidae	<i>Hylocharis chrysura</i>	beija-flor-dourado	Floresta e vegetação arbustiva	Colmo de capim, raiz pendente, arames	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Trochilidae	<i>Leucochloris albicollis</i>	beija-flor-de-papo-branco	Floresta e vegetação arbustiva	Ramo de árvore ou arbusto	-	-	-	São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Trochilidae	<i>Polytmus guainumbi</i> ^{RA}	beija-flor-de-bico-curvo	Áreas úmidas	Ramo de árvore ou arbusto	DD	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
		beija-flor-de-tonete	Áreas úmidas e					São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Trochilidae	<i>Stephanoxis loddigesii</i>	beija-flor-de-topete-azul	Áreas úmidas e floresta	Arbustos	-	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruá	-	Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Trochilidae	<i>Thalurania glaucopis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta	Floresta e vegetação arbustiva	Galhos e arbustos a pouca altura do solo	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Troglodytidae	<i>Campylorhynchus turdinus</i> ^{RA}	catatau	Campo e floresta	Alto de árvores	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
Troglodytidae	<i>Cistothorus platensis</i> ^{RA}	corruíra-do-campo	Campo	Vegetação de gramíneas altas em ambientes úmidos	NT	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	Floresta e vegetação arbustiva	Cavidade de árvores e construções humanas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Giruá	BirdLife International, 2017

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Trogonidae	<i>Trogon surrucura</i>	surucuá-variado	Floresta	Oco de árvore	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Turdidae	<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	Floresta	Árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020

Familia	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Turdidae	<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	Campo, floresta e vegetação arbustiva	Árvores	-	-	-	Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Sete de Setembro	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Turdidae	<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco	Floresta	Árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Turdidae	<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	Floresta e vegetação arbustiva	Árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruá	-	Wiki aves, 2020
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Turdidae	<i>Turdus subalaris</i> ^{MI}	sabiá-ferreiro	Floresta	Árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Giruá	BirdLife International, 2017
Tyrannidae	<i>Arundinicola leucocephala</i>	lavadeira-mascarada	Áreas úmidas	Galhos em pântanos	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	Campo, floresta e vegetação arbustiva	Árvores e arbustos em meio a vegetação aberta	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Capsiempis flaveola</i> ^{MI}	marianinha-amarela	Floresta e vegetação arbustiva	Borda de floresta	VU	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Santo Ângelo	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2017
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2017
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2017
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2017
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Giruá	BirdLife International, 2017
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Tyrannidae	<i>Cnemotriccus fuscatus</i> ^{MI}	guaracavuçu	Floresta	Alto de árvores junto a bromélias	-	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2017
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2017
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2017
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Girúá	BirdLife International, 2017
Tyrannidae	<i>Culicivora caudacuta</i> ^{RA}	papa-moscas-do-campo	Campo	Arbustos baixos	VU	VU	VU	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2017
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2017
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2017
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Girúá	BirdLife International, 2017
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Tyrannidae	<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	Campo e floresta	Árvores e arbustos	-	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Elaenia mesoleuca</i> ^{MI}	tuque	Floresta e vegetação arbustiva	Árvores nativas, exóticas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
								Tyrannidae	<i>Elaenia obscura</i>	tucão
Santa Maria	-	Wiki aves, 2020								
Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020								
Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020								
-	Formigueiro	BirdLife International, 2016								
-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016								
-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016								
-	Toropi	BirdLife International, 2016								
-	Quevedos	BirdLife International, 2016								
-	Jari	BirdLife International, 2016								
-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016								

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Elaenia parvirostris</i> ^{MI}	guaracava-de-bico-curto	Campo, floresta e vegetação arbustiva	Árvore pequena em meio a área campestre	-	-	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Tyrannidae	<i>Elaenia spectabilis</i> ^{MI}	guaracava-grande	Floresta	Árvores e arbustos	-	-	-	Formigueiro	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Sete de Setembro	-	Wiki aves, 2020
								Giruí	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Empidonomus varius</i> ^{MI}	peitica	Floresta	Alto de árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruí	-	Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
Tyrannidae	<i>Euscarthmus meloryphus</i> ^{MI}	barulhento	Vegetação arbustiva	Arbustos a pouca altura do solo	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2017

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Tyrannidae	<i>Fluvicola nengeta</i> ^{RA}	lavadeira-mascarada	Áreas úmidas	Galhos em pântanos	-	-	-	-	Formigueiro	BirdLife International, 2017
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2017
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2017
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Giruí	BirdLife International, 2017
Tyrannidae	<i>Gubernetes yetapa</i> ^{RA}	tesoura-do-brejo	Áreas úmidas	Gramíneas em áreas úmidas	NT	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Tyrannidae	<i>Hirundinea ferruginea</i> ^{MI}	gibão-de-couro	Paredões rochosos e áreas urbanas	Lajes, construções de pedra ou cimento	-	-	-	-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Hymenops perspicillatus</i> ^{MI}	viuvinha-de-óculos	Áreas úmidas	Gramíneas altas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Knipolegus cyanirostris</i>	maria-preta-de-bico-azulado	Floresta	Capoeira, borda de floresta ou camuflado entre musgos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Girúá	BirdLife International, 2018
Tyrannidae	<i>Knipolegus lophotes</i>	maria-preta-de-bico-azulado	Campo	Buracos em barrancos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Capão do Cipó	-	Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Lathrotriccus euleri</i> ^{MI}	enferrujado	Floresta	Cavidades em troncos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Tyrannidae	<i>Legatus leucophaeus</i> ^{MI}	bem-te-vi-pirata	Floresta	Ocupa ninhos de <i>Cacicus spp.</i> , <i>Pachyramphus spp.</i> , <i>Tolmomyias spp.</i>	-	-	-	-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
Tyrannidae	<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	Campo	Buracos ou cavidades de árvores, ninhos abandonados de joão-de-barro, cochico, pica-pau	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Giruá	BirdLife International, 2017
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Tyrannidae	<i>Megarynchus pitangua</i> ^{MI}	neinei	Floresta e vegetação arbustiva	Árvores altas	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	Floresta	Cavidades de árvores	-	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Tyrannidae	<i>Myiarchus swainsoni</i> ^{MI}	irré	Floresta e vegetação arbustiva	Cavidades em árvores ou madeiras	-	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Myiodynastes maculatus</i> ^{MI}	bem-te-vi-rajado	Floresta	Buracos ou cavidades de árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORREIA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Myiopagis caniceps</i> ^{MI}	guaracava-cinzenta	Floresta	Árvores de 4 metros a 10 metros de altura do solo em florestas	-	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Myiopagis viridicata</i> ^{MI}	guaracava-de-crista-alaranjada	Floresta	Árvores de 4 metros a 10 metros de altura do solo em florestas	-	-	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Myiophobus fasciatus</i> ^{MI}	felipe	Áreas úmidas, floresta e vegetação arbustiva	Vegetação secundária densa próxima a banhado	-	-	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de- penacho-vermelho	Vegetação arbustiva e áreas urbanas	Árvores de 2 a 15 metros de altura	-	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Phyllomyias virescens</i>	piolinho-verdoso	Floresta	Árvores	-	-	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Tyrannidae	<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	Campo, vegetação arbustiva e áreas urbanas	Árvores nativas e exóticas	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Eugênio de Castro	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruá	BirdLife International, 2018
Tyrannidae	<i>Polystictus pectoralis</i> ^{RA}	papa-moscas-canela	Campo, formações rochosas e vegetação arbustiva	Amontoado de ervas a baixa altura, plantas herbáceas exóticas	EN	NT	NT	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Tyrannidae	<i>Pseudocolopteryx sclateri</i> ^{RA}	tricolino	Áreas úmidas	Moitas de capins em banhados	-	-	-	-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Pyrocephalus rubinus</i> ^{MI}	príncipe	Campo e vegetação arbustiva	Forquilha de árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2019
								-	Toropi	BirdLife International, 2019
								-	Jari	BirdLife International, 2019
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2019
								-	Joia	BirdLife International, 2019
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2019
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2019
								-	Girúá	BirdLife International, 2019
Tyrannidae	<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno	Vegetação arbustiva	Árvores e arbustos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012;
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruí	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Serpophaga griseicapilla</i> ^{MI}	alegrinho-trinador	Vegetação arbustiva	Árvores baixas e arbustos	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020; BirdLife International, 2017
								-	São Sepé	BirdLife International, 2017
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2017
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2017
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017
								-	Giruí	BirdLife International, 2017
Tyrannidae	<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre	Áreas úmidas	Buracos em barrancos	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico- sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho	Vegetação arbustiva	Árvores baixas e árvores espinhentas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruá	-	Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Suiriri suiriri</i> ^{RA}	suiriri-cinzento	Campo e vegetação arbustiva	Árvores e arbustos	-	-	-	Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Tyrannidae	<i>Sirystes sibilator</i> ^{MI}	gritador	Floresta	Cavidades naturais de árvores	-	-	-	-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Tyranniscus burmeisteri</i> ^{MI}	piolhinho-chiador	Floresta	Árvores	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Tyrannidae	<i>Tyrannus melancholicus</i> ^{MI}	suiriri	Vegetação arbustiva	Forquilhas em galhos terminais de árvores	-	-	-	São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Tyrannus savana</i> ^{MI}	tesourinha	Campo	Árvores	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Xolmis cinereus</i>	primavera	Campo	Árvore exótica e nativa	-	-	-	São Sepé	-	Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Xolmis coronatus</i> ^{RA,MI}	noivinha-coroada	Campo	Matagais áridos (Argentina)	-	-	-	Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; BENCKE, 2001
								-	São Sepé	BirdLife International, 2016
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2016
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2016
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2016
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2016
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2016
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Quevedos	BirdLife International, 2016
								-	Jari	BirdLife International, 2016
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Joia	BirdLife International, 2016
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Girúá	BirdLife International, 2016
Tyrannidae	<i>Xolmis dominicanus</i> ^{RA}	noivinha-de-rabo-preto	Áreas úmidas	Borda de banhados entre folhas de gravatás e touceiras de gramíneas	VU	VU	VU	Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2017
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2017
								-	Santa Maria	BirdLife International, 2017
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2017
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2017
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2017
								-	Toropi	BirdLife International, 2017
								-	Quevedos	BirdLife International, 2017
								-	Jari	BirdLife International, 2017
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2017
								-	Joia	BirdLife International, 2017
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2017
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2017
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2017
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2017
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2017

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
								-	Giruá	BirdLife International, 2017
Tyrannidae	<i>Xolmis irupero</i>	noivinha	Campo	Ninhos abandonados de bichoita, cochicho ou troncos ocos de palmeiras	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								Quevedos	-	Wiki aves, 2020
								Jari	-	Wiki aves, 2020
								Tupanciretã	-	Wiki aves, 2020
								Joia	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	Toropi	BirdLife International, 2016
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2016
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2016
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2016
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2016
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2016
								-	Giruá	BirdLife International, 2016
Tytonidae	<i>Tyto furcata</i>	coruja-da-igreja	Campo e áreas urbanas	Edificações e grutas	-	-	-	São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2019
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2019
								-	Toropi	BirdLife International, 2019
								-	Quevedos	BirdLife International, 2019
								-	Jari	BirdLife International, 2019
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2019
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2019
								-	Joia	BirdLife International, 2019
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2019
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2019
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2019
								-	Giruá	BirdLife International, 2019
								São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013; Wiki aves, 2020
								Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020

Família	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	Floresta e vegetação arbustiva	Forquilhas de árvores a alturas médias ou no alto das árvores	-	-	-	São Pedro do Sul	-	Wiki aves, 2020
								Toropi	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
Vireonidae	<i>Hylophilus poicilotis</i>	verdinho-coroado	Floresta	Forquilhas de árvores a alturas médias ou no alto das árvores	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	São Miguel das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2018
								-	Santo Ângelo	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018
								-	Giruí	BirdLife International, 2018
			Floresta e vegetação	Galhos horizontais				São Sepé	-	CORRÊA, SILVA, DARLIANE, 2012; Wiki aves, 2020; BENCKE, 2001
								Formigueiro	-	SILVA et al., 2013
								Santa Maria	-	KRÜGEL, BURGER, ALVES, 2006; MCT(PUCRS), Wiki aves, 2020
								Dilermando de Aguiar	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Entre-Ijuís	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2019
								-	São Martinho da Serra	BirdLife International, 2019

Familia	Espécie (Identificada como: Cinegética CI, Rara RA, Migratória MI, Endêmica ED ou de relevância médico-sanitária MS)	Nome-comum	Habitat preferencial	Ambiente reprodutivo	Grau de ameaça			Município de ocorrência confirmada	Município de ocorrência potencial	Fonte
					RS	Brasil	Global			
Vireonidae	<i>Vireo chivi</i> ^{MI}	Juruviara	arbustiva	em forma de forquilha	-	-	-	-	Toropi	BirdLife International, 2019
								-	Quevedos	BirdLife International, 2019
								-	Jari	BirdLife International, 2019
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2019
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2019
								-	Joia	BirdLife International, 2019
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2019
								-	Vitória das Missões	BirdLife International, 2019
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2019
								-	Giruí	BirdLife International, 2019
Xenopidae	<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó	Floresta	Ocos de árvores	-	-	-	Santa Maria	-	Wiki aves, 2020
								São Martinho da Serra	-	Wiki aves, 2020
								São Miguel das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Vitória das Missões	-	Wiki aves, 2020
								Santo Ângelo	-	MELLER, 2020; Wiki aves, 2020
								Giruí	-	Wiki aves, 2020
								-	São Sepé	BirdLife International, 2018
								-	Formigueiro	BirdLife International, 2018
								-	Dilermando de Aguiar	BirdLife International, 2018
								-	São Pedro do Sul	BirdLife International, 2018
								-	Toropi	BirdLife International, 2018
								-	Quevedos	BirdLife International, 2018
								-	Jari	BirdLife International, 2018
								-	Tupanciretã	BirdLife International, 2018
								-	Capão do Cipó	BirdLife International, 2018
								-	Joia	BirdLife International, 2018
								-	Eugênio de Castro	BirdLife International, 2018
								-	Entre-Ijuís	BirdLife International, 2018
								-	Sete de Setembro	BirdLife International, 2018

BATALHA, H. R.; RAMOS, J. A; CARDOSO, G. C. A successful avian invasion occupies a marginal ecological niche. **Acta Oecologica**, v. 49, p. 92-98. 2013.

BELTON, W. **Aves do Rio Grande do Sul**: distribuição e biologia. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 1994. 584 p.

BENCKE, G. A. **Lista de referência das aves do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, 2001. 104p. (Publicações Avulsas FZB,10)

BENCKE, G. A.; FONTANA, C. S.; DIAS, R. A.; MAURÍCIO, G. N.; MÄHLER JR., J. K. F. Aves. In: FONTANA, C. S. ; BENCKE, G. A.; REIS, R. E (Org.). **Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. p. 189-479.

BLENDINGER, P. G. Foraging behaviour of birds in na arid sand-dune scrubland in Argentina. **Emu**, v. 105, p. 67-79. 2005.

BirdLife International. 2016. Rhea americana. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22678073A92754472. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Crypturellus noctivagus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22678217A92761578. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Crypturellus obsoletus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22678176A92759944. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Crypturellus parvirostris. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22678232A92762648. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. Serpophaga griseicapilla (amended version of 2016 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22736536A118645226. Acesso em: 02 de junho de 2020

BirdLife International. 2018. Crypturellus tataupa. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22678238A130022788. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Rhynchotus rufescens. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22733941A95069901. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. Nothura maculosa. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T154589710A154590418. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Chauna torquata. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22679729A92826769. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Dendrocygna bicolor. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22679746A92827620. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Dendrocygna viduata. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22679763A92829021. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Dendrocygna autumnalis. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22679780A131907111. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Coscoroba coscoroba. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22679866A92832574. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Sarkidiornis sylvicola. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22724744A94877265. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Cairina moschata. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22680061A131911211. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Callonetta leucophrys. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22680101A92843247. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Amazonetta brasiliensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22680115A130025891. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Anas flavirostris. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22736320A95130607. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Anas georgica. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22680310A92854981. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Spatula versicolor. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22680329A92855919. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Netta peposaca. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22680351A92856953. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Nomonyx dominicus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22679789A92830407. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Oxyura vittata. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22679824A92830830. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Penelope obscura. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22678389A92771775. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. Ortalis squamata. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T155246763A155636123. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Rollandia rolland*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22696530A93569948. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Tachybaptus dominicus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22696571A93571402. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Podilymbus podiceps*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22696574A93571798. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Podiceps major*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22696596A93573021. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Ciconia maguari*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22697688A93630558. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Mycteria americana*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22697648A93627312. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Nannopterum brasilianus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22696773A133550739. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Anhinga anhinga*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22696702A93581588. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Tigrisoma lineatum*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22697269A93605513. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. *Nycticorax nycticorax*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T22697211A155515762. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Butorides striata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22728182A94973442. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. *Bubulcus ibis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T22697109A155477521. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Ardea cocoi*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22697001A93597705. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. *Ardea alba*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T22697043A155465940. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Syrigma sibilatrix*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22696913A93592468. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Egretta thula*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22696974A93595536. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Plegadis chihi*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22697426A93613243. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Mesembrinibis cayennensis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22697460A93614511. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Phimosus infuscatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22697418A93613032. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Theristicus caerulescens*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22697435A93613867. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Theristicus caudatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22697441A93614046. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Platalea ajaja*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22697574A93621961. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Cathartes aura*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22697627A131941613. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Cathartes burrovianus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22697630A93625866. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Coragyps atratus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22697624A93624950. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Leptodon cayanensis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22694967A93481804. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Chondrohierax uncinatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22694971A93482107. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Elanoides forficatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22695017A93484824. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Elanus leucurus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22695036A93486216. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Circus buffoni*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22695373A93505570. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Circus cinereus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22695393A93506437. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. *Accipiter striatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T22734130A155416546. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Accipiter bicolor*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22695669A93521873. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Ictinia plumbea*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22695069A130186979. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Rostrhamus sociabilis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22695048A93487191. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Geranospiza caerulescens*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22695729A93526020. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Buteogallus meridionalis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22695832A93529385. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Buteogallus urubitinga*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22695827A93529071. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Buteogallus coronatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22695855A93530845. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Rupornis magnirostris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22695880A93531219. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Parabuteo unicinctus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22695838A93529685. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Geranoaetus albicaudatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22695906A93533542. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Geranoaetus melanoleucus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22695845A93530287. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Buteo platypterus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22695891A93532112. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Buteo brachyurus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22695897A93532695. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Spizaetus tyrannus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22696193A95222363. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Spizaetus melanoleucus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22696120A93546145. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Aramus guarauna*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22692174A93339530. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Aramides ypecaha*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22692586A93360121. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. *Aramides cajaneus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T154837348A155305561. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Aramides saracura*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22692591A93360317. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Laterallus melanophaius*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22692337A93348780. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Laterallus leucopyrrhus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22692371A93350975. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Porzana albicollis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22692690A93364764. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Pardirallus maculatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22692763A93368426. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Pardirallus nigricans*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22692766A93368734. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Pardirallus sanguinolentus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22692772A93368937. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Gallinula galeata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T62120280A95189182. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Gallinula melanops*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22692887A93373536. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Porphyrio martinicus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22692827A93371309. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Fulica armillata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22692937A93375014. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Fulica leucoptera*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22692929A93374594. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Vanellus chilensis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22694075A93437026. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Pluvialis dominica*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22693740A93420396. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Charadrius collaris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22693842A93426524. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Charadrius modestus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22693879A93428966. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. *Himantopus himantopus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T22727969A155440465. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Gallinago paraguariae*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22693112A93384265. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Limosa haemastica*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22693154A93386036. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Bartramia longicauda*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22693203A93391112. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Tringa solitaria*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22693239A130186218. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Tringa flavipes*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22693235A93392879. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Calidris fuscicollis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22693399A119296025. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Calidris melanotos*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22693408A93404396. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Calidris himantopus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22693437A93407752. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Steganopus tricolor*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22693472A93409634. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Jacana jacana*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22693553A93412594. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Sternula superciliaris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22694679A93462603. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Phaetusa simplex*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22694791A93468502. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Rynchops niger*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22694256A93442996. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Columbina talpacoti*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22690784A93288614. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Columbina squammata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22690768A95215943. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Columbina picui*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22690794A93289130. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Patagioenas picazuro*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22690253A93267767. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Patagioenas cayennensis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22690290A93268503. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Zenaida auriculata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22690747A93286407. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Leptotila verreauxi*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22690854A93291606. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Leptotila rufaxilla*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22690877A130173662. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Geotrygon montana*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22690966A93296836. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Coccyua cinerea*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22684318A130095337. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Piaya cayana*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T61418830A118860996. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Coccyzus americanus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22684331A93025386. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Coccyzus melacoryphus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22684343A93026842. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Coccyzus euleri*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22684334A93025904. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Crotophaga major*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22684431A93029020. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Crotophaga ani*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22684434A131913691. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Guira guira*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22684441A93030022. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Tapera naevia*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22684444A93030276. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Dromococcyx pavoninus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22684455A130098249. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. *Tyto alba*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T22688504A155542941. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Megascops choliba*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22688774A93208267. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Megascops sanctaecatarinae*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22688874A93210328. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Bubo virginianus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T61752071A132039486. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Glaucidium brasilianum*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T61815999A95181606. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Athene cucularia*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22689353A93227732. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Asio clamator*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22689522A93234205. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Asio stygius*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22689504A95214500. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Asio flammeus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22689531A93234548. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Nyctibius griseus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22689646A93241257. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Lurocalis semitorquatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22689695A130167013. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Nyctidromus albigollis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22689731A93245535. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Setopagis parvula*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22734667A95094030. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Systellura longirostris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22725678A94899321. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Hydropsalis torquata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22690032A93258487. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Chordeiles nacunda*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22689723A93245296. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Streptoprocne zonaris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22686476A130106561. Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Cypseloides senex*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22686467A93113213 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Chaetura cinereiventris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22686701A93122936 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Chaetura meridionalis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22733018A95053584 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Eupetomena macroura*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22687094A93139282 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Florisuga fusca*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22687100A93139856 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Anthracothonax nigricollis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22687130A93141593 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Stephanoxis loddigesii*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22725761A94901895 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Chlorostilbon lucidus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22687321A93147634 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Thalurania glaucopis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22687405A93150314 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Hylocharis chrysura*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22687449A93152671 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Leucochloris albicollis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22687479A93153812 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Polytmus guainumbi*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22687482A93154067 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Amazilia versicolor*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22687525A93156482 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Helimaster furcifer*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22688144A130124235 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Trogon surrucura*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T61687964A95175892 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Megaceryle torquata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22683634A92992777 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Chloroceryle amazona*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22683649A92993258 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Chloroceryle americana*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22683652A92993560 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Nystalus chacuru*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22682264A92937922 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Ramphastos toco*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22682164A113557535 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Ramphastos dicolorus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22682129A131278894 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Pteroglossus castanotis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22682014A92928299 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Picumnus temminckii*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22680750A92875896 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Picumnus nebulosus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22680765A92876921 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Melanerpes candidus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22680798A92878939 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Melanerpes flavifrons*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22680828A92880914 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Veniliornis spilogaster*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22681205A92897173 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Piculus aurulentus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22681246A112128085 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Colaptes melanochloros*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22727950A94966460 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Colaptes campestris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22726441A94922382 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Celeus flavescens*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T61536191A95170760 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Hylatomus lineatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22726489A94923540 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Cariama cristata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22692205A93341300 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Caracara plancus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22733377A95058702 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Milvago chimachima*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22696261A93552073 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Phalcoboenus chimango*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22696264A132066597 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Herpetotheres cachinnans*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22696267A93552613 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Micrastur ruficollis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22696270A93552905 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Micrastur semitorquatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22696291A93553982. .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Falco sparverius*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22696395A93559037 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Falco femoralis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22696450A131940332. .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. *Falco peregrinus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T45354964A155500538 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Psittacara leucophthalmus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22685682A93083034. .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Pyrrhura frontalis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22685793A93088076 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Myiopsitta monachus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T45427277A132189848. .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Pionus maximiliani*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22686181A93101504 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Amazona pretrei*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22686251A93104759 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Dysithamnus mentalis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22701378A110785606 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Thamnophilus ruficapillus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T103657721A93825062 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Thamnophilus caerulescens*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22701338A93824672 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Batara cinerea*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22701232A130210296 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Mackenziaena leachii*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22701238A93819131 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Drymophila malura*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22701637A93841110 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Conopophaga lineata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22734381A93920970 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Chamaeza campanisona*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22703212A130324636 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Sclerurus scansor*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T103661252A93897651 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Geositta cunicularia*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22701981A93855965 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Sittasomus griseicapillus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T103661274A93900837 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Campylorhamphus falcularius*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22703188A93908189 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Lepidocolaptes angustirostris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22703155A110909882 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Lepidocolaptes falcinellus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22733748A111150308 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Dendrocolaptes platyrostris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22703092A110908935 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Xiphocolaptes albicollis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22703068A130282827 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Xenops rutilus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22702998A130280745 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Furnarius rufus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22702144A93861839 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Phleocryptes melanops*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22702646A93884618 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Lochmias nematura*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22702732A93888240 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Philydor rufum*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22702858A130277872 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Heliobletus contaminatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22702981A110877881 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Syndactyla rufosuperciliata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22702774A93890109 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Phacellodomus ruber*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22702621A130275321 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Anumbius annumbi*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22702661A93885286 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Schoeniophylax phryganophilus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22702276A93866427 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Certhiaxis cinnamomeus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22702471A93876863 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Synallaxis ruficapilla*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22702284A93866618 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Synallaxis cinerascens*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22702337A93869945 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Synallaxis frontalis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22702287A130273281 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Synallaxis albenscens*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22702301A93867504 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Synallaxis spixi*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22702304A93867770 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Cranioleuca obsoleta*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22702435A93875361 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Chiroxiphia caudata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22701083A93812244 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Schiffornis virescens*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22700629A130263636 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Tityra inquisitor*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700692A93792825 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Tityra cayana*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T103676987A93792271. .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Pachyramphus viridis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T103677078A93788714 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Pachyramphus castaneus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700644A93789354 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Pachyramphus polychopterus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22700647A118552972 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Pachyramphus validus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22700683A130264229 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Phytotoma rutila*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700767A93795494 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Platyrinchus mystaceus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T103679869A93740731 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Mionectes rufiventris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22698803A130197280 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Leptopogon amaurocephalus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22698813A130197581 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Corythopsis delalandi*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22699069A110730485 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Phylloscartes ventralis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22699520A130203779 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Tolmomyias sulphureus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22699605A93739314 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Todirostrum cinereum*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22699027A93712442 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Poecilotriccus plumbeiceps*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22698986A93711220 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Myiornis auricularis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22699539A93736602 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Hemitriccus margaritaceiventer*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22698933A110728440 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Hirundinea ferruginea*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22699738A95076112 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Euscarthmus meloryphus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T103681055A93732060 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Phyllomyias burmeisteri*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22699081A95080079 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Camplostoma obsoletum*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22699182A93718004 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Elaenia flavogaster*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22699262A93721824 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Elaenia spectabilis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22699265A93722196 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Elaenia parvirostris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22699274A130202229 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Elaenia mesoleuca*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22699280A130202634 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Elaenia obscura*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T103681177A93724998 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Suiriri suiriri*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22734643A95093172 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Myiopagis caniceps*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T103681536A93720261 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Myiopagis viridicata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22699248A93721019 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Capsiempis flaveola*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22699194A118642805 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Phyllomyias virescens*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22699092A93714671 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Culicivora caudacuta*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22699415A110733573 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Polystictus pectoralis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22699420A93730862 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Pseudocolaptes sclateri*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22699427A93731375 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Serpophaga nigriceps*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22699334A93727073 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Serpophaga subcristata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T103681997A93727485 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Serpophaga griseicapilla*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22736536A118645226 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Legatus leucophaeus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22700596A130209116 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Myiarchus swainsoni*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700405A93773755. .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Myiarchus ferox*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22700415A130206987 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Sirystes sibilator*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T103682292A93772581 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Pitangus sulphuratus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22700605A132069895 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Machetornis rixosa*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22700321A118647319 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Myiodynastes maculatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T103682222A93785126 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Megarynchus pitangua*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700533A93783432 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Myiozetetes similis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700586A93785977 .Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Tyrannus melancholicus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700485A93779037.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Tyrannus savana*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700503A93780761.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Empidonomus varius*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22700520A110739551.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Myiophobus fasciatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T103682408A93744147.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. *Pyrocephalus rubinus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T103682912A139924525.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Fluvicola nengeta*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22700284A110738105.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Arundinicola leucocephala*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700291A93767511.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Gubernetes yetapa*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700312A93768434.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Cnemotriccus fuscatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22699748A118651319.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Lathrotriccus euleri*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22699751A93745766.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Knipolegus cyanirostris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22700239A130206001.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Knipolegus lophotes*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700261A93766417.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Hymenops perspicillatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700266A93766598.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Satrapa icterophrys*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700315A93768627.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Xolmis cinereus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700010A93758738.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Xolmis coronatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700019A93758957.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Xolmis irupero*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22700035A93759331.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Xolmis dominicanus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22700052A118650884.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Cyclarhis gujanensis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22705124A130370830.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Hylophilus poicilotis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22705280A130387135.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. *Vireo olivaceus* ssp. *chivi*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T22731796A155764948.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Cyanocorax coeruleus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22705708A118809755.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Cyanocorax chrysops*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22705729A130379543.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Pygochelidon cyanoleuca*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22712122A118843468.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Alopochelidon fucata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22712146A118844170.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Stelgidopteryx ruficollis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22712162A94322426.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Progne tapera. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22712092A94318901.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Progne chalybea. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22712110A94320326.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Tachycineta albiventer. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22712065A94317143.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Tachycineta leucorrhoa. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22712068A94317424.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. Hirundo rustica. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T22712252A137668645.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Petrochelidon pyrrhonota. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22712427A94333165.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. Troglodytes aedon. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T103886826A111242743.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Cistothorus platensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T103886997A94290566.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Campylorhynchus turdinus. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22711306A131962920.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Polioptila lactea. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22711605A94303663.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Polioptila dumicola. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22711614A132100270.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Turdus leucomelas. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22708888A132077787.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Turdus rufiventris. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22708882A94182217.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Turdus amaurochalinus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22708891A94182998.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. Turdus subalaris. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22708863A112411153.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Turdus albicollis. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22708942A94185907.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Mimus saturninus. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22711035A132092680.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Mimus triurus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22711044A94275297.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Anthus lutescens. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T103820643A94588546.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Anthus furcatus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22718594A94587942.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Anthus hellmayri. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22718597A131989841.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Zonotrichia capensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22721079A132142827.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Ammodramus humeralis. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22721147A132007785.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Setophaga pitiayumi. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T103798640A132195253.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. Geothlypis aequinoctialis. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T103795554A119461438.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. Basileuterus culicivorus. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T103801509A119448378.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Myiothlypis leucoblephara. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22722031A132149695.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Cacicus chrysopterus. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22724046A132025014.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Cacicus haemorrhous. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22724034A94845903.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Icterus pyrrhopterus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22731801A95037642.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Gnorimopsar chopi. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22724277A94857840.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Chrysomus ruficapillus. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22724212A132028890.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. Xanthopsar flavus. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T22724673A153660526.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Pseudoleistes guirahuro. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22724259A132174214.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Pseudoleistes virescens. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22724262A132174404.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. Agelaioides badius. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T103794964A119445141.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Molothrus rufoaxillaris. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22724342A132175624.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Molothrus oryzivorus. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22724358A132176081.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Molothrus bonariensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22724345A131890003.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Leistes superciliaris. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22724218A132172992.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Pipraeidea melanonota. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22722691A94778158.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. Pipraeidea bonariensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T103841965A119470965.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Stephanophorus diadematus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22722656A94776696.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Cissopis leverianus. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22722142A132012605.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Paroaria coronata. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22721582A132144578.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Paroaria capitata. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22721602A132144777.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Tangara sayaca. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22722534A94771583.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Tangara preciosa. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22722894A94791641.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Nemosia pileata. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22722290A132151238.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Conirostrum speciosum. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22722083A132011450.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Sicalis flaveola. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22723346A132162254.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Sicalis luteola. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22735428A132185657.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Hemithraupis guira. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22722272A94758464.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Volatinia jacarina. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22723396A132162576.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Trichothraupis melanops. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22722406A94765253.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Coryphospingus cucullatus. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22723051A132021435.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Tachyphonus coronatus. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22722397A132152780.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Tersina viridis. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22723018A94799455.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. Coereba flaveola. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22722080A94747415.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. Sporophila beltoni. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T103818207A119211827.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Sporophila collaris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22723428A94816795.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Sporophila caerulescens*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22723451A132164817.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Sporophila pileata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22724947A119483925.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Sporophila hypoxantha*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22723481A132165304.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Sporophila ruficollis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22723484A132165511.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. *Sporophila palustris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T22723487A155619926.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. *Sporophila cinnamomea*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T22723499A155619440.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Sporophila angolensis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22723542A132167022.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Embernagra platensis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22723386A94814311.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Emberizoides herbicola*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22723370A132022146.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Emberizoides ypiranganus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22723380A132022396.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Saltator coerulescens*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T103812647A119478431.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Saltator similis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22723882A132169900.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Saltator maxillosus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22723895A94839268.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Saltator aurantirostris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22723892A94839057.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Poospiza nigrorufa*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22723252A119473196.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Microspingus cabanisi*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22736278A132188929.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Thlypopsis pyrrhocomma*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22722251A94757290.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Donacospiza albifrons*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22723144A94805623.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2017. *Piranga flava*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T103811599A119471621.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Habia rubica*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22722409A132015710.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Amaurospiza moesta*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T105965570A132047632.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Cyanoloxia glaucoerulea*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22723912A94840360.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Cyanoloxia brissonii*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22723932A94841030.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Spinus magellanicus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22720383A94667451.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Euphonia chlorotica*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22722706A132017181.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Euphonia chalybea*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22722730A94780971.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Euphonia cyanocephala*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22722741A132018550.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. *Euphonia pectoralis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22722775A132019251.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2016. *Chlorophonia cyanea*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22722781A94784295.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2018. Estrilda astrild. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22719574A131995211.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BirdLife International. 2019. Passer domesticus. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T103818789A155522130.Acesso em: 02 de junho de 2020.

BOSQUE, C.; BUCHER, E. H. The diet of nestling and breeding White-tipped Plantcutters (*Phytotoma rutila*). **Emu**, p. 1-5, mar. 2017.

BUZZETTI, D.; SILVA, S. **Berços da Vida**: ninhos das aves brasileiras. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2005. 247 p.

CAMILOTTI, V. L.; KRÜGEL, M. M.; HARTZ, S. M. Nidificação de *Circus cinereus* (Aves, Accipitridae) na região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, Brasil. **Revista Brasileira de Ornitologia**, v. 16, n. 4, p. 363-365, dez. 2008.

CHIARANI, E. **Biologia Reprodutiva e seleção dos sítios de nidificação de *Emberizoides ypiranganus* (AVES: PASSERIFORMES) em campos de altitude no sul do Brasil**. 2014. 102f. Dissertação (Mestrado em Zoologia) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.

CLASSENS, O.; GIRAUD-AUDINE, M.; ROYER, F.; SÉNÉCAUX, L. What is the breeding range and breeding season of Pearly-breasted Cuckoo *Coccyzus euleri*? New records and breeding in French Guiana. **Bulletin of the British Ornithologists Club**, v. 137, n. 1, p. 3-11, mar. 2017.

COLLAR, N. J.; WEGE, D. C. The distribution and conservation status of the Bearded Tachuri *Polystictus pectoralis*. **Bird Conservation International**, v. 5, p. 367-390. 1995.

CORRÊA, L. L. C.; SILVA, DARLIANE, E. Ampliação da distribuição de *Synallaxis albescent* Temminck, 1823, (Furnariidae), no Rio Grande do Sul, Brasil. **Caderno de Pesquisa**, v. 24, n. 2, p. 21-24. 2012.

CORRÊA, L. L. C.; SILVA, D. E.; CAPPELLARI, L. H. Avifauna de São Sepé do Sul, Sul do Brasil. **Scientia Plena**, v. 8, n. 9, p. 1-8. 2012.

DARRIEU, C. A.; SOAVE, G.; SOAVE, E. Nidificación de Passeriformes em la Reserva Integral de Punta Lara y sus alrededores, Buenos Aires, Argentina. **Revista de Ornitología Neotropical**, v. 13, n. 1, p. 53-58, nov. 1988.

ERRITZØE, J. et al. **Cuckoos of the world**. Londres: Cristopher Helm, 2012. 543 p.

ESCALANTE, R. **Aves Marinas del Rio de la Plata y Aguas vecinas del Oceano Atlantico**. Montevideo: Barreiro y Ramos S. A, 1970. 200 p.

FNJV (UNICAMP). Fonoteca Neotropical Jacques Viellard da UNICAMP. Disponível em: <<https://www2.ib.unicamp.br/fnjv/>>. Acesso em: 02 de junho de 2020.

FREITAS, M. S. et al. First description of nests, eggs, and nestlings of the Pearly-bellied Seedeater (*Sporophila pileata*). **The Wilson Journal of Ornithology**, v. 130, n. 3, p. 1-5. 2018.

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA RS. **LIVE Consulta Pública**: Avaliação do Estado de Conservação de Espécies de Fauna RS, 2012. Disponível em: <https://secweb.procergs.com.br/livcpl/?id_modulo=1&id_uf=23>. Acesso em: 02 de junho de 2020.

HAYMAN, P.; MARCHANT, J.; PRATER, T. **Shorebirds an identification guide**. Boston: Houghton Mifflin Company, 1986. 412 p.

HEMING, N. M. et al. Nest and Eggs of the Streamer-Tailed Tyrant (*Gubernetes yetapa*) from Brazil and Paraguay. **The Wilson Journal of Ornithology**, v. 128, n. 2, p. 449-453. 2016.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO). **Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção** Aves. Brasília: ICMBio, 2018. 709 p.

ITÁLIA, A. C. Polícia-inglesa-do-sul *Sturnella superciliaris* (Bonaparte, 1850). **Atualidades Ornitológicas On-line**, n. 139, set/out. 2007.

KEAR, J. et al. **Ducks, Geese and Swans**: general chapters, species accounts (Anhima to Salvadorina). Oxford: Oxford University Press, 2005. 908 p.

KRÜGEL, M. M.; BURGER, M. I.; ALVES, M. A. Frugivoria por aves em *Nectandra megapotamica* (Lauraceae) em uma área de Floresta Estacional Decidua no Rio Grande do Sul, Brasil. **Iheringia, Série Zoologia**, v. 96, n. 1, p. 17-24, mar. 2006.

MAURÍCIO, G. N. et al. Review of the breeding status of birds in Rio Grande do Sul, Brazil. **Iheringia, Série Zoologia**, v. 103, n. 2, jun. 2013.

MCT (PUCRS) - Coleção científica do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS. Disponível em: <<https://www.pucrs.br/mct/colecoes/ornitologia/>>. Acesso em: 02 de junho de 2020.

MELLER, D.A. Lista Comentada das Aves de Santo Ângelo. **Projeto Ave Missões**. Santo Ângelo, 6 jan 2020. Disponível em: < <http://avemissoes.blogspot.com/2020/01/lista-comentada-das-aves-de-santo.html#more>>. Acesso em: 22 abr 2020.

PRETELLI, M.; ISACCH, J. P. Breeding Biology of the Spectacled Tyrant (*Hymenops perspicillatus*) In the Southeastern Pampas Region Argentina. **The Wilson Bulletin Journal of Ornithology**, v. 125, n. 2, p. 275-279. 2013.

PRETELLI, M. et al. Year-Round Abundance, Richness and Nesting of the Bird Assemblage of Tall Grasslands in the South-East Pampas Region, Argentina. **Ardeloa**, v. 60, n. 2, p. 327-343. 2013.

REPPENING, M.; FONTANA, C. S. A New Species of Gray Seedeater (Emberizidae: *Sporophila*) from Upland Grasslands of Southern Brazil. **The Auk**, v. 130, n. 4, p. 791-803. 2013.

RIBON, R.; SIMON, J. E. The Nest and the Eggs of the Chestnut-Vented Conebill *Conirostrum speciosum* (Temminck, 1824). **Ornitologia Neotropical**, v. 8, p.71-72. 1996.

RODRIGUES, M. et al. Ninhos e ovos de *Emberizoides herbicola*, *Emberizoides ypiranganus*, *Embernagra longicauda* (Passeriformes: Emberizidae) no Parque Nacional da Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. **Revista Brasileira de Ornitologia**, v. 17, n. 2, p. 155-160, jun. 2009.

ROESLER, I.; MAZAR BARNETT, J. Nuevos registros del Aguilucho Alas Anchas (*Buteo platypterus*) em Argentina. **Revista de Ornitología Neotropical**, v. 19, n. 1, p. 37-40. 2004.

SALVADOR, S. A. Nidos Abandonados: Utilización Para Criar Por Aves En Argentina. **Biológica Revista de Naturaleza, Conservación y Sociedad**, n. 17, p. 5-19. 2014.

SEGURA, L.; ARTURI, M. F. Selección de Sitios de Nidificación del Cardenal Común (*Paroaria coronata*) en Bosques Naturales de Argentina. **Ornitología Neotropical**, v. 20, p. 203-213. 2009.

SHIELDS, W. M. Factors Affecting Nest and Site Fidelity in Adirondack Barn Swallows (*Hirundo rustica*). **The Auk**, v. 101, n. 4, p. 780-789, out. 1984.

SICK, H. **Ornitologia Brasileira**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 912 p.

SIGRIST, T. **Avifauna Brasileira**: descrição das espécies. Vinhedo: Avis Brasilis Editora, 2009. 305 p.

SILVA, D. E. et al. Diversity of Birds in Municipality of Formigueiro, Rio Grande do Sul, Brazil. **Caderno de Pesquisa, série Biologia**, v. 25, n. 2, p. 25-39. 2013.

TUMLISON, R. Breeding by Cliff Swallows (*Petrochelidon pyrrhonota*) in Southern Arkansas. **The Southwestern Naturalist**, v. 54, n. 2, p. 208-210. 2009.

WIKIAVES. **Espécies em São Sepé/RS**. Wikiaves.org.br, 2020a. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4319604>>. Acesso em: 04 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em Formigueiro/RS**. Wikiaves.org.br, 2020b. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4308409>>. Acesso em: 04 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em Santa Maria/RS**. Wikiaves.org.br, 2020c. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4316907>>. Acesso em: 05 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em Dilermando de Aguiar/RS**. Wikiaves.org.br, 2020d. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4306379>>. Acesso em: 04 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em São Pedro do Sul/RS**. Wikiaves.org.br, 2020e. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4319406>>. Acesso em: 05 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em São Martinho da Serra/RS**. Wikiaves.org.br, 2020f. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4319125>>. Acesso em: 05 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em Toropi/RS**. Wikiaves.org.br, 2020g. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4321493>>. Acesso em: 08 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em Quevedos/RS**. Wikiaves.org.br, 2020h. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4315321>>. Acesso em: 08 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em Jari/RS**. Wikiaves.org.br, 2020i. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4311130>>. Acesso em: 08 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em Tupanciretã/RS**. Wikiaves.org.br, 2020j. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4322202>>. Acesso em: 05 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em Capão do Cipó/RS**. Wikiaves.org.br, 2020k. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4304655>>. Acesso em: 06 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em Jóia/RS**. Wikiaves.org.br, 2020l. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4311155>>. Acesso em: 08 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em São Miguel das Missões/RS**. Wikiaves.org.br, 2020m. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4319158>>. Acesso em: 06 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em Eugênio de Castro/RS**. Wikiaves.org.br, 2020n. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4307831>>. Acesso em: 06 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em Entre-Ijuís/RS**. Wikiaves.org.br, 2020o. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4306932>>. Acesso em: 06 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em Vitória das Missões/RS**. Wikiaves.org.br, 2020p. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4323754>>. Acesso em: 06 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em Santo Ângelo/RS**. Wikiaves.org.br, 2020q. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4317509>>. Acesso em: 06 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em Sete de Setembro/RS**. Wikiaves.org.br, 2020r. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4320578>>. Acesso em: 08 maio 2020.

WIKIAVES. **Espécies em Giruá/RS**. Wikiaves.org.br, 2020s. Disponível em <<https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=4309001>>. Acesso em: 06 maio 2020.

WRIGHT, Z.; PORT, J.; GREENEY, H. F. Male and female parental care in the Golden-rumped Euphonia (*Euphonia cyanocephala*). **Ornitología Colombiana**, v. 16, p. 1-6. 2017.