


CLASSES DE SOLOS

	LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS (LVA)
LVA23	Distróficos relevo montanhoso e forte ondulado + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Distróficos relevo montanhoso ambos A moderado textura argilosa.
	CAMBISSOLOS HÁPLICOS (CX)
CX1	Distróficos A moderado textura argilosa relevo forte ondulado.
	ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS (PVA)
PVA18	Distróficos A moderado textura média/argilosa e argilosa relevo ondulado e forte ondulado.
PVA 41	Distróficos textura argilosa relevo forte ondulado + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Distróficos textura argilosa e média relevo forte ondulado e montanhoso ambos A moderado.
PVA42	Distróficos textura argilosa relevo forte ondulado e montanhoso + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Distróficos textura argilosa relevo montanhoso e escarpado ambos A moderado.
PVA55	Distróficos textura argilosa e média/argilosa fase não rochosa e rochosa relevo forte ondulado + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos textura argilosa relevo forte ondulado e montanhoso ambos A moderado.

LEGENDA

- Limite da Área de Influência Indireta (AII dos Meios Físico e Biótico)
- Limite da Área de Influência Direta (AID)

ESCALA :



CONSÓRCIO:



Desenvolvimento Rodoviário S.A. TRECHO NORTE

Figura 5.2.1.2.c:

TIPOS PEDOLÓGICOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) DO EMPREENDIMENTO

FONTE: Mapa elaborado a partir do Mapa Pedológico do Estado de São Paulo. Instituto Agrônomo - EMBRAPA solos. Escala 1:1.000.000. Oliveira et al (1999)

ESCALA: 1:500.000 DES. Nº: Figura Pedológico.mxd
 DATA: 17/08/2010 REV: Ø